Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Schaeffer, Jacob Christian, 1718-1790

D. Iacobi Christiani Schaeffer Fvngorum Qvi In Bavaria Et Palatinatv Circa Ratisbonam Nascvntur Icones Cvm Indice Triplici

Bd.: 4

Ratisbonae [1774]

Regensburg, Staatliche Bibliothek -- 999 IM/Philos.2886(4
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11120626-2

EISBIBLIOTHEK
EGENSBURG

Ml. Philol. 2886. IV.

SBR 069027412447

D. IACOBI CHRISTIANI SCHAEFFER

FVNGORVM

QVI IN

BAVARIA ET PALATINATV

CIRCA

RATISBONAM

NASCVNTVR

ICONES

NATIVIS COLORIBVS EXPRESSAE.

TOMVS QVARTVS ET VLTIMVS.

CVM

INDICE TRIPLICI.



RATISBONAE, IMPENSIS AVCTORIS.

KREISBIBLIOTHEK
REGENSBURG

SERENISSIMO

INCLVTISSIMAEQVE ORIGINIS PRINCIPI AC DOMINO

DOMINO

CAROLO AVGVSTO

DVCI SAXONIAE, IVLIACI, CLIVIAE ET MONTIVM, ANGRIAE QVOQVE ET WESTPHALIAE, LANDGRAVIO THVRINGIAE, MARCHIONI MISNIAE, PRINCIPI HENNEBERGICO, COMITI MARCAE ET RAVENSBERGAE, DYNASTAE RAVENSTEINII, CET.

DVCATVS VINARIENSIS PRINCIPI HAEREDI,

PATRIAE ET CIVIVM SVORVM SPEI CERTISSIMAE ATQVE IVCVNDISSIMAE

DOMINO MEO INDVLGENTISSIMO

ATQVE CLEMENTISSIMO.

PRINCEPS SERENISSIME,
DOMINE CLEMENTISSIME,

Poſtremam de fungis commentationem euulganti mihi, non diu multumque cogitandum fuit, cui NOMINI AVGVSTO eam potiſſimum ſacram eſſe, cuiusque veluti auſpiciis ipſam in publicum prodire iuberem. Inquirere enim inchoanti extemplo ſeſe oſtendit atque occurrit NOMEN TVVM SERENISSIMVM, eoque celerius, quo ſaepius, quo iucundius, TE meas commentationes entomologicas a MATRE INCLVTA et PRVDENTISSIMA, ſtrenae loco, TIBI donatas, legiſſe atque peruolutaſſe, recordari, pioque ſimul animo laetari ſoleo. Itaque iſti libri cum tam ſingulari et incredibili a TE, PRINCEPS SERENISSIME, beneuolentia ſint accepti et verſati: non poſſum non vehementer optare, vt hic de fungis vltimus, tanquam fidus eorum comes, itidem ad TE perueniat, TIBIque conſecratus, veluti locuples ſummae meae in TE pietatis et obſeruantiae teſtis, TVIS oculis numquam non obſeruetur. Quo honeſto et probabili ſtudio inflammatus hanc poſtremam de fungis commentationem TIBI, PRINCEPS SERENISSIME, do, dico, dedico; mente obſequentiſſima, et, qua fas eſt, obſeruantia rogans, vt, qua illas, eadem hanc quoque benignitate et indulgentia excipere et complecti ne dedigneris. Id quod TVA, PRINCIPIS litterarum optimarum, in primis hiſtoriae naturalis amantiſſimi, perſona eo minus indignum videtur, quo planius et luculentius non ita diu ſingularem et incredibilem TVVM erga diſciplinas et artes liberaliores amorem palam feciſti eo, quod TE, miro et memora-

morabili clementiae exemplo, litterarum vniuerſitatis, quae *Ienae* floret, *Rectorem Magnificentiſſimum* renuntiari paſſus es. Quod factum TVVM immortale, viris eruditis perhonorificum, artibus ipſis vtiliſſimum, TIBI glorioſum, me in aliis perpulit, vt commentationem qualemcumque meam TIBI, *Principi tam indulgenti et diſciplinarum tantopere ſtudioſo*, multo magis conſecratam velim. Ceterum Deum o. m. precibus ſupplicibus atque caſtiſſimis oro rogoque, vt TE, PRINCEPS SERENISSIME, *feliciſſimum Erneſtinae originis germen*, quam diutiſſime ſaluum et ſoſpitem tueri, et omnibus, quae natura humana capere poteſt, bonis cumulare, MATRIS INCLVTAE et OPTIMAE, cuius exemplo illuſtri ac fere diuino non minus, quam praeceptis prudentiſſimis, ad optima quaeque informatus es, *ſpem dulciſſimam et ornamentum perpetuum*, TVORVM *delicias et amorem*, *muſarum bonorum omnium ſolatium ac praeſidium longe firmiſſimum* eſſe iubeat! Haec voueo et exopto

PRINCEPS SERENISSIME

TIBI

Ratisbonae, ipſis Idib. April.
CIↃ IↃ CC LXXIIII.

addictiſſimus et deuotiſſimus
IACOBVS CHRISTIANVS SCHAEFFER. D.

LECTORI BENEVOLO
S.

Accipias hic colophonem operis, quod ante hos XII annos alienis inceptum ſumtibus propriis mox continuare, atque nunc demum claudere coactus ſum. Vltimum huncce, quem conſpicias, tomum, glorioſiſſimis *Magnae Ruſſorum Imperatricis* CATHARINAE II. ſubſidiis acceptum feras.

Perfectionem, quam exoptaſſem ipſe, quamque mihi primum animo conceperam, me non attigiſſe, planiſſime quidem & perſpicio & ingenue confiteor. Plantarum tamen hiſtoriae id non penitus fore inutile confido.

Vtilitatem operis huius duplici potiſſimum indice promovere ſtudui. Primo quidem *ſynonymorum*, quibus apud praeſtantiores botanicos inſigniuntur noſtri, adiectis *nominibus*, quos vocant, triuialibus; altero, ſi hoc nomine tentamen

quod-

quoddam adpellare fas ſit, *ſyſtematico*, quantum id fieri potuit, perſpicuo & facili. Acceſſit *tertius* vulgatiorum, tam latinorum, quam germanicorum *nominum* breuiſſimus index.

Clathri genus, cum noſtris hiſce in regionibus numquam mihi fuerit obuium, pictura ex *Micheliano* nouorum generum plantarum praeclaro opere, mutuata, in capite vltimi huiusce tomi poſita, *Tibi* innoteſcet.

Hiſce vale, atque noſtris, *amiciſſime lector* conatibus porro faue. Dabam ex muſeo ipſis Calendis Aprilis.

MDCCLXXIV.

AGARICI.

Blätterſchwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE PRIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGESIMVS.

Eſt fungus bicolor, fere ſemper ſolitarius, cauus, vix carnoſus, varius; pileo ſplendente, initio conico, poſt campanulato, denique plano, ad oram ſaepe reuoluto; petiolo cylindraceo, raro recto, ſemper fere curuo, vel hinc inde flexuoſo; velo & annulo orbatus. *Bavaris* nomen nullum.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor nondum explicatus, maior ſe explicare incipiens.
Fig. II. III. Fungi ſemiexplicati, colore diuerſi.
Fig. IV. Fungus explicatus, pileo plano, colore ob aetatem obſoleto.
Fig. V. Fungus explicatus, pileo plano, ad oram exſciſſo.
Fig. VI. Fungus explicatus, pileo ad oram reuoluto.
Fig VII. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VIII. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IX. Pollen natiuus.
Fig. X. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und erſten Kupfertafel.

Der hundert und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, faſt allezeit einfacher, hohler, wenig und gar nicht fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem glänzenden, anfangs kegeligen, nachher glockigen, und endlich flachen, am Rande oft umgeſchlagenen Hute; mit einem runden, ſelten geraden, ſondern faſt allezeit krummen, oder geſchlängelten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, davon der kleinere noch unentwickelt, der größere ſich zu entwickeln anfänget.
Fig. II. III. Halbentwickelte Schwämme, von verſchiedener Farbe.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem, vom Alter entfärbtem, Hute.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem, am Rande ausgeſchnittenem Hute.
Fig VI. Ein entwickelter Schwamm, mit einem am Rande aufgerolltem Hute.
Fig. VII. Ein entwickelter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VIII. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IX. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. X. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCI.



Ioh. Ios. Rotermundt. pinx. Rat.

St. Loibel sc. Ratisb.

Tab. CCCII.



I. I. Rotermundt pinx. Rat.

St. Loibel sc. Rat.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE SECVNDAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. PRIMVS.

Eſt fungus bicolor, & ſimplex & multiplex, cauus carne fere omni deſtitutus, varius; pileo ſplendente ab initio conico, poſt campanulato vel hemiſphaerico, in centro ſaepe faſtigiato; petiolo vel tenuiori, vel craſſiori, cylindraceo, recto vel flexuoſo, radicem verſus ſaepe inflato; velo & annulo nullo. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Trias fungorum, quorum minores nondum explicati, maior explicatus.
Fig. II. Fungus explicatus, petiolo ad oram fiſſo.
Fig. III. Fungus explicatus, pileo deformi, petiolo quaſi duplici.
Fig. IV. Trias fungorum, pileis colore ob aetatem obſoleto.
Fig. V. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und zwoten Kupfertafel.

Der hundert ein und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ein zweyfärbiger, theils einfacher, theils vielfacher, hohler, faſt gar nicht fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem glänzenden, anfangs kegeligen, nachhero glockigen und halbkugelrunden, in der Mitten oft zugeſpitzten Hute; mit einem bald dünnern, bald dickern, runden, geraden oder geſchlängelten, nach unten zu oft aufgetriebenen Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey Schwämme, davon die kleinern noch unentwickelt, der größere entwickelt iſt.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm; mit einem am Rande geſpaltenen Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit ungeſtaltetem Hute, und gleichſam doppelten Stiele.
Fig. IV. Drey Schwämme, mit entfärbten Hüten.
Fig. V. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. SECVNDVS.

Eſt fungus bicolor, fere vnicolor, plerumque ſolitarius, cauus, parum carnoſus, raro varius; pileo ab initio conico, poſt campanulato, in centro faſtigiato; petiolo cylindraceo, flexuoſo, raro recto, radice craſſiori; nec velum nec annulum habens. In *Bauaria* nomine gaudet nullo.

Fig. I. Par fungorum, quorum minor nondum explicatus, minor explicari incipiens.
Fig. II. Fungus explicatus; pileo hemiſphaerico, in centro faſtigiato.
Fig. III. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und dritten Kupfertafel.

Der hundert zwey und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, insgemein einzelner, hohler, faſt gar nicht fleiſchiger, und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, nachmals glockigen und in der Mitten ſtark erhobenen, zugeſpitzten Hute; mit einem runden, ſchlängeligen, ſehr ſelten geraden und unten dickern Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Paar Schwämme, deren größerer noch unentwickelt, der kleinere ſich zu entwickeln anfänget.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit halbrundem, in der Mitten erhabenem zugeſpitztem Hute.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCIII.

I. I. Rotermundt pinx. Rat. St. Loibel sc. Rat.

Tab. CCCIV.



I. I. Rotermundt pinx. Rat.

St. Loibel sc. Rat.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. TERTIVS.

Eſt fungus bicolor, fere vnicolor, & ſimplex & multiplex, cauus, parum carnoſus, parumque varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, in centro fere ſemper excauato; petiolo cylindraceo, in medio tenuiori, flexuoſo, ſaepe tortuoſo; nullo velo nulloque annulo. *Bauaris* nomen deeſt.

Fig. I. Par fungorum explicatorum diuerſae figurae; petiolis tortuoſis.
Fig. II. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. III. Faſciculus fungorum, pileis minoribus.
Fig. IV. Fungus explicatus, pileo ad oram plicato.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Faſciculus fungorum praeter naturam minorum.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und vierten Kupfertafel.

Der hundert drey und funzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, faſt einfärbiger, ſowohl einfacher als vielfacher, hohler, wenig fleiſchiger, und wenig abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugeligen, nachhero halbrunden, in der Mitten dünnern, geſchlängelten, oft gewundenen Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring, und in Bayern ohne Namen.

Fig. I. Ein Paar entwickelte Schwämme von verſchiedener Geſtalt, und gewundenen Stielen.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein Büſchel Schwämme, mit kleinen Hüten.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit einem am Rande geſtrichelten Hute.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Ein Büſchel widernatürlich kleiner Schwämme.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. QVARTVS.

Eſt fungus eſculentus, bicolor, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt plano, plerumque deformi; petiolis ſeu ramis vel cylindraceis, vel depreſſis, hinc inde ſaepe ſtriatis; velo & annulo orbatus. *Bauaria* dicitur *Eichhaaſe.*

Fig. I. Fungus quaſi ramoſus, pileis variis & inter ſe connatis.

Erklärung der dreyhundert und fünften Kupfertafel.

Der hundert vier und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein eßbarer, zweyfärbiger, äſtiger, voller, fleiſchiger, ſehr abänderlicher, Schwamm; mit einem anfangs kugeligen, nachmals flachen, faſt allezeit ungeſtalteten Hute; mit entweder runden, oder gedrückten, oft hin und wieder geſtrichelten Stielen oder Aeſten; ohne Ring und Saamendecke. Hat in Bayern den Namen Eichhaaſe.

Fig. I. Ein gleichſam äſtiger Schwamm, mit verſchiedenen und untereinander verwachſenen Hüten.

Tab. CCCV.

Ioh. Ios. Rotermundt pinx. Rat. *St. Loibel sc. R.*

Tab. CCCVI.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE SEXTAE.

AGARICVS PRAECEDENS CVM POLLINE.

Quia fungi praecedentis varietates fere innumerae offenduntur, placet eum hac tabula parte praecipue poſteriori exhibere.

Fig. I. Fungus partem poſteriorem praecipue ſiſtens.

Fig. II. Ramus fungi ad perpendiculum diſſectus.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und ſechsten Kupfertafel.

Der vorige Blätterſchwamm mit dem Saamenſtaube.

Weil die Abänderungen des vorigen Schwammes unzählbar ſind, ſo hat man denſelbigen auf dieſer Tafel auch von der hintern Seite vorſtellen wollen.

Fig. I. Der Schwamm, wie er ſich nach der hintern Seite vornämlich zeiget.

Fig. II. Ein Aſt des Schwammes, ſenkrecht zerſchnitten.

Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE SEPTIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. QVINTVS.

Eſt fungus ſingularis, fere vnicolor, & ſimplex & multiplex farctus, carnoſus, parum varius; pileo, clauariae apice truncatae inſtar, nullo; petiolo vel cylindraceo, & longiuſculo, vel radicem verſus tenuiori & breui; velo, annulo & in *Bauaria* nomine deſtitutus.

Fig. I. Trias fungorum; petiolis breuibus cylindraceis, ad baſin craſſioribus.
Fig. II. III. Fungi variae explicationis & figurae.
Fig. IV. Fungus per aetatem fiſſus.
Fig. V. Fungus petiolo longiori.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und ſiebenden Kupfertafel.

Der hundert fünf und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ſonderbarer, faſt einfärbiger, ſowohl einfacher, als vielfacher, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; nach Art eines, oben abgeſchnittenen, Käulſchwammes ohne Hut; mit einem veränderlichen, entweder durchaus runden und etwas langen oder nach unten zu dünn auslaufenden und kurzen Stiele; ohne Saamendecke, ohne Ring und in Bayern ohne Namen.

Fig. I. Drey Schwämme mit kurzen, runden und unten dickern Stiele.
Fig. II. III. Schwämme von verſchiedener Entwickelung und Geſtalt.
Fig. IV. Ein vor Alter geſpaltener Schwamm.
Fig. V. Ein Schwamm mit langem Stiele.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCVII.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

Tab. CCCVIII.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE OCTAVAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. SEXTVS.

Eſt fungus ex minoribus, bicolor, ſolitarius, gregatim naſcens, farctus, non carnoſus, parum varius; pileo conico, per longitudinem plicato; petiolo cylindraceo & recto & flexuoſo; velo & annulo nullo. *Bauari* nomen ignorant.

Fig. I. Multitudo fungorum, qui ſitu, directione, & colore variant.
Fig. II. Fungus magnitudine naturali, quoad faciem ſuperiorem.
Fig. III. Fungus magnitudine naturali, quoad faciem inferiorem.
Fig. IV. Fungus vitro auctus.
Fig. V. Fungus vitro auctus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und achten Kupfertafel.

Der hundert ſechs und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein von der kleinern Art zweyfärbiger, einzelner, jedoch haufenweiſe beyeinanderſtehender, voller, fleiſchloſer, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem kegeligen, der Länge nach gefalteten Hute; mit rundem, ſowohl geradem, als geſchlängeltem, Stiele; ohne Samendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Eine Menge beyeinanderſtehender Schwämme, von verſchiedener Lage, Stellung und Farbe.
Fig. II. Ein Schwamm in ſeiner natürlichen Größe, nach der obern Fläche.
Fig. III. Ein Schwamm in der natürlichen Größe, nach der untern Fläche.
Fig. IV. Ein vergrößerter ganzer Schwamm.
Fig. V. Ein vergrößerter und ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. SEPTIMVS.

Eſt fungus bicolor, & ſolitarius & ceſpitoſus, cauus, non carnoſus, varius; pileo ab initio conico, ad oram plicato, poſt plano, in centro papillato; petiolo tenui, cylindraceo, recto vel flexuoſo, ſaepe radicato; nullo velo, nullo annulo, nulloque in *Bauaria* nomine donatus.

Fig. I. Faſciculus fungorum explicatorum; pileis planis, in centro papillatis, oram verſus plicatis.
Fig. II. III. Fungi variae explicationis.
Fig. IV. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und neunten Kupfertafel.

Der hundert ſieben und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſowohl einzelner, als häufig beyeinanderſtehender, hohler, fleiſchloſer, veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs kegeligen, am Rande gefalteten, mehrmals flachen, in der Mitten warzigen Hute; mit einem zarten, geraden oder geſchlängelten, oft bewurzelten Stiele; ohne Samendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Büſchel entwickelter Schwämme; mit flachen, in der Mitten warzigen, dem Rande zu gefalteten Hüten.
Fig. II. III. Schwämme von verſchiedener Entwickelung.
Fig. IV. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein Schwamm ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCIX.



I. I. Rotermundt pinx. R. St. Loibel sc. R.

Tab. CCCX.

Fig. I.

Fig II.

Fig. III.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. OCTAVVS.

Eſt fungus bicolor, plerumque ſolitarius, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo vel ſubconico, poſt hemiſphaerico, denique planiuſculo; petiolo cylindraceo, recto vel flexuoſo, plerumque baſi, ſaepe tamen in medio craſſiori; velo membranaceo, annuloque perſiſtente. In *Bauaria* non raro ad *Ehegaertel* vel *Champignon* refertur.

Fig. I. Par fungorum nondum explicatorum, quorum maior pileo globoſo, minor conico.

Fig. II. Fungus explicari incipiens, velo rumpente.

Fig. III. Fungus explicatus, pileo hemiſphaerico, & annulo perſiſtente.

Erklärung der dreyhundert und zehenden Kupfertafel.

Der hundert acht und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ingemein einfacher, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugeligen oder etwas kegeligen, nachmals halbkugelrunden, endlich ziemlich flachen Hute; mit einem runden, geraden oder geſchlängelten, meiſtentheils unten, jedoch auch ofte in der Mitten dünnern Stiele; mit einer häutigen Saamendecke und beſtändigen Ringe. Wird oft zu den Ehegärteln oder Champignons gerechnet.

Fig. I. Ein Paar noch unentwickelter Schwämme, deren größerer mit einem kugeligen, der kleinere mit einem kegeligen Hute.

Fig. II. Ein ſich entwickelnder Schwamm, mit zu zerreiſſen anfangendem Hute.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit halbkugeligem Hute und beſtändigem Ringe.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE VNDECIMAE.

FVNGVS PRAECEDENS CVM POLLINE.

Fig. I. Fungus ſat magnus, velo adhuc integro.

Fig. II. Fungus explicatus, velo rupto, quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus explicatus, ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und eilften Kupfertafel.

Der vorige Schwamm nebſt ſeinem Saamenſtaube.

Fig. I. Ein ungewöhnlich großer Schwamm, mit noch ganzer Saamendecke.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit zerriſſener Saamendecke, und nach ſeiner Unterfläche.

Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.

Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXI.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

Tab. CCCXII.

I. I. Rotermundt pinx. R.   St. Loibel sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE DVODECIMAE.

AGARICVS CENTESIMVS QVINQVAGES. NONVS.

Eſt fungus bicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ſplendente, ab initio conico, poſt hemiſphaerico, in centro faſtigiato; petiolo cylindraceo, recto vel flexuoſo, maculato; velo & annulo nullo. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus nondum explicatus, petiolo flexuoſo.
Fig. II. Fungus nondum explicatus, petiolo fere recto.
Fig. III. Fungus explicatus, pileo hemiſphaerico, in centro paullulum faſtigiato.
Fig. IV. Fungus explicatus, quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und zwölften Kupfertafel.

Der hundert neun und funfzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, wenig abänderlicher Schwamm; mit glänzendem, anfangs kegeligem, nachmals halbkugelrundem, in der Mitten zugeſpiztem Hute; mit einem runden, geraden oder geſchlängelten, gefleckten Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit geſchlängeltem Stiele.
Fig. II. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit faſt geradem Stiele.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit halbkugelrundem, in der Mitten etwas zugeſpiztem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

AGARICVS CENTESIMVS SEXAGESIMVS.

Eſt fungus bicolor, & ſolitarius & faſciculoſus, farctus, carnoſus, varius; pileo ab initio globoſo, poſt hemiſphaerico, in centro ſaepe faſtigiato, denique planiuſculo; petiolo cylindraceo, vel recto vel curuo, baſi vel craſſiori vel tenuiori; velo & annulo nullo. In *Bavaria* nomen datur nullum.

Fig. I. Fungus nondum explicatus, pileo ſubconico.
Fig. II. Fungus explicatus, quod faciem inferiorem.
Fig. III. Fungus explicatus, pileo hemiſphaerico, in centro faſtigiato.
Fig. IV. Fungus parum explicatus, pileo globoſo.
Fig. V. Trias fungorum, pileis variae figurae.
Fig. VI. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und dreyzehenden Kupfertafel.

Der hundert und ſechzigſte Blätterſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſowohl einzelner als büſcheliger, voller, fleiſchiger, abänderlicher Schwamm; mit anfangs kugeligem, nachher halbkugelrunden, in der Mitten oft zugeſpitztem, endlich ziemlich flachem Hute; mit rundem, entweder geradem oder krummem, unten dünnerm oder dickerm Stiele; ohne Saamendecke und Ring. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein unentwickelter Schwamm, mit etwas kegeligem Hute.
Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, nach ſeiner Unterfläche.
Fig. III. Ein entwickelter Schwamm, mit halbkugelrundem, in der Mitten zugeſpitztem Hute.
Fig. IV. Ein ſehr wenig entwickelter Schwamm, mit kugeligem Hute.
Fig. V. Drey Schwämme, mit verſchiedenen Hüten.
Fig. VI. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXIII.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

BOLETI.

Löcherschwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE DECIMAE QVARTAE.

BOLETVS TRICESIMVS QVINTVS.

Eſt fungus tubuloſus, vnicolor, ſeſſilis, durus, & lignarius, lignoſus, perſiſtens, varius; pileo fere ſemper alio, ſuperficie piloſa. In *Bauaria* nomen deeſt.

Fig. I. Fungus globoſus.
Fig. II. Fungus ſubouatus.
Fig. III. Fungus deformis.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und vierzehenden Kupfertafel.

Der fünf und dreyßigſte Pilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, einfärbiger, ſtielloſer, harter, holziger, dauerhafter, abänderlicher Holzſchwamm; mit faſt beſtändig anderem, und auf der obern Fläche haarigem, Hute.

Fig. I. Ein kugelrunder Schwamm.
Fig. II. Ein etwas länglichrunder Schwamm.
Fig. III. Ein ungeſtalteter Schwamm.
Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXIV.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

Tab. CCCXV.



I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE DECIMAE QVINTAE.

BOLETVS TRICESIMVS SEXTVS.

Eſt fungus tubuloſus, tricolor, petiolatus, farctus, carnoſus, parum varius; pileo ab initio globoſo, poſt campanulato, ſeu hemiſphaerico; petiolo cylindraceo, reticulati, baſi craſſiori. In *Bauaria* nomen non datur.

Fig. I. Fungus nondum explicatus; pileo globoſo.

Fig. II. Fungus explicatus, pileo campanulato ſeu hemiſphaerico & quoad faciem inferiorem.

Fig. III. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und funfzehenden Kupfertafel.

Der ſechs und dreyßigſte Bilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, dreyfärbiger, beſtielter, voller, fleiſchiger, wenig veränderlicher Schwamm; mit einem anfangs kugelrunden Hute; mit einem netzartigen, runden, unten dickern Stielen. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein noch unentwickelter Schwamm, mit kugeligem Hute.

Fig. II. Ein entwickelter Schwamm, mit glockigem oder halbkugelrundem Hute.

Fig. III. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

BOLETVS TRICESIMVS SEPTIMVS.

Eſt fungus tubuloſus, bicolor, & ſolitarius & faſciculoſus, flori- vel petaliformis; pileo deformi, petala floris referente; petiolo vel breui vel longiori, plerumque flexuoſo. In *Bauaria* nomen deſideratur.

Fig. I. Fungus pileis & petiolis inter ſe connatis.

Erklärung der dreyhundert und ſechzehenden Kupfertafel.

Der ſieben und dreyßigſte Pilz.

Es iſt ſolcher ein röhriger, zweyfärbiger, ſowohl einzelner als büſcheliger, blumen- oder blätterartiger Schwamm; mit einem ungeſtalteten, meiſt blumenblätterähnlichen Hute; mit kurzem oder längerm, insgemein geſchlängeltem, Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm mit verwachſenen Hüten und Stielen.

Tab. CCCXVI.

Fig. I.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

Tab. CCCXVII.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE DECIMAE SEPTIMAE.

FVNGVS PRAECEDENS CVM POLLINE.

Fig. I. Fungus quaſi tripetalus.

Fig. II. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Fig. III. Fungus quoad faciem inferiorem.

Fig. IV. Pollen natiuus.

Fig. V. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und ſiebenzehenden Kupfertafel.

Der vorhergehende Schwamm mit ſeinem Saamenſtaube.

Fig. I. Ein gleichſam dreyblätteriger Schwamm.

Fig. II. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Fig. III. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.

Fig. IV. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. V. Der vergrößerte Saamenſtaub.

HYDNA.

Stachelſchwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE DECIMAE OCTAVAE.

HYDNVM DVODECIMVM.

Eſt fungus fere vnicolor, ſolitarius, farctus, carnoſus, valde varius; pileo vel hemiſphaerico, vel plano, vel deformi; petiolo craſſo vel tenuiori, recto vel curuato, baſi acuminato vel bulboſo. Nomen habet in *Bavaria* nullum.

Fig. I. Fungus explicatus, pileo plano, ad oram varie inciſo.
Fig. II. Fungus pileo deformi.
Fig. III. Fungus maior, pileo plano, oblongo, ora inaequali.
Fig. IV. Fungus explicatus, pileo hemiſphaerico, quoad faciem inferiorem.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und achtzehenden Kupfertafel.

Der zwölfte Stachelſchwamm.

Es iſt ſolcher ein faſt einfärbiger, einzelner, voller, fleiſchiger, ſehr abänderlicher Schwamm; mit einem entweder halbkugelrunden, oder flachen, oder ungeſtalteten Hute; mit einem bald dickern, bald dünnern, geraden oder krummen, unten ſpitzig oder dick auslaufenden Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein entwickelter Schwamm, mit flachem am Rande verſchieden eingeſchnittenem Hute.
Fig. II. Ein ungeſtalteter Schwamm.
Fig. III. Ein größerer Schwamm, mit länglichem am Rande ungleichem Hute.
Fig. IV. Ein entwickelter Schwamm, mit halbkugelrundem Hute nach ſeiner Unterfläche.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Hydnum flavidum Schaeff.
= repandum Linn.

ELVELAE.

Faltenſchwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE DECIMAE NONAE.

ELVELA TRICESIMA SECVNDA.

Eſt fungus ſeſſilis, bicolor, ſolitarius, cereus, fragilis, cyathiformis, ad oram varie exciſus. *Bauaris* nomen nullum.

Fig. I. Trias fungorum, quaſi connatorum.
Fig. II. III. Fungi variae figurae.
Fig. IV. Fungus maior cymbam referens.
Fig. V. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VI. Pollen natiuus.
Fig. VII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und neunzehenden Kupfertafel.

Der zwey und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein ſtielloſer, zweyfärbiger, einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, becherförmiger, am Rande verſchieden ausgezackter Schwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey Schwämme, die, wie zuſammengewachſen, nebeneinander ſtehen.
Fig. II. III. Schwämme von verſchiedener Bildung.
Fig. IV. Ein großer kahnähnlicher Schwamm.
Fig. V. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VI. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXIX.

Fig. II.

Fig. III.

Fig. I.

Fig. IV.

Fig. V.



Fig. VI.

Fig. VII.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

Tab. CCCXX.

Fig. I.

Fig. IV.

Fig. III.

Fig. II.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

ELVELA TRICESIMA TERTIA.

Eſt fungus bicolor, petiolatus, ſolitarius, cereus, fragilis, phalliformis, parum varius; capitulo membranaceo vel inflato vel compreſſo, plerumque mucronato; petiolo tereti, flexuoſo, quaſi contorto, baſi craſſiori, intus cauo. In *Bauaria* nomine inſignitus nullo.

Fig. I. Fungus bicuſpidatus.
Fig. II. Idem fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert und zwanzigſten Kupfertafel.

Der drey und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, beſtielter, einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, morgelähnlicher, wenig abänderlicher Schwamm; mit einem pergamenthäutigen, entweder aufgeblaſenen oder zuſammengedrückten, insgemein ſpitzig auslaufenden, Kopfe; mit einem runden, geſchlängelten, und gleichſam gewundenen, innwendig hohlen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein zweyſpitziger Schwamm.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE VICESIMAE PRIMAE.

ELVELA TRICESIMA QVARTA.

Eſt fungus ex minoribus, bicolor, petiolatus, ſolitarius, coriaceus; capitulo intus excauato & laeui, extus piloſo; petiolo tereti, laeui, intrinſecus cauo. Apud *Bauaros* nomen deeſt.

Fig. I. Fungus magnitudine naturali, a parte anteriori.
Fig. II. Idem fungus a parte poſteriori.
Fig. III. Idem fungus, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. V. VI. Fungi praecedentes, vitro aucti.
Fig. VII. Pollen natiuus.
Fig. VIII. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert ein und zwanzigſten Kupfertafel.

Der vier und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein kleiner, beſtielter, lederartiger Schwamm; mit einem inwendig ausgehöhlten und glatten, auswendig haarigen Kopfe; mit einem runden, glatten, geſchlängelten, inwendig hohlen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm in ſeiner natürlichen Größe, von der vordern Seite.
Fig. II. Eben derſelbe Schwamm, von der hintern Seite.
Fig. III. Eben derſelbe Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. VI. V. VI. Die vorigen Schwämme, vergrößert.
Fig. VII. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VIII. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXXI.

I. I. Rotermundt pinx. R.　　St. Loibel sc. R.

Tab. CCCXXII.



I. I. Rotermundt pinx. R. St. Loibel sc. R.

ELVELA TRICESIMA QVINTA.

Eſt fungus vnicolor, petiolatus, ſolitarius, cereus, fragilis, phalliformis, parum varius; capitulo membranaceo, compreſſo, parumque inflato, mucronato; petiolo compreſſo, extus coſtis longitudinalibus ſimplicibus donato, intus cauo & laeui. *Bauari* nomen neſciunt.

Fig. I. Fungus minor, capitulo bicuſpidato.
Fig. II. Fungus capitulo bicuſpidato, quaſi ſemilunato.
Fig. III. Fungus praecedens, ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IV. Fungus maior, capitulo bicuſpidato.
Fig. V. Pollen natiuus.
Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Der fünf und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, beſtielter, einzelner, wachsartiger, zerbrechlicher, morgeläḣnlicher, abänderlicher Schwamm; mit einem pergamenthäutigen, zuſammengedrückten, ſehr wenig aufgeblaſenen, ſpitzig auslaufenden Kopfe; mit einem zuſammengedrückten, außerordentlich rippigen, inwendig hohlen und glatten Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein kleiner Schwamm, mit zugeſpitztem Kopfe.
Fig. II. Ein Schwamm mit zweyſpitzigem, gleichſam halbmondförmigem Kopfe.
Fig. III. Der vorige Schwamm, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. IV. Ein großer Schwamm, mit zweyſpitzigem Kopfe.
Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.

ELVELA TRICESIMA SEXTA.

Eſt fungus ex minoribus, vnicolor, ceſpitoſus, raro ſolitarius, & ſeſſilis & petiolatus, lignarius, gelatinoſus, tremulus, omnium maxime varius; capitulo vel nullo vel hemiſphaerico, vel infundibuliformi, vel floriformi, ſupra laeui, infra plicato. In *Bauaria* nomen deeſt.

Fig. I. Truncus arboris, cuius parti truncatae, nec non lateribus, fungi variae figurae adnatae.

Fig. II. Fungus capitulo hemiſphaerico.

Fig. III. IV. V. VI. Varietates, petala floris imitantes.

Fig. VII. Fungi capitulis infundibuliformibus.

Der ſechs und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein kleiner, einfärbiger, vielfacher, ſelten einzelner, ſowohl ſtielloſer, als beſtielter, gallerigter, zitternder, ſehr veränderlicher Holzſchwamm; ohne oder mit einem, bald halbkugelrunden, bald trichterförmigen, bald blumenfärbigen, oben glatten, unten gefalteten Kopfe. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Baumſtock, deſſen abgeſtutztem Theile ſowohl, als deſſen Seiten, Schwämme von verſchiedener Geſtalt angewachſen ſind.

Fig. II. Ein Schwamm mit halbkugelrundem Kopfe.

Fig. III. IV. V. VI. Abänderungen, wie Blumenblätter.

Fig. VII. Schwämme mit trichterförmigen Köpfen.

Tab. CCCXXIII.

Fig. II.

Fig. III.

Fig. IV.

Fig I.

Fig. V.

Fig. VI.

Fig. VII.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

Tab. CCCXXIV.

Fig. I.

Fig. V.

Fig. II.

Fig. III.

Fig. VI.

Fig. IV.

I. I. Rotermundt pinx. R. *St. Loibel sc. R.*

VARIETATES ELVELAE ANTECEDENTIS CVM POLLINE.

Fig. I. Fungi connati, flori roſaceo, non diſſimiles; a parte ſuperiori & laeui.

Fig. II. Fungus petiolatus, a parte ſuperiori & laeui.

Fig. III. Idem fungus, a parte inferiori & plicata.

Fig. IV. Fungi figurae primae, a parte inferiori & plicata.

Fig. V. Pollen natiuus.

Fig. VI. Pollen vitro auctus.

Abänderung des vorigen Schwammes mit ſeinem Saamenſtaube.

Fig. I. Zuſammengewachſene Schwämme, die einer Roſe nicht unähnlich ſind; nach der obern und glatten Fläche.

Fig. II. Ein beſtielter Schwamm, nach der obern und glatten Fläche.

Fig. III. Derſelbe Schwamm, nach der untern und gefalteten Fläche.

Fig. IV. Die Schwämme der erſtern Figur, nach der untern und gefalteten Fläche.

Fig. V. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. VI. Der vergrößerte Saamenſtaub.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE VICESIMAE QVINTAE.

ELVELA TRICESIMA SEPTIMA.

Eſt fungus vnicolor, petiolatus, & ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus, varius florem plerumque infundibuliformem aemulans; capitulo lineis concentricis, a centro ad oram radiatis donato, ad oram varie inciſo, intus laeui, extus plicato; petiolo inuerſe conico, baſi truncato. *Bavari* nomen ignorant.

Fig. I. Fungus capitulo monopetalo, ad oram varie inciſo.
Fig. II. Fungus capitulo duplici.
Fig. III. Fungi plures conati.
Fig. IV. V. Varietate huius fungi.
Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. VII. Fungus quoad faciem inferiorem.
Fig. VIII. IX. Pollen natiuus & vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert fünf und zwanzigſten Kupfertafel.

Der ſieben und dreyßigſte Faltenſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, beſtielter, ſowohl einfacher, als vielfacher, lederartiger, abänderlicher, blumenähnlicher, insgemein trichterförmiger Schwamm; mit einem cirkelförmigen, von dem Mittelpuncte gegen dem Rande zu geſtrahlten, und mannigfaltig eingeſchnittenen, innen glatten, außen gefalteten Kopfe; mit einem umgekehrt kegeligen, unten abgeſchnittenen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Ein Schwamm, mit einblätterigem, am Rande mannigfaltig eingeſchnittenem, Kopfe.
Fig. II. Ein Schwamm, mit gedoppeltem Kopfe.
Fig. III. Mehrere zuſammengewachſene Schwämme.
Fig. IV. V. Abänderungen dieſes Schwammes.
Fig. VI. Ein Schwamm nach ſeiner Unterfläche.
Fig. VII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. VIII. IX. Der natürliche und vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXXV.

St. Loibel sc. R.

I. I. Rotermundt pinx. R.

CLAVARIAE.

Keulſchwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE VICESIMAE SEXTAE.

CLAVARIA DECIMA SEPTIMA.

Eſt fungus vnicolor, ceſpitoſus & ramoſus, coriaceus, farctus, carnoſus, figura admodum ſingulari. Nomen *Bauaris* eſt nullum.

Fig. I. Fungus ceſpitoſus & ramoſus.

Fig. II. Fungi, ad perpendiculum diſſecti.

Fig. III. Pollen natiuus.

Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert ſechs und zwanzigſten Kupfertafel.

Der ſechzehende Käulſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, vielfacher und äſtiger, lederartiger, voller und fleiſchiger Schwamm, von ſonderbarem Baue. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Der vielfache und äſtige Schwamm.

Fig. II. Schwämme, ſenkrecht zerſchnitten.

Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.

Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXXVI.

Fig. III.

Fig. I.

Fig. IV.

Fig. II.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.


Tab. CCCXXVII.
Fig. I.
Fig. II.
Fig. III.
Fig. IV.
Fig. V.
Fig. VI.
Fig. VII.
Fig. VIII.
Fig. IX.
Fig. X.
I. I. Rotermundt pinx. R.
St. Loibel sc. R.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE VICESIMAE SEPTIMAE.

CLAVARIA DECIMA OCTAVA.

Eſt fungus vnicolor, petiolatus, & ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus, farctus, carnoſus; capitulo & petiolo ſemper fere alio. Nomine in *Bavaria* inſignitur nullo.

Fig. I. Trias fungorum, capitulis conicis.
Fig. II — VII. Fungorum varietates, diuerſae figurae.
Fig. VIII. Fungus ad perpendiculum diſſectus.
Fig. IX. Pollen natiuus.
Fig. X. Pollen vitro auctus.

Erklärung der dreyhundert ſieben und zwanzigſten Kupfertafel.

Der achtzehende Käulſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, beſtielter, ſowohl einzelner, als häufiger, lederhafter, voller, fleiſchiger Schwamm; mit einem faſt allezeit anders geſtalteten Kopfe und Stiele. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Drey Schwämme, mit kegeligen Köpfen.
Fig. II — VII. Abänderungen, von verſchiedener Geſtalt.
Fig. VIII. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.
Fig. IX. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. X. Der vergrößerte Saamenſtaub.

CLAVARIA DECIMA NONA.

Eſt fungus bicolor, ſeſſilis, ceſpitoſus, coriaceus, farctus, carnoſus, lignarius, apice acuminatus. In *Bauaria* nomen datur nullum.

Fig. I. Fungi fruſtulo ligni inſidentes.
Fig. II. Iidem fungi ad perpendiculum diſſecti.
Fig. III. Pollen natiuus.
Fig. IV. Pollen vitro auctus.

Der neunzehende Käulſchwamm.

Es iſt ſolcher ein zweyfärbiger, ſtielloſer, häufiger, lederartiger, voller, fleiſchiger und ſpitzig auslaufender Holzſchwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. Schwämme, wie ſie einem Stückgen Holze aufſitzen.
Fig. II. Dieſelben Schwämme, ſenkrecht zerſchnitten.
Fig. III. Der natürliche Saamenſtaub.
Fig. IV. Der vergrößerte Saamenſtaub.

Tab. CCCXXVIII.

Fig. I.

Fig. III

Fig. IV.

Fig. II.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

LYCOPERDA.

Staubſchwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE VICESIMAE NONAE.

LYCOPERDON DECIMVM QVINTVM.

Eſt fungus vnicolor, ſeſſilis, vix petiolatus, globoſus vel deformis, lignarius, durus; interne quoad maximam partem farctus, in centro cauus. *Bauaris* anonymus.

Fig. I. II. III. V. VI. Fungi variae figurae.

Fig. IV. Fungus ad perpendiculum diſſectus.

Erklärung der dreyhundert neun und zwanzigſten Kupfertafel.

Der funfzehende Staubſchwamm.

Es iſt ſolcher ein einfärbiger, ſtielloſer, oder doch ſehr wenig beſtielter, rundlicher oder ungeſtalteter, harter, innwendig meiſt voller, in der Mitten aber hohler, Holzſchwamm. Hat in Bayern keinen Namen.

Fig. I. II. III. V. VI. Schwämme von verſchiedener Geſtalt.

Fig. IV. Ein ſenkrecht zerſchnittener Schwamm.

Tab. CCCXXIX.

I. I. Rotermundt pinx. R.

St. Loibel sc. R.

PHALLI.

Morgelſchwämme.

EXPLICATIO TABVLAE TRECENTESIMAE TRICESIMAE.

PHALLVS SEXTVS.

Eſt fungus volua exceptus, tricolor, parum varius; pileo obtuſe conico, reticulato, viſcido pollinifero obducto; petiolo cylindraceo, cereo, celluloſo. In *Bauaria* hunc fungum ipſe quidem numquam vidi, alii autem eum ſaepius inueniſſe me certiorem fecerunt.

Fig. I. II. III. IV. Voluae, fungum includentes, variae figurae.

Fig. V. VI. VII. VIII. Fungi ex volua erumpentes, & iam explicati, & viſcido pilei orbati.

Erklärung der dreyhundert und dreyßigſten Kupfertafel.

Der ſechſte Gichtſchwamm.

Es iſt ſolcher ein dreyfärbiger, wenig veränderlicher Eyſchwamm; mit einem ſtumpfkegeligen, gegitterten, oben nabeligen, und mit einem beſaamigt klebrigen Weſen überdeckten Hute; mit einem runden, wachsartigen, grubigen Stiele. Hat in Bayern keinen Namen. Ich ſelbſt habe zwar dieſen Schwamm in Bayern nie angetroffen; deſto mehrer aber iſt mir von Andern verſichert worden, ihn öfters geſehen zu haben.

Fig. I. II. III. IV. Eyer, in welchen der Schwamm noch eingeſchloſſen, von verſchiedener Geſtalt.

Fig. V. VI. VII. VIII. Schwämme, welche theils aus dem Eye ausbrechen, theils völlig ausgewachſen ſind, theils das klebrige Weſen am Hute verloren haben.

Tab. CCCXXX.



I. I. Rotermundt p. R. EX BIBLIOTHECA TREVERIANA. St. Loibel sc. R.

INDEX PRIMVS.

SYNONYMA ET AVCTORES.

Erſtes Regiſter.

Beynamen und Schriftſteller.

AGARICI.

I.

AGARICVS VIRIDVLVS. Grüngelblichter Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. I.

Agaricus caulescens, plerumque ceſpitoſus; pileo luteo, hemiſphaerico, ſplendente, ad oras caeruleo-viridi, margine filamentoſo; lamellis inaequalibus pallide rufeſcentibus; petiolo pallide luteo, procero, baſi craſſiuſculo, tenuiter ſquamoſo, fiſtuloſo; annulo membranaceo, perſiſtente; velo filamentoſo.

Amanita annulatus, pileo conuexo caeruleo-viridi, lamellis roſeo-caeruleis. Hall. hiſt. n. 2444.

Fungus paruus pileolo cucullato viſcido, intenſe viridi & quaſi vernice oblito. Mich. nou. gen. pl. p. 152.

Fungus viridis, ora ſtriata, pediculo annulato & lamellis albis. Hall. enum. helu. p. 40. n. 29. Rupp. hall. p. 366?

Fungus medius, pileo muco aeruginei coloris obducto. Dill. ſyn. III. p. 6. n. 30?

Fungus non veſcus VI. Loeſel. pruſs. p. 89?

Nota: annulum fugacem album eſſe perhibet Ill. Hallerus, qui in noſtro perſiſtens eſt & nigricans.

In ſyluis montoſis autumno reperitur.

Der Hut dieſes Schwammes iſt hellgelb, gegen dem Rand blau-grünlicht, am Rande faſerig, über und über glänzend; die Blätter blaßröthlich, ungleich; der Stiel blaßgelb. Der Ring ſchwärzlich.

Wird im Herbſt in bergigten Waldungen gefunden.

II.

AGARICVS CONICVS. Kegelförmiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. II.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, pileo obtuſe conico, non carnoſo, croceo-coccineo, demum flaueſcente; lamellis flauis; petiolo tereti, procero, ſubtiliter ſtriato, ſubtortili, fiſtuloſo, flauo; velo & annulo deſtitutus, in ſenio totus nigreſcens.

Agaricus conicus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 443. n. 1525?
Amanita paluſtris, ſanguinei coloris. Dill. cat. gieſſ. p. 180?
Amanita glutinoſus flauus, pileo vmbonato. Hall. hiſt. n. 2420.
Fungus pileo obtuſe conico, coccineus, ora lamellarum flaua. Hall. enum helu. p. 48. n. 67. Rupp. hall. p. 368.
Fungus aureus, capitulo in conum abeunte. Vaill. pariſ. p. 67. n. 49.
Fungus paruus lubricus aureus, lamellis raris amplioribus &c. Mich. nou. gen. pl. 147. n. 64.
Syluarum incola autumno reperiundus.

Der Hut dieſes Schwammes iſt im Ausſchlieſen hochroth, hernach mehr ſafrangelb, und endlich wird er ſammt dem ganzen Schwamme ſchwarz; die Blätter ſind lichtgelb; der Stiel anfangs pomeranzenfarb, hernach lichtgelb.
Wird im Herbſt in Wäldern gefunden.

III.

AGARICVS VIOLACEVS. Veyelfarbiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. III.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, punctato, violaceo-fuſco; margine dilute violaceo, tomentoſo; lamellis fuluis, margine pallide purpureis; petiolo ſolido, craſſo, baſi bulboſo, dilute violaceo; velo filamentoſo fugaci; annulo nullo.

Agaricus violaceus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 421. n. 1470. var. I. Pileo violaceo; lamellis rufeſcentibus.
Agaricus pileo conuexo glabro; ſtipite bulboſo annulato pleno; annulo filamentoſo. Scop. fl. carniol. I. p. 11. n. 17.
Agaricus (*violaceus*) ſtipitatus, pileo rimoſo; margine violaceo tomentoſo; ſtipite caeruleſcente; lana ferruginea. Linn. fl. ſuec. I. n. 1067. II. n. 1226. ſpec. plant. I. p. 1173. II. p. 1641. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 10.
Amanita violaceus; petiolo bulboſo annulato; pileo plano. Hall. hiſt. n. 2455.
Amanita pediculo bulbiformi, pileo fuſco, lamellis & pediculo obſcure violaceis. Dill. cat. gieſſ. p. 181. Berg. viadr. p. 366.
Fungus lamellis fuluis, pileo conuexo terreo, annulo fugaci. Hall. enum helu. p. 53. n. 93. Rupp. hall. p. 370.

Fungus

Fungus bulboſus, pileolo complanato liuido-fuſco, ad oras dilute violaceo, lamellis fuluis, pediculo ſupernae limbi pilei parti concolore, annulo non durabili ornato. Mich. nou. gen. plant. p. 181.

Fungus maior violaceus. Vaill. pariſ. p. 67. n. 45.

Ad ſepes & margines ſyluarum reperitur Septembri & Octobri menſibus.

Der Hut dieſes Schwammes iſt in der Mitte faſt braun, am Rande aber violet; die Blätter licht kaſtanienbraun, am Rande etwas purpurfärbig; der Stiel hell-violet.

Wird auſſen an Wäldern und um die Zäune im September und October gefunden.

IV.

AGARICUS CROCEUS. Safrangelber Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. IV.

Agaricus cauleſcens, ſaepe ceſpitoſus, parum carnoſus, ſiccus; pileo conuexo, ſaturate croceo; lamellis flauis; craſſis, petiolo tereti, tortili, fiſtuloſo, flauo; velo filamentoſo; annulo nullo.

Agaricus flammeo-croceus, demum flaueſcens; pileo conuexo; ſtipite cylindrico, fiſtuloſo, nudo. Scop. fl. carniol. I. p. 17. (e.) ?

Amanita flauus, viſcidus, pileolo conico. Hall. hiſt. n. 2421 ?

Amanita leoninus ſericeus. Idem. n. 2431.

Fungus paruus, campeſtris, luteus, pileolo hemiſphaerico, pediculo longiore. Mich. nou. gen. pl. p. 147 ?

Ad agaricum ictericum retulit Clariſſ. Scopoli in flora carniolica altera, P. II. p. 439. n. 1514. ſed noſter annulo caret, quem tamen icterico ſuo attribuit, vti etiam, quem ibidem citat, Michelius; nec petiolus noſtri plenus eſt, ſed fiſtuloſus.

Autumno in pratis montoſis occurrit.

Der Hut dieſes Schwammes iſt dunkel ſafran- oder pomeranzenfarbig. Die Blätter hellgelb, wie auch der Stiel.

Man findet ihn im Herbſt auf bergigen Wieſen.

V.

AGARICUS LACTIFLUUS. Der Brödling.

Tom. I. Tab. V.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; ſucco lacteſcente dulci; pileo planiuſculo rufo-brunneo; lamellis rufeſcentibus; petiolo baſi craſſiore, ſolido, carneo-rufo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus teſtaceus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 453. n. 1558.

Agaricus ferrugineus; pileo concauo, albo & dulci lacte turgido; lamellis ramoſis; ſtipite cylindraceo, breui. Scop. fl. carn. I. p. 35. (d).

Agaricus (*lactifluus*) pileo plano carneo, ſucco lactefcente, lamellis rufis, ſtipite longo carneo. Linn. fl. lapp. 484. fl. ſuec. I. 1069. II. 1218. ſpec. plant. I. p. 1172. II. p. 1641. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 7.

Fungus flauo-rufus, in medio depreſſus, lacte non acri manans. Hall. enum. helu. p. 50. n. 80. Rupp. hall. p. 369.

Fungus paruus; pediculo & ſuperna parte pileoli ferrugineis; lamellis rufis; lacteum & dulcem ſuccum fundens. Mich. nou. gen. pl. p. 141. ſecundum Scopoli fl. carn. I. cit. ſed tempus differt, quod Michelius Maium menſem eſſe perhibet. Eſt potius

Fungus paruus, lacteum & dulcem ſuccum fundens, pediculo & ſuperna parte pileoli rufeſcentis coloris, lamellis vero eiusdem, ſed paullo remiſſioris. Mich. l. cit. p. 142. Sed noſter paruus non eſt.

Fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem ſuccum fundens. C. Bauh. pin. p. 371. n. 17.

In ſyluis non rarus Auguſto & Septembri menſibus.

Der Hut dieſes Schwamms iſt rothbraun, die Blätter blaßroth, der Stiel ebenfalls röthlich von mittlerer Farbe zwiſchen dem Hut und Blättern.

Wird häufig in Wäldern im Monath Auguſt und September angetroffen.

VI.

AGARICVS TRVNCORVM. Gelblicher Kappenſchwamm.

Tom. I. Tab. VI.

Agaricus cauleſcens, ceſpitoſus, vix carnoſus; pileo luteo hemiſphaerico, per aetatem campanulato ac tandem lacero; lamellis pallidis, polline nigreſcente infectis, demum deliqueſcentibus; petiolo procero, pallido, fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus truncorum. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 426. n. 1480.

Agaricus ceſpitoſus; pileo campanulato, obſolete flauo, puluerulento, ſtriato, vertice laeui, tumido; lamellis demum atris diffluentibus; ſtipite cylindraceo, fiſtuloſo, procero, candicante. Scop. fl. carniol. I. p. 23. n. 29. (a).

Fungus ex vno pede multiplex; pileolo galericulato, rufo-fuluo; vertice laeui, reliqua parte ſtriato, ſubtus lamellis nigricantibus, pediculo albo fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. p. 195. tab. 79. fig. 5.

Fungus paruus galericulatus alter flauus. C. Bauh. pin. 373.

In ſyluis, agris & hortis, ad arborum emortuarum & lignorum putridorum truncos ſero autumno reperitur.

Der Hut dieſes Schwammes iſt anfangs dunkelgelb, am Rand etwas blaſſer, von Figur halbrund, wie eine Kappe. Wird hernach glockenförmig, und endlich am Rande zerſpalten. Die Blätter ſind blaßgelb, mit ſchwärzlichem Saamenſtaube beſchmuzt und vergehen im Alter. Der Stiel iſt ebenfalls blaßgelb.

Wird in Wäldern, Aeckern und Gärten an abgeſtorbenen Bäumen und auf faulen Holzſtöcken im ſpäten Herbſt angetroffen.

VII.

AGARICVS OVATVS. Eyförmiger Miſtſchwamm.

Tom. I. Tab. VII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, voluatus, parum carnoſus; pileo ouato, ſquamoſo, ſtriato, cinereo, tandem campanulato, lacero; lamellis vmbrinis, per aetatem nigreſcentibus, diffluentibus; petiolo procero, fiſtuloſo, albo, baſi roſtrato; annulo perſiſtente; velo nullo; volua ouata ſquamoſa.

Agaricus ouatus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 425. n. 1479.

Agaricus ceſpitoſus; pileo ouato ſtriato; lamellis diffluentibus; ſtipite cylindrico, fiſtuloſo, annulato, longo; annulo fugaci. Scop. fl. carniol. I. p. 23. n. 28. (b). Iuditio quidem Clariſſ. Scopoli; ſed noſter manifeſte differt, cum ſolitarius ſit, nec ceſpitoſus, & pilei vertex in noſtro non rufeſcat.

Agaricus (*fimetarius*) ſtipitatus, pileo campanulato lacero, lamellis nigris lateraliter flexuoſis, ſtipite fiſtuloſo. Linn. fl. ſuec. II. n. 1215. ſpec. plant. I. p. 1175. II. p. 1643. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 18.

Amanita albus, campanulatus, ſquamoſus, nigreſcens. Hall. hiſt. n. 2357.

Fungus bombaceus pernicioſus. Sterb. theatr. fung p. 226. n. 84. t. 24. B.

Fungus albus ouum referens. Raj. ſyn. p. 5. n. 22. Buxb. cent. IV. tab. XXVII.

Fungus in arenoſis naſcens ex vno pede multiplex; pileolo cucullato e glauco argenteo, ſplendente; inferne lamellis amplioribus, nigris; pediculo fiſtuloſo, candido; radice roſtrata. Mich. nou. gen. plant. p. 200?

Hydrophori A. B. C. Battar. fung. arim. p. 53. 54. tab. XXVI.

In ruderoſis & arenoſis humidis autumnali tempore reperiundus.

Hut und Stiel weißgrau; die Blätter anfangs bräunlich, zuletzt ſchwarz.

Wird im Herbſt an ſandigen, feuchten Orten und auf Schutt angetroffen.

VIII.

AGARICVS CYLINDRICVS. Walzenförmiger Miſtſchwamm.

Tom. I. Tab. VIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, voluatus, non carnoſus; pileo ſquamoſo, ſtriato, cinereo, cylindraceo-conico, tandem campanulato, lacero; lamellis vmbrinis, per aetatem nigreſcentibus, diffluentibus; petiolo procero, fiſtuloſo, albo, baſi bulboſo; annulo fugaci; velo nullo; volua ſquamoſa, oblonga.

Ad agaricum ouatum pariter refert Clariſſ. Scopoli fl. carniol. II. P. II. p. 425. n. 1479. Sed quod vere differat, patebit conferenti characteres. Huic voluae & primum euoluti pilei figura oblonga & pene cylindrica, vertex rufeſcens, petioli baſis bulboſa, annulus fugax; illi volua & pileus nouellus figura ouata, vertex non rufeſcens, petiolus baſi roſtratus, annulus perſiſtens. Conueniunt vero vterque volua & pileo ſquamoſis, pilei

& lamellarum deliquio, connexione pilei per filum in medio petioli fiſtuloſi. Num vero ſufficiant haec pro diſtincta ſpecie, in tanto Virorum Clariſſimorum circa fungos diſſenſu non determino.

Dieſes Schwammes Hut iſt ebenfalls weißlich, wie des vorigen, aber oben am Wirbel bräunlich. Die Farbe der Blätter und des Stieles kommt ebenfalls überein. So wachſen auch beyde zu einer Zeit und an einem Orte.

IX.

AGARICVS MVTABILIS. Stockſchwamm.

Tom. I. Tab. IX.

Agaricus cauleſcens, ceſpitoſus; pileo luteo, mutabili; lamellis congeſtis fuluis; petiolo tereti, ſuperne albido; inferne fuſco, ſquamoſo; annulo perſiſtente imperfecto; velo filamentoſo.

Agaricus mutabilis. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 440. n. 1515.

Agaricus luteus; pileo conuexo; lamellis congeſtis; ſtipite nudo cylindraceo, pleno. Scop. fl. carniol. I. p. 19. var. a.

Agaricus ex vna baſi multiplex, pileolo plano, petiolo annulato cylindraceo. Gled. fung. p. 131. n. XXVIII.

Amanita faſciculoſa lutea dumetorum. Dill. cat. gieſſ. p. 186. Berg. viadr. p. 364?

Fungus eſculentus totus luteus, ex vno pede multiplex, pediculo longo, cylindrico, annulato. Mich. nou. gen. plant. p. 197.

Fungi ſpecies altera. J. Bauh. hiſt. III. p. 835. cap. 33.

Occurrit in hortis, ad ſepes & ad truncos arborum, autumnali tempore.

Der Hut fällt vom Gelben in das Ziegelfärbige; die Blätter ſind hellbraun; der Stiel ober dem Ring ſchmuzigweiß, untenher bräunlicht.

Wird im Herbſt gefunden in Gärten, an den Zäunen und auf alten Holzſtöcken.

X.

AGARICVS CERVINVS. Rehfarbiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. X.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, paulo carnoſus, pileo ceruino, primum faſtigiato, dein fere hemiſphaerico, ſtriato; lamellis pallide teſtaceis; petiolo ſolido, exalbido, ſtriato, baſi tuberoſo; velo & annulo deſtitutus.

In lignis putridis occurrit.

Der Hut iſt oberwärts rehfarb, die Blätter ganz licht gelbröthlich, der Stiel weißlich.

Wächſt auf faulem Holze.

XI.

AGARICVS DELICIOSVS. Eßbarer Hirſchling oder Reizker.

Tom. I. Tab. XI.

Agaricus cauleſcens, plerum ſolitarius, carnoſus; ſucco croceo acri ſcatens; pileo hemiſphaerico in centro depreſſo & in margine fornicato, lateritio: faſciis concentricis alternis pallidioribus; lamellis ramoſis concoloribus; petiolo cylindrico, maculato, breui, craſſo, aliquatenus fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus delicioſus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 451. n. 1552.

Agaricus lateritii coloris, pileo concauo, croceo & acri lacte turgido, lamellis ramoſis; ſtipite cylindrico, maculato, breui. Scop. fl. carniol. I. p. 35. (e).

Agaricus pileolo hemiſphaerico, in centro depreſſo & in margine fornicato; petiolo breui & craſſo. Gled. fung. p. 101. n. XI. comprehendit ſequentem & alios, quos Germani Reizker aut Hirſchling vocant.

Agaricus (*delicioſus*) ſtipitatus; pileo teſtaceo; ſucco luteſcente. Linn. ſpec. pl. I. p. 1172. II. p. 1641. fl. ſuec. II. 1211. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 6.

Amanita fuluus, lacte croceo. Hall. hiſt. n. 2419. δ.

Amanita lateritii coloris, croceo ſucco turgens. Dill. cat. gieſſ. p. 179. Berg. viadr. p. 365.

Fungus eſculentus, lateritio colore immutabili, ſuccum acrem & croceum fundens, pediculo breuiori. Mich. nou. gen. plant. p. 141.

Fungus veſcus II. Loeſ. pruſſ. 179.

Omphalomyces acris, lateritii coloris. Battar. fung. arim. t. 16. H.

In ſyluis & ericetis Auguſto potiſſimum menſe reperitur.

Nota: Color huius fungi interdum pro varia aetate eiusdem variat, pallidior & viridescens eſt, petiolus ſaepe intra terram occultatur. In deliciis habetur.

Die Farbe dieſes Schwamms iſt veränderlich, insgemein ziegelfarb mit abwechſelnden hellern und dunklern Kreiſen, öfters aber auch blaß ziegelfarb und grünlich. Die Blätter ſind dunkler ziegelfarb, der Stiel ebenfalls ziegelfarb und gefleckt, öfters in der Erde verſteckt.

Man trift ihn im Monathe Auguſt in Wäldern und auf Heyden an, und ſpeißt ihn als ein Leckerbißlein.

XII.

AGARICVS TORMINOSVS. Giftiger uneßbarer Hirſchling oder Reizker, Birken-Reizker.

Tom. I. Tab. XII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, ſucco croceo acri ſcatens; pileo hemiſphaerico, lateritio in centro depreſſo & in margine fornicato, piloſo, ſtriato; faſciis concentricis alternis pallidioribus; lamellis ramoſis flauis; petiolo cylindrico breui & craſſo lateritio; velo piloſo; annulo nullo.

Agari-

Agaricus pileolo hemiſphaerico, lateritii coloris dilutioris, margine fornicato, lanuginoſo; lamellis cum longiore petiolo candidis. Gled. fung. p. 101. n. XI. var. a.

Amanita fuluus, lacte croceo. Hall. hiſt. n. 2419. γ.

Fungus perniciosus, lateritio colore varians, ſuccum acrem & croceum fundens, pediculo breuiore. Mich. nou. gen. plaut. p. 141. Hall. enum. helu. 49. n. 73.

Fungus abietinus, oris reflexis, ſubſtantia rubra. C. Bauh. pin. 374. Rupp. hall. p. 368 ?

Cum praecedente eſculento confundunt Linnaeus aliique.

In ſyluis & ericetis toto autumno conſpicitur.

Differt a praecedente pilei margine piloſo, colore dilutiore, carne poroſa, ſapore feruido, lamellis & petiolo pallidioribus, velo piloſo. Venenatus diarrhoeas cum torminibus excitans.

Dieſer Schwamm unterſcheidet ſich vom vorhergehenden eßbaren durch den am Rande haarigen, geſtrichelten Hut, durch die blaſſere Farbe, hitzig beiſſenden Geſchmack, löcherigtes Fleiſch und haarige Saamendecke. Er verurſachet Grimmen und Durchfall.

Wird den ganzen Herbſt durch in Wäldern und auf Heyden gefunden.

XIII.

AGARICVS LACCATVS. Lackrother Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XIII.

Agaricus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo pallide purpureo, valde mutabili; lamellis fere concoloribus, ſubdecurrentibus, craſſiuſculis, apice ſubramoſis; petiolo tereti, procero, debili, fiſtuloſo, concolore; velo nullo; annulo nullo vel imperfecto.

Agaricus laccatus. Scop. fl. carniol. II, P. II, p. 448. n. 1530.

Agaricus pileolo hemiſphaerico integerrimo, lamellis ampliſſimis laxe diſpoſitis, petiolo nudo & cauo. Gled. fung. p. 95. n. IX.

Amanita petiolo fiſtuloſo lineato, pileo conuexo flauo-rufo. Hall. hiſt. n. 2436.

Fungus ſiccior, puluinatus, rufus, lamellis rarioribus. Hall. enum. helu. p. 49. n. 74?

Fungus paruus, eſculentus, odoratus, coriaceus, rufus, lamellis inter ſe longe diſtantibus. Mich. nou. gen. pl. p. 148. n. 3 ?

Fungus multiplex ſordide carneus. Vaill. pariſ. p. 66. n. 36.

In pratis montoſis Maio menſe reperiundus.

Der Hut dieſes Schwamms iſt ſehr veränderlich; bald in der Mitte vertieft, bald am Rande geſpaltet, bald ordentlich erhoben, blaß lackroth, oder wie gewäſſerter rother Wein; die Blätter und der Stiel ſind etwas lichter.

Wird im Frühjahr auf bergigten Wieſen angetroffen.

XIV.

AGARICVS MVLTIFORMIS. Vielgeſtaltiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XIV.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo terreo-fuſco multiformi; lamellis ſordide albis; petiolo tereti, ſaepe tortili, pleno, albido, fuſceſcente; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus pileo plano lacero anguſto, petiolo cylindraceo tenui. Gled. fung. p. 112.
Amanita petiolo farto gracili, pileo plano murino ſericeis lineis ſtriato, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2381.
Fungus eſculentus, pileo deſuper cinereo aut murino & in filamenta quaſi lacerato, inferne candido & tenuiſſime lamellato, pediculo plerumque candido. Mich. nou. gen. pl. p. 155. n. 11. & 12.
Fungus eſculentus, pileolo fornicato, tenuioris ſubſtantiae, ſuperne obſcuro, inferne lamellis albis, pediculo longo, cylindrico, non fiſtuloſo, concolore. Mich. nou. gen. pl. p. 154. n. 8.
Occurrit in ſyluis verno tempore.

Der Hut iſt faſt erdfarb, oder dunkel maußfarb, die Blätter ſchmutzig weiß, der Stiel weißlicht, mit etwas braun.
Wird im Frühjahr in Wäldern gefunden.

XV.

AGARICVS EMETICVS. Der Speytäubling oder Speyteufel.

Tom. I. Tab. XV. & XVI.

Agaricus caulescens, ſolitarius; carne ſicca, laxa, alba; pileo planiuſculo, in centro depreſſo, in margine rugoſo, ſtriato; lamellis craſſis, baſi transverſim rugoſis; petiolo cylindrico, breui, craſſo, pleno; velo & annulo deſtitutus.

Nota: Color pilei, lamellarum & petioli ludit. Hinc

a) Agaricus emeticus, pileo coccineo; lamellis & petiolo flaueſcentibus. Tab. XV. f. 1. 2. 3.
b) Agaricus emeticus, pileo coccineo; lamellis albis; petiolo rubello. Tab. XV. f. 4. 5. 6.
c) Agaricus emeticus, pileo cum ſordida rubedine flauo; lamellis & petiolo exalbidis. Tab. XVI. f. 1. 2. 3.
d) Agaricus emeticus, pileo pallide aurantio: medio brunneo; lamellis & petiolo flaueſcentibus. Tab. XVI. f. 4.
e) Agaricus emeticus, pileo viridi-luteo ad marginem rubello; lamellis & petiolo flaueſcentibus. Tab. XVI. f. 5.
f) Agaricus emeticus, pileo pallide rubente, lamellis & petiolo flaueſcentibus. Tab. XVI. f. 6.
Agaricus Ruſſula. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 485. n. 1502.
Agaricus pileo plano; lamellis baſi tranſuerſim rugoſis; ſtipite cylindraceo, nudo. Scop. fl. carniol. I. p. 8. n. 11.

Amanita petiolo farto; pileolo conuexo, umbilicato; oris rugoſis; lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2374. β.

Fungus ſubtus niueus, breui petiolo, pileo ad oras rugoſo, varii coloris. Hall. enum. helu. 39. n. 27. Rupp. hall. p. 366. hunc cum aliis umbilicatis eſculentis. Tab. LVIII. LXXV. LXXXIII. XCII XCIII. & XCIV. conjungunt.

Fungus vmbilicum referens. C. Bauh. pin. 370.

Fungorum ſub Populo naſcentium, qui Turini vocantur, ſubrubentium, pediculo candido, qui in cibis minime probantur. Cæſalp.

In ſyluis humidioribus autumno prouenit.

Dieſer Schwamm iſt an Farbe ſehr verſchieden, als:

1) Mit hochrothem Hute, gelblichen Blättern, und röthlichem Stiele.
2) Mit hochrothem Hute, weiſſen Blättern, und röthlichem Stiele.
3) Mit braunröthlich und gelbem Hute, weißlichten Blättern und Stiele.
4) Mit blaß pomeranzenfärbigen, in der Mitte braunem Hute, gelblichen Blättern und Stiele.
5) Mit grüngelbem am Rande röthlichem Hute, gelblichen Blättern und Stiele.
6) Mit blaßrothem Hute, gelblichen Blättern und Stiele.

Wächſt in feuchten Wäldern im Herbſte.

XVI.

AGARICVS FVSCESCENS. Bräunlichter Waſſerſchwamm.

Tom. I. Tab. XVII.

Agaricus caulescens, ceſpitoſus, vix carnoſus, hydrophorus; pileo multiformi, primum ſubconico, poſtea campanulato, tandem planiuſculo, medio faſtigiato, fuſceſcente, margine griſeo, tandem lacero, reuoluto; lamellis obſcure ceruinis, demum fuſcis; petiolo tereti, curuo, fiſtuloſo, albido; annulo fugaci; velo nullo.

Fungus viſcidus, pileolo fornicato, deſuper rufo-pallido, lamellis ochroleucis, pediculo longo, cylindrico, albicante, ac annulo momentaneo cincto. Mich. nou. gen. plant. p. 180?

In ſyluis humidis inter muſcos autumno inuentus.

Der Hut dieſes Schwammes iſt veränderlich, von Farbe in der Mitte lichtbraun, gegen den Rand grau, die Blätter dunkel rehfarb, zuletzt ſchwarzbraun, der Stiel weißlicht.

Iſt in feuchten Wäldern unter dem Mooſe im Herbſt zu finden.

XVII.

AGARICVS EXCORIATVS. Abgeſchälter Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XVIII. & XIX.

Agaricus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo amplo albide teſtaceo; medio ſubconico; margine fornicato, lacero, filamentoſo,

toſo; lamellis inaequalibus albidis; petiolo tereti, procero, voluato, fiſtuloſo, albido: baſi bulboſo; annulo peculiari pilei inſerto; velo nullo; annulo perſiſtente & fugaci.

Amanita petiolo procero annulato, pileo & lamellis ceruinis. Hall. hiſt. n. 2402.
Ab agarico procero Tab. XXII. & XXIII. cui valde ſimilis eſt, differt pileo magis pallido, cute magis in medio integra nec papillato-ſtriata, in margine tantum lacera, petiolo non tam procero, nec maculato, annulo ſaepe fugaci; conuenit vero cum illo pilei figura & inſertione petioli, lamellis inaequalibus, loco natali & tempore.

Dieſer Schwamm unterſcheidet ſich von dem folgenden hochſtieligen Blätterſchwamm Tab. XXII. und XXIII. durch die blaſſere Farbe des weniger zerriſſenen Hutes, den weniger hohen ungefleckten Stiel und den öfters unbeſtändigen Ring; doch ſtimmt die Figur des Hutes, die Einſenkung des Stiels, die Ungleichheit der Saamenblätter nebſt Zeit und Ort mit ſelbigem ſehr überein.

XVIII.

AGARICVS CITRINVS. Gelber Fliegenſchwamm.

Tom. I. Tab. XX.

Agaricus caulescens, ſolitarius; pileo orbiculato, margine ſtriato, pallide citrino; verrucis croceis; lamellis dimidiatis ſolitariis flauis; petiolo tereti, citrino, voluato, pleno: apice dilatato: baſi ſquamoſo, bulboſo: annulo perſiſtente ac velo membranaceis.

Cum agarico muſcario Tab. XXVII. excepto colore in reliquis characteribus conuenit vti & tempore locoque.

Dieſer Schwamm unterſcheidet ſich von dem gemeinen Fliegenſchwamm der XXVIIſten Kupfertafel blos durch die Farbe und kommt übrigens mit ſelbigem dem Baue, der Zeit und Ort nach überein.

XIX.

AGARICVS GRANVLATVS. Chagrinartiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXI.

Agaricus caulescens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo aurantio, granulis quaſi adſperſo, medio faſtigiato, verſus marginem flauo, ſtriato, carnoſo; lamellis flauis plurimis; petiolo tereti, pleno, flauo, punctato-variegato; velo & annulo deſtitutus.

Creſcit in ſyluis montoſis aeſtate exeunte.

Der Hut iſt am Rande gelb, in der Mitte pomeranzenfarbig, faſt roth; die Blätter ebenfalls gelb, ſo wie auch der mit etwas dunklerer Farbe geſtrichelte Stiel.

Wächſt zu Ausgang des Sommers in bergigten Wäldern.

XX.

AGARICVS PROCERVS. Hochſtieliger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXII. & XXIII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, parum carnoſus; pileo albido, fuſceſcente, fuſco-papillato, amplo; medio ſubconico, margine fornicato, lacero, filamentoſo; lamellis inaequalibus, albis; petiolo tereti, procero, ſquamoſo, voluato, fiſtuloſo, baſi bulboſo, annulo peculiari pilei inſerto; velo nullo; annulo perſiſtente.

Agaricus procerus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 418. n. 1465.
Agaricus pileo plano papillari; ſtipite conuergente procero, annulato, fiſtuloſo, annulo peculiari inſerto. Scop. fl. carniol. I. p. 6. n. 6.
Agaricus pileo papillari ampliſſimo, in margine fornicato, lacero, tomentoſo; petiolo annulato, procero, interius tumido; pilei acetabulo inſerto. Gled. fung. p. 114. n. 20.
Agaricus (*clypeatus*) ſtipitatus, pileo hemiſphaerico viſcido acuminato, lamellis albis, ſtipite longo cylindrico albo. Linn. fl. lapp. 506. fl. ſuec. I. n. 1057. II. n. 1216. ſpec. plant. I. p. 1174. II. p. 1642. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 16. Dalib. pariſ. p. 373.
Amanita petiolo procero, ſquamoſo, annulato, pileo conico, ſquamoſo, ſubſpadiceo, laminis albis. Hall. hiſt. T. III. p. 190. n. 2366. & 2371.
Amanita ſicca & leuis, pileo magno, plano, orbiculari, pediculo longo, plerumque bulbiformi. Dill. cat. gieſſ. p. 180. Berg. viadr. p. 361.
Fungus procerus, papillaris, terreus, ſtriatus, ſubtus albus. Hall. enum. helu. p. 42. Rupp. hall. p. 366.
Fungus coronatus aut marmoreus. Sterb. theatr. fung. p. 77. tab. 7. fig. A.
Fungus pileolo lato, longiſſimo pediculo variegato. C. Bauh. pin. 371.
In ſyluis & paſcuis ſiccioribus inter Ericas & Vaccinia occurrit Auguſto & Septembri.

Dieſes Schwammes Hut iſt bräunlichweiß, rothbraun geſprenkelt, zumalen gegen die Mitte, am Rande faſerig; die Blätter weiß, der Stiel beynahe von eben der Farbe, wie der Hut.

Man findet ihn im Auguſt und September, in trockenen Wäldern, auf Heyden und trockenen Viehtriften.

XXI.

AGARICVS SERICEVS. Seidenartiger Eyſchwamm.

Tom. I. Tab. XXIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo aurantio, conuexo, ſtriato; lamellis flauis; ſtipite tereti, breui, pleno, baſi tuberoſo, voluato, flauo; velo filamentoſo; annulo nullo.

Fungus ſericeus, nitens, flauus. Hall. enum. helu. p. 47. n. 62.
In ſyluis montoſis autumno reperitur.

Der

Der Hut iſt pomeranzen- oder goldgelb; die Blätter und der Stiel ebenfalls, nur etwas lichter.
Wird im Herbſt in bergigten Wäldern gefunden.

XXII.

AGARICVS VACCINVS. Kuhfarbiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, ſquamoſo-ſtriato, ſordide rufo; lamellis pallide rufis; petiolo tereti, ſtriato, pleno, concolore, apice dilatato; velo & annulo deſtitutus.

Fungus ſiccus vaccini coloris. Hall. enum. helu. p. 49. n. 75. Rupp. hall. p. 369?
In ſyluis cum praecedente.

Der Hut iſt braun, ſchuppig gefleckt, die Blätter lichtbraun, der Stiel ebenfalls und dunkler darein geſtreift.
Wird wie der vorige in Wäldern gefunden.

XXIII.

AGARICVS FASTIGIATVS. Zugeſpitzter Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXVI.

Agaricus cauleſcens, ſimplex, carnoſus; pileo conico, longitudinaliter ſtriato, flauo; lamellis fuſceſcentibus; petiolo tereti, pleno, pallide flauo; velo & annulo deſtitutus.

Pariter in ſyluis autumno prouenit.

Der Hut iſt dunkelgelb mit etwas Braun vermiſcht, die Blätter bräunlicht, der Stiel blaßgelb.
Wächſt gleich dem vorigen im Herbſt in Wäldern.

XXIV.

AGARICVS MVSCARIVS. Der gemeine Fliegenſchwamm.

Tom. I. Tab. XXVII.

Agaricus cauleſcens, ſimplex, carnoſus; pileo orbiculari, ſanguineo, margine ſtriato, verrucis albis adſperſo; lamellis dimidiatis ſolitariis albis; petiolo tereti, pleno, voluato, albo, apice dilatato, baſi ſquamoſo, bulboſo; annulo perſiſtente ac velo membranaceis.

Agaricus muſcarius. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 415. n. 1459.
Agaricus pileo plano, miniato, verrucoſo; verrucis & lamellis albis; ſtipite albo, voluato, bulboſo, annulato, longo, apice dilatato, pleno. Scop. fl. carniol. I. p. 2. n. 1. (a).

Agaricus volua exceptus, pileolo conico, in margine ſtriato, petiolo annulato, in baſin ſquamoſo-tuberoſam deſinente. Gled. fung. p. 82. n. 1.
Agaricus (*muſcarius*) ſtipitatus, lamellis dimidiatis ſolitariis, ſtipite voluato, apice dilatato, baſi ouato. Linn. fl. ſuec. I. n. 1076. II. 1235. ſpec. pl. I. p. 1172. II. p. 1640. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 4. comprehendit plures.
Agaricus caulescens, pileo ſanguineo; verrucis lamellisque albis, ſtipite albo baſi globoſo. Linn. fl. lapp. 515.
Amanita petiolo annulato; pileo ſanguineo; lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2373.
Amanita lamellis dimidiatis, caule albo baſi globoſo. Berg. viadr. p. 364.
Amanita muſcaria miniata. Dill. cat. gieſſ. p. 181.
Fungus bulboſus, e volua erumpens, pileolo ſuperna parte aureo & ad oras ſtriato, inferne & annulato pediculo albis, radice bulboſa. Mich. nou. gen. plant. p. 188. tab. 78. fig. 2.
Fungus pileo ſanguineo verrucoſo, lamellis albis, annulo fugaci, pediculo bulboſo. Hall. enum. helu. p. 39. n. 26. Rupp. hall. p. 366.
Fungus lamellatus, varius, noxius & muſcarius vulgo dictus. Rupp. jen. p. 301.
Fungi venenati muſcarii ſpecies IV. J. Bauh. hiſt. III. p. 841.
Fungi muſcas interficientis III. ſpecies aut varietas. C. Bauh. pin. p. 373. n. 19.
Fungus non veſcus II. Loeſel. pruſſ. p. 88.
Fungorum pernicioſorum genus XII. ſpec. IV. Cluſ. hiſt. II. p. 280.
Mel muſcarum venenoſum. Sterb. theatr. fung. p. 214. tab. 22. fig. A. n. 64.
Occurrit in ſiccioribus, arenoſis & elatioribus ſyluis, paſcuis & pratis, Auguſto, Septembri, Octobri menſibus & quandoque in ſerum vsque autumnum. Venenum vulgatiſſimum, quod cum lacte muſcis apponitur. Cimices lectularios quoque ejusdem liquamine eradicari teſtantur Ill. Linnaeus & Scopoli l. cit.

Der Hut dieſes bekannten giftigen Schwammes iſt hochroth, mit weiſſen Warzen, den Ueberbleibſeln ſeines Eyes oder Hülle beſetzt; Saamendecke, Blätter und Stiel iſt alles weiß, zuweilen etwas ſchwärzlich oder bräunlich.
Man trift ihn vom Auguſt, bis öfters in den ſpäteſten Herbſt, auf trockenen, ſandigen, bergigen Wieſen und Viehweiden, auch in dergleichen Wäldern an. Den Mücken wird er mit Milch, als ein Gift aufgeſetzt. Auch die Bettwanzen ſoll deſſen Saft nach dem Zeugniß des Herrn Ritters von Linné und Herrn Scopoli vertreiben.

* * *

AGARICI MVSCARII VARIETAS, PILEO NON VERRVCOSO. — Der gemeine Fliegenſchwamm ohne Warzen auf dem Hute.

Tom. I. Tab. XXVIII.

Agaricus caulescens, ſimplex, carnoſus; pileo orbiculari, ſanguineo, margine ſtriato; lamellis dimidiatis ſolitariis, albis; petiolo tereti, pleno, volvato, albo, apice dilatato, baſi ſquamoſo, bulboſo; annulo perſiſtente ac velo membranaceis.

Agaricus volua exceptus, pileolo orbiculari, rufo-aureo, margine tenuiſſime ſtriato, lamellis candidis, petiolo annulato, in baſin tuberoſam deſinente. Gled. fung. p. 83. n. I. var. b.

Fungus

Fungus muſcas interficiens, ſine maculis. Buxb. enum. plant. p. 121.
In ſyluis inter betulas & pinus iuniores autumno creſcit.

Der Unterſchied dieſes Schwammes beſtehet hauptſächlich darinnen, daß deſſen Hut ohne Warzen iſt.

Er wird unter dem jungen Birken- und Fichtengehölze im Herbſt angetroffen.

XXV.

AGARICVS SQVAMOSVS. Der ſchuppige Holzſchwamm.

Tom. I. Tab. XXIX. & XXX.

Agaricus cauleſcens ſimplex & ceſpitoſus; carne duriuſcula; pileo ſaepe deformi, ſquamoſo, flaueſcente; lamellis dentatis, ſaepe connatis, concoloribus; petiolo deformi, ſquamoſo, ſtriato, pleno; velo & annulo deſtitutus.

Amanita pileo flaueſcente ſquamoſo, lamellis terreis obſcuris, annulo araneoſo. Hall. hiſt. n. 2412?

Creſcit in lignis putridis, ad ſalices praeſertim.

Der Hut dieſes Schwammes iſt bräunlicht weiß, öfters ungeſtalt, allezeit aber ſchuppig zerriſſen, die Blätter ſind gezähnet und mit dem Stiel von gleicher Farbe, der Stiel ebenfalls ſchuppig.

Wächſt auf faulem Holz, zumal an Weidenſtöcken.

XXVI.

AGARICVS PLICATVS. Der gefältelte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXI.

Agaricus cauleſcens, ſtipitatus, plerumque ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo hemiſphaerico, ſulcato, albido - fuſco, vertice tumido; lamellis albidis; petiolo tereti, gracili, fragili, flauo, fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus pileo hemiſphaerico, petiolo tenuiſſimo cylindraceo. Gled. fung. p. 119.
Amanita albus, petiolo gracili, praelongo, pileo ſtriato, conico. Hall. hiſt. n. 2345.
Fungus paruus, gracillimus, totus albus, pileolo conico, a media ſui parte ad uſque oras ſtriato, pediculo biunciali praetenui. Mich. nou. gen. pl. p. 170. n. 5. & t. 73. f. 4.
In ſyluis inter muſcos ad truncos arborum poſt pluuias prouenit.

Dieſer Schwamm iſt am Hute blaßbraun, und gefältelt am Rande, die Blätter ſind weißlichter, der Stiel meiſtentheils gelb.

Man trift ihn bey feuchtem Wetter an den Stöcken der Bäume in Wäldern zwiſchen dem Mooſe an.

XXVII.

AGARICVS BRVNNEVS. Der bräunlichte gefältelte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXII.

Agaricus caulefcens, plerumque ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo hemiſphaerico, ſulcato, fuſceſcente, vertice tumido; lamellis concoloribus; petiolo tereti, gracili, fragili, concolore, fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Cum praecedente ſtructura, loco, tempore conuenit, differt colore ſaturatiore pilei, qui magis rufo-fuſcus eſt, & petioli eodem, qui in praecedente flauus eſt.

Dieſer Schwamm kommt mit dem vorhergehenden dem Baue, Ort und Zeit nach überein, iſt aber durch die dunklere röthlichbräunlichte Farbe des Hutes und Stieles unterſchieden.

XXVIII.

AGARICVS CAMPESTRIS. Der gemeine Champignon, Ehegärtel oder Kuckemucke.

Tom. I. Tab. XXXIII.

Agaricus caulefcens, ſaepius ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, ſquamato, albido, margine ſaepe lacero; lamellis primum albidis, dein rufis, tandem nigris, fatiſcentibus; petiolo tereti, breui, pleno, baſi tuberoſo; velo & annulo perſiſtente membranaceis, albis.

Agaricus campeſtris. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 425. n. 1478.
Agaricus pileolo amplo, hemiſphaerico, fornicato; petiolo breui, annulo permanente cincto. Gled. fung. p. 115. n. XXI.
Agaricus (*campeſtris*) ſtipitatus; pileo conuexo ſquamato albido; lamellis ruffis. Linn. fl. ſuec. I. n. 1045. II. n. 1203. ſpec. plant. I. p. 1173. II. P. 1641. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 9.
Agaricus caulefcens, petiolo ſordido lacero, pileo albo membranaceo, lamellis rufeſcentibus. Linn. fl. lapp. 482.
Amanita petiolo annulato; pileo campaniformi albido; lamellis roſeis. Hall. hiſt. n. 2443.
Amanita campeſtris, alba ſuperne, inferne rubens. Dill. cat. gieſſ. p. 177. Berg. viadr. p. 361.
Fungus campeſtris, albus ſuperne, inferne rubens. J. Bauh. hiſt. III. pag. 844. Mich. nou. gen. pl. p. 174. Buxb. pl. hall. p. 119. Hall. enum. helu. p. 50 Rupp. hall. p. 369.
Fungus pileolo lato & rotundo. C. Bauh. pin. p. 370. Tourn. inſtit. p. 556.
Fungorum eſculentorum genus XI. Cluſ. hiſt. 268.
Fungus lamellatus & capitatus vulgatiſſimus, Champignon vulgo dictus. Rupp. fl. jen. p. 303.
Pradellorum tertia ſpecies. Sterb. theatr. fung. p. 29. t. 1. f. C. D.
Ab aeſtate vsque in autumnum poſt pluuias ſpontaneus inuenitur in aruis, hortis, pomariis; arte ab hortulanis in caldariis, celliſque ope fimi equini per totum annum producitur.

Der Hut dieſes bekannten eßbaren Schwammes iſt weißlicht, öfters verunſtaltet, ſchuppig, zottig, am Rande zerriſſen, die Blätter anfangs weißlich, hernach rothbräunlich, endlich ſchwärzlich und vergehend, der Stiel iſt ebenfalls weißlich.

Er wächſt von ſelbſten nach Regenwetter in Feldern und Gärten vom Sommer bis in den Herbſt. Die Gärtner zielen ihn faſt das ganze Jahr durch in Treibhäuſern, Kellern und auf Miſtbeeten.

XXIX.

AGARICVS CAERVLESCENS. Der blaulichte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXIV.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, centro ſaepe depreſſo, fuſceſcente, margine caeruleſcente; lamellis caeruleſcentibus; petiolo tereti, pleno, craſſo, caeruleſcente, baſi bulboſo; velo filamentoſo fugaci; annulo nullo.

Fungus totus violaceus exitialis. Bocc. muſ. p. 301.
Fungus caeruleus maior. Buxb. cent. IV. t. 9.
Structura hic fungus multum accedit Agarico violaceo, Tab. III., cum quo & tempus & locus conueniunt. Qui itaque pro varietate violacei reputabit, cum eo non diſputabimus.

Dieſer Schwamm kommt mit dem veyelfarbigen Blätterſchwamm auf der dritten Kupfertafel dem Baue nach ſehr überein, auch trift Zeit und Ort bey beyden zuſammen.

XXX.

AGARICVS FLAVIDVS. Weißgelblichter Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXV.

Agaricus cauleſcens, plerumque ceſpitoſus, carnoſus; pileo hemiſphaerico, centro ſaepe faſtigiato, pallide flauo; lamellis albidis; petiolo tereti, tortili, pleno, baſi craſſiuſculo, fuſco, ſuperne pallide flauo; velo filamentoſo; annulo nullo.

Amanita pileo puluinato flauo, oris & lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2368?
Fungus luteus, lamellis & pediculo albis. Buxb. cent. V. t. 45. f. 2?
Occurrit in ſyluis autumno.

Der ganze Schwamm iſt hellgelb, ausgenommen der untere Theil des Stieles, ſo ins braune fällt, und die etwas weißlichtern Blätter.
Wird im Herbſt in Wäldern angetroffen.

XXXI.

AGARICVS GLVTINOSVS. Der klebrichte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXVI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo fuſco, glutinoſo, primum hemiſphaerico, tandem infundibuliformi; lamellis ſordide albis ramoſis;

petiolo tereti, pleno, voluato, ſuperne albido, baſi tuberoſo, fuſco; velo viſcoſo, ſplendente; annulo ſpurio.

Agaricus limacinus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 422. n. 1471?
Agaricus pileo conuexo; lamellis ramoſis; ſtipite voluato; volua gelatinoſa. Scop. fl. carn. I. p. 10. n. 15?
Syluarum incola autumno.

Der Hut iſt braun und klebrigt, glänzend, die Blätter ſchmutzig weiß, der Stiel untenher braun.
Wird im Herbſt in Wäldern gefunden.

XXXII.

AGARICVS AVRANTIVS. Der pomeranzenfärbige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXVII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo aurantio, hemiſphaerico, ſtriato, filamentoſo; lamellis concoloribus; petiolo tereti, ſtriato, filamentoſo, pleno, concolore; velo nullo; annulo ſpurio.

Agaricus filamentoſus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 441. n. 1520?
Amanita tuberculoſus flauus, petiolo ſquamoſo, lamellis ceruinis. Hall. hiſt. n. 2427?
Fungus ex luteo rufeſcens, cute ſupernae pileoli partis lacera & veluti ſquamoſa. Mich. nou. gen. plant. p. 147. n. 8.
In ſyluis verſus autumnum.

Der ganze Schwamm iſt pomeranzenfärbig, der Hut und Stiel faſerig, geſtrichelt, die Blätter etwas lichter.
Wächſt gegen den Herbſt in Wäldern.

XXXIII.

AGARICVS STRIATVS. Der geſtrichelte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, ſtriato, ſpadiceo; lamellis ex albo demum terreis; petiolo tereti, breui, craſſo, ſtriato, pleno, albido; velo nullo, annulo ſpurio.

Amanita petiolo bulboſo, pileo hemiſphaerico ſpadiceo, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2398.
In ſyluis non rarus.

Der Hut iſt braun, und geſtrichelt, die Blätter ſind weißlich und werden endlich erdfarb, der Stiel iſt oben weißlich, unten bräunlich geſtrichelt, geringelt.
Iſt häufig in den Wäldern.

XXXIV.

AGARICVS LACTEVS. Milchfärbiger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XXXIX.

Agaricus caulefcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, lacteo, in centro depreſſo; lamellis concoloribus, craſſis; petiolo tereti, pleno, procero, baſi craſſiuſculo, albo; velo & annulo deſtitutus.

Lamellae craſſae diſtinguunt ab Amanita albo viſcido, laminis tenuiſſimis. Hall. hiſt. n. 2341. Ad radices arborum creſcit.

Der ganze Schwamm iſt milchweiß und fällt im Alter etwas ins gelblichte. Die Mitte des Huts iſt vertieft, die Blätter dick.

Wächſt an den Wurzeln der Bäume.

XXXV.

AGARICVS PVNCTATVS. Der gedippelte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XL.

Agaricus caulefcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, punctato, aurantio, margine dilutiore; lamellis fuſceſcentibus; petiolo, tereti, ſtriato, ſubtortili, baſi craſſiuſculo, albido, fuſceſcente, fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis autumno reperitur.

Der Hut dieſes Schwammes iſt abgeſchoſſen pomeranzenfarb, am Rande weislicher, über und über gedippelt, die Blätter bräunlich, der Stiel weißlich mit etwas braun.

Wird im Herbſt in Wäldern gefunden.

XXXVI.

AGARICVS AVREVS. Der goldgelbe Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XLI.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, ſaepe deformi, granulato, aurantio; lamellis citrinis; petiolo tereti, flauo, baſi tuberoſo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita leoninus ſericeus. Hall. hiſt. n. 2401?
Fungus maior aureus perniciofus. Buxb. cent. IV. t. 33?
Fungus pileolo deſuper lacero & filamentoſo, fului palleſcentisque coloris; lamellis & ſubſtantia buxeis; pediculo fiſtuloſo ſupernae parti pilei concolore. Mich. nou. gen. pl. p. 158. t. 74. f. 4? Sed noſtro petiolus plenus.
Frequens in ſyluis.

Der Hut iſt goldgelb, mit kleinen Körnern wie Chagrin beſetzt, die Blätter, der Stiel und die innere Subſtanz hellgelb, wie Buchsbaumholz.
Wird in Wäldern häufig angetroffen.

XXXVII.

AGARICVS VARIVS. Der vielfärbige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XLII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, vaccino; lamellis flexuoſis, purpuraſcentibus, margine flavidis; petiolo tereti, craſſiuſculo, ſuperne albido, pleno; baſi tuberoſo, rufeſcente; velo filamentoſo; annulo nullo.

Lamellae flexuoſae, pallide purpureae, margine pallide flauo eleganter variae & ſubſtantia flauida diſtinguunt ab aliis eiusdem ordinis.
Reperitur hic fungus pariter autumni tempore in ſyluis.

Der Hut dieſes Schwammes iſt von röthlichbrauner Farbe, die Blätter einwärts blaß purpurfarb, auswärts am Rande blaßgelb, der Stiel oberwärts weißlich, unten röthlichbraun, die innere Subſtanz gelblich.
Wird ebenfalls in den Wäldern zur Herbſtzeit angetroffen.

XXXVIII.

AGARICVS FLABELLIFORMIS. Der wedelförmige Holzſchwamm.

Tom. I. Tab. XLIII. & XLIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo planiuſculo, lacero, multiformi, ceruino; lamellis anaſtomoſantibus terreo-albidis; petiolo tereti, breui, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Amanita pileo plano lacero, corio ceruino, lamellis terreis obſcuris. Hall. hiſt. n. 2414?
Petiolum fiſtuloſum deſcribit Ill. Hallerus & voluam laceram, albam, perſiſtentem, quae tamen noſter non habet.
Ad truncos arborum in ſyluis perſiſtens.

Der Hut iſt allezeit oben braun, flach, und verſchiedentlich zertheilet, die Blätter hin und wieder mit einander verwachſen, ſchmutzig weiß, erdfarb. Dergleichen Farbe hat auch der kurze, verſchiedentlich gewachſene Stiel.
Wird an Holzſtöcken angetroffen.

XXXIX.

AGARICVS MELLEVS. Der honiggelbe Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XLV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo conuexo, flauo: centro faſtigiato, truncato: margine ſtriato, pallidiori; lamellis albidis,

albidis, petiolo tereti, procero, gracili, flaueſcente, fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita viſcidus, pileo flaueſcente, laminis albis. Hall. hiſt. n. 2363.
Polymyces ſimplex melleus. Batarr. fung. arim. p. 49. tab. XXII. C.
Frequens ad arborum truncos & radices autumnali tempore.

Der Hut und Stiel ſind licht wachsgelb, die Blätter weißlich.
Iſt häufig an Holzſtöcken und um die Wurzeln der Bäume im Herbſt zu finden.

XL.

AGARICVS PORCELLANEVS. Porcellanartiger Miſtſchwamm.

Coprinus porcell Sch

Tom. I. Tab. XLVI. & XLVII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo primum fuſiformi, ex albo, hyalino & purpureo vario, ſtriato, floccis flauis; poſtea conico, demum lacero, reuoluto, fatiſcente; lamellis purpuraſcentibus, demum atris, diffluentibus; petiolo tereti, procero, albido, fiſtuloſo, baſi curuato; velo nullo; annulo ſpurio, fugaci.

Ad agaricum ouatum, Tab. VII. referunt quidem Ill. Hallerus & Clariſſ. Scopoli. Attamen ab eo diſtinguunt abunde magnitudo & proportio totius, elegantior color, glabrities maior pilei, qui ouato Tab. VII. & cylindrico Tab. VIII. ſquamoſus magis eſt. Affines tamen maxime eſſe & ouatum, & cylindricum, & porcellaneum huncce & cinereum Tab. C. facile quiſque conceſſerit.
In ruderatis, maceriis & macilentis hortis poſt pluuias, locis vmbroſis.

Der zierlichſte aller Waſſer- oder Miſtſchwämme. Der Hut iſt weiß, waſſer- oder glaßfarb und blaßpurpurfarb, der Länge nach geſtrichelt und mit gelblichen Flocken beſetzt, die Blätter blaßpurpurfarbig; der Stiel von der Farbe, wie der Hut; im Alter wird der Hut am Rande zerriſſen und die Blätter ſchwärzlich, und zerflieſſen.
Man findet ihn nach feuchtem Wetter an ſandigen, magern Orten, auf dem Schutt, in den Gängen der Gärten, abſonderlich, wo die Sonne nicht hinkommt.

XLI.

AGARICVS LEONINVS. Der löwenförmige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XLVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, flauo, multiformi, centro faſtigiato, margine tenuiſſime ſtriato; lamellis incarnatis, margine flauidis, tandem terreis; petiolo tereti, procero, gracili, ſpiraliter ſtriato, pleno, flauicante, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita leoninus, pileo conico lineato. Hall. hiſt. n. 2453?
Ad arborum truncos reperiundus.

Der Hut iſt dunkelgelb, in der Mitte erhoben, am Rande zartgeſtrichelt, die Blätter leibfarb mit gelblichem Rande, der Stiel gelblich, gewunden geſtrichelt.
Iſt an den Baumſtöcken und auf altem Holze befindlich.

XLII.

AGARICVS LATERITIVS. Der ziegelfärbige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XLIX.

Agaricus caulefcens, plerumque ceſpitoſus, vix carnoſus; pileo mutabili, ſaepe deformi, centro ſaturatius, margine pallidius ineleganter flauo; lamellis ex flauo terreis; petiolo tereti, procero, gracili, ſtriato, fiſtuloſo, flauo; velo primum membranaceo, dein filamentoſo; annulo nullo.

Amanita annulo araneoſo, pileo flauo, lamellis ex flauo fulginoſis. Hall. hiſt. n. 2482?
Fungus maior ſubluteus, lamellis luridis. Buxb. cent. IV. t. 4?
Ad ſepes, vias & in hortis frequens.

Der Hut iſt in der Mitte dunkel, am Rande hellgelb, die Blätter ſind erdfarb mit etwas gelblichem am Rande, der Stiel ebenfalls gelb wie der Hut.
Wächſt an Zäunen und Wegen, wie auch in Gärten häufig.

XLIII.

AGARICVS PALLIDVS. Der blaßgelbliche Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. L.

Agaricus caulefcens, ſolitarius & ceſpitoſus; carnoſus; pileo conuexo, ſaepe deformi, pallide flauo; lamellis concoloribus; petiolo tereti, pleno, baſi craſſiuſculo, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Synonyma, quae quadrent, nulla reperio.
In truncis & radicibus arborum.

Der ganze Schwamm iſt weißlich, mit etwas gelb- und bräunlichem vermiſcht, die Blätter fallen im Alter etwas in das erdfarbe.
Wächſt an den Wurzeln der Bäume und auf alten Baumſtöcken.

XLIV.

AGARICVS CEREOLVS. Der wachsgelbe Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LI.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo luteo; lamellis ceruinis; petiolo tereti, procero, gracili, albido, baſi craſſiuſculo, pleno; velo filamentoſo; annulo fugaci.

Inter muſcos in ſyluis ad radices arborum.

Der

Der Hut iſt lichtbraun, ins gelblichte ſpielend, die Blätter ſind faſt rehfarb, der Stiel iſt weißlicht.
Wächſt in Wäldern um die Wurzeln der Bäume unter dem Mooſe.

XLV.

AGARICVS GALERICVLATVS. Der kappenförmige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, vix carnoſus, hydrophorus; pileo ſubconico, ſtriato, plicato, fuſco; lamellis raris, albidis; petiolo tereti, gracili, fragili, fiſtuloſo, fuſco; velo & annulo deſtitutus.

α) Fig. I — VI. Varietas minor faſciculata.
Agaricus galericulatus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 455. n. 1564.
Agaricus pileo fuſco, campanulato, laeui, ſtipite nudo, procero, cylindraceo, fiſtuloſo, flauo, ceſpitoſo. Scop. fl. carniol. I. p. 27. (h).
Amanita pileolo conico ſpadiceo, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2393.
Fungus faſciculoſus, pileo obſcuro, extinctorii forma, e medio ad peripheriam ſtriato; lamellis albis; pediculo altiori, luteo, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. pl. p. 197.
Fungus multiplex, campaniformis, colore caſtaneo. Vaill. pariſ. p. 73. tab. 12. fig. 3. 4.
(β) Fig. VII. VIII. & IX. Maior varietas ſolitaria.
Amanita radice caudata, petiolo fiſtuloſo procero, pileo vmbonato ſtriato cinereo, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2388.
Fungus clypeatus in medio protuberans. Vaill. pariſ. p. 68.
Fungus pileolo deſuper fuluo ſpadiceo, centro vmbilicato & laeui. Mich. nou. gen. pl. p. 169.
In ſyluis ad ligna putrida poſt pluuias.

Der Hut dieſes Schwammes iſt bräunlich, gegen den Rand geſtreift, in der Mitte erhoben, die Blätter ſind weißlicht, der Stiel ebenfalls bräunlich, beynahe wie der Hut.
Man trift ihn nach Regenwetter auf faulen Holzſtöcken an.

XLVI.

AGARICVS GLAVCOPVS. Der blauſtieligte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LIII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, punctato, ceruino; lamellis caeruleſcentibus; petiolo tereti, craſſo, pleno, caeruleſcente, baſi tuberoſo, fuſceſcente; velo filamentoſo; annulo nullo.

Accedit ad violaceum Tab. III. tota ſtructura ſua, loco & tempore natali, colores vero differunt.

Der Hut iſt rehfarb, die Blätter und der Stiel blaulicht mit etwas bräunlichten, zumal unten am Stiele.

Iſt wie der dopelfarbige auf der dritten Kupfertafel, dem er dem Baue nach ähnlich, iſt im Herbſt in Wäldern anzutreffen.

XLVII.

AGARICVS OCHROLEVCVS. Der blaßbräunliche Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LIV.

Agaricus caulescens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, dilute fuſco; lamellis flauidis; petiolo tereti, craſſo, pleno, albido, baſi tuberoſo; velo filamentoſo; annulo nullo.

Pariter hic fungus ſtructura ſua ad violaceum Tab. III. accedit, color tamen penitus recedit. Locus & tempus ceterum conſentiunt.

Der Hut iſt lichtbraun, die Blätter gelblich, der Stiel weißlich. Wird im Herbſt in Wäldern gefunden.

XLVIII.

AGARICVS RVTILVS. Der röthliche Trichterſchwamm.

Tom. I. Tab. LV.

Agaricus caulescens, ſolitarius, carnoſus; pileo primum ſubconico, rufo, poſtea planiuſculo, ſtriato, tandem in centro depreſſo, pallide terreo; lamellis rufeſcentibus; petiolo tereti, pleno, rufo, baſi curuato, acutiuſculo; velo filamentoſo; annulo nullo.

In ſyluis aridis autumno reperitur.

Der Hut iſt von veränderlicher Farbe, anfangs röthlich, zulezt weißlich erdfarb, ſo auch die Blätter und der Stiel. Wird in dürren Wäldern im Herbſt gefunden.

XLIX.

AGARICVS AMETHYSTINVS. Der hellviolete Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LVI.

Agaricus caulescens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo dilutiſſime violaceo; lamellis fuſcis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, pileo concolore, baſi tuberoſo; velo filamentoſo; annulo nullo.

Etiam huius fungi ſtructura ad violaceum Tab. III. accedit, quocum & ſimili loco & tempore reperitur.

Der Hut iſt ganz weißlich mit wenig violet vermiſcht, eben ſo iſt auch der Stiel, die Blätter aber ſind braun. Wird im Herbſt in den Wäldern gefunden.

L. AGA-

L.

AGARICVS QVERCINVS. Der Eichenſchwamm, Rehling.

Tom. I. Tab. LVII.

Agaricus acaulis, ſolitarius, lignoſus, perſiſtens; pileo ſemicirculari, planiuſculo, ſaepe deformi, piloſo, pallide fuſco, ſtriato: circulis concentricis prominulis; lamellis cartilagineis, ſinuoſis, varie implexis & connatis, concoloribus; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus quercinus. Scopol. fl. carniol. II. P. II. p. 459. n. 1578.
Agaricus coriaceus durusve. Gled. fung. p. 134. n. XXX.
Agaricus (*quercinus*) acaulis, lamellis labyrinthiformibus. Linn. fl. ſuec. I. n. 1082. II. n. 1241. ſpec. pl. I. p. 1176. II. p. 1644. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 25.
Agaricus quernus lamellatus coriaceus villoſus. Dill. cat. gieſſ. p. 191.
Agaricus villoſus, lamellis ſinuoſis & invicem implexis. Buxb. cent. V. t. 4. f. 1.
Amanita ſeſſilis, duriſſimus; lamellis cartilagineis, imbricatis. Hall. hiſt. n. 2330.
Fungus ligneus, daedaloides, gibbus, non veſcus. Bocc. muſ. p. 305.
Capreolinus Tabernaem. Popowitſch. vom Meere. p. 378. 396.
Vonkhout. Sterb. theatr. fung. n. 128. p. 262.
Ad truncos arborum, praeſertim quercuum, reperitur & ad fomitem adhibetur.

Die Oberfläche des Huts iſt rauh, haarig, von verſchiedener Farbe, meiſtens blaßbraun, doch auch weißlich, grünlich, etwas purpurfarb, allezeit aber mit erhobenen Ringen von verſchiedener Farbe. Die Blätter ſind dick, hart, äſtig, verſchiedentlich zuſammen gewachſen, weißlich und bräunlich. Der ganze Schwamm trocken und ſehr beſtändig.

Man findet ihn an alten Holzſtämmen, beſonders an Eichen, und braucht ihn zum Zunder.

LI.

AGARICVS RVSSVLA, Der lackrothe Täubling.

Tom. I. Tab. LVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo primum globoſo, dein convexo, centro depreſſo, demum infundibuliformi, ſubtiliter punctato, pallide purpureo; lamellis craſſis, albis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, purpuraſcente; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus Ruſſula Scop. fl. carn. II. P. II. p. 485. n. 1502.
Agaricus pileo plano; lamellis baſi tranſuerſim rugoſis; ſtriate cylindraceo nudo. Scop. fl. carn. I. p. 8. n. 11.
Agaricus pileolo orbiculari in margine rugoſo & ſtriato, vertice tumido, (potius depreſſo) petiolo breui. Gled. fung. p. 106. n. 14.
Agaricus (*integer*) ſtipitatus, lamellis omnibus magnitudine aequalibus Linn. fl. ſuec. I. n. 1071. II. n. 1230. Spec. plant. I. p. 1171. II. p. 1640. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 3.

Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2373. var. α.
Fungus piperatus non lacteſcens. Vaill. pariſ. p. 62.
Fungus eſculentus albus & ſubpurpureus varius, lamellis prorſus albis. Mich. nou. gen. pl. p. 158.
Fungus veſcus VII. Loeſ. pruſſ. t. 81.
Fungus vmbilicum referens variegatus. C. Bauh. pin. 370. Popowitſch. vom Meere p. 388.
Fungi eſculenti XIII. genus. Cluſ. hiſt. 280.
Character hunc cum aliis fungis vmbilicum referentibus C. Bauh. tam eſculentis, quam non eſculentis, combinans conſiſtit in ſequentibus:
Pileus maturi fungi in centro ſemper depreſſus, ad oras rugoſus; lamellae craſſae, aequales; petiolus teres, breuis, craſſus, plenus; caro albida, ſicca, fragilis; ſapor acris, piperatus.
Eſculentum ad non eſculento, emetico, nobis dicto Tab. XV. & XVI. diſtinguit caro ſolidior, quae in emetico laxa & poroſa exiſtit.
In ſyluis autumno prouentus huius fungi vberrimus eſt.

Der Hut dieſes Schwamms iſt blaß lack- oder purpurroth, der Stiel etwas blaſſer, die Blätter ſind weiß, werden aber im Alter etwas fahl.
Alle, ſowohl eßbare, als uneßbare Täublinge, werden durch folgende Kennzeichen mit einander verbunden:
Der Hut des reifen Schwammes iſt allezeit in der Mitte vertieft, am Rande gefalten; die Blätter ſind gleich und dick; der Stiel walzenförmig, kurz, dick und voll; das Fleiſch weiß, trocken, zerbrechlich; der Geſchmack ſcharf, pfefferartig.
Der eßbare Täubling aller Arten unterſcheidet ſich vom uneßbaren dem Speytäubling, der 15den und 16den Kupfertafel, durch das feſtere Fleiſch, das im Speytäubling locker und löcherigt iſt.
Dieſer Schwamm wird im Herbſt häufig in Wäldern gefunden.

LII.

AGARICVS CLAVVS. Der nagelförmige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LIX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, vix carnoſus; pileo planiuſculo, centro faſtigiato, margine ſtriato, luteo; lamellis albidis, demum ochroleucis; petiolo tereti, gracili, tortili, pleno, radicato, ſuperne albido, inferne fuſceſcente; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus (*clauus*) ſtipitatus, pileo luteo conuexo ſtriato, lamellis ſtipiteque albis. Linn. fl. ſuec. I. p. 1053. II. n. 1212. ſpec. pl. I. p. 1175. II. p. 1644. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 24.
Amanita minimus, oris adtractis, flauus, inferne albus. Hall. hiſt. n. 2370.
Fungus minimus, aurantius, mammillaris. Vaill. pariſ. p. 76. t. 11. f. 19. 20. Hall. enum. helu. p. 38. n. 24. Rup. hall. p. 365.
Creſcit in nemoribus inter folia decidua putreſcentia & inter muſcos ſero autumno & vere.

Der

Der Hut iſt gelb, am Rande geſtrichelt und gefältelt zuſammengezogen, ſo, daß in der Mitte eine glatte Erhobenheit überbleibet, wie an einer gewiſſen Art Nägel mit meßingenen Platten.

Wächſt in den Wäldern zwiſchen dem abgefallenen und faulenden Laube und dem Mooſe im ſpäten Herbſte und Frühjahre.

LIII.

AGARICVS SPADICEVS. Der hellbraune Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, ſpadiceo; lamellis ſubcarneis; petiolo tereti, fiſtuloſo, albido, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita pileo campanulato, caſtaneus, lamellis ſubrufis. Hall. hiſt. n. 2450? Ex deſcriptione addita eſſe videtur.

In *ſyluis* autumno.

Der Hut iſt braun, bald lichter, bald dunkler; die Blätter ſind faſt leibfarb; der Stiel iſt gelblicht weiß.

Wächſt im Herbſt in den Wäldern.

LIV.

AGARICVS FLOCCOSVS. Der flockigte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, flauo, ſaturatius piloſo-ſquamoſo, centro faſtigiato, margine ſtriato; lamellis flauidis, demum terreis; petiolo tereti, pleno, flauo, ſaturatius piloſo-ſquamoſo; velo nullo; annulo ſpurio.

Amanita pileo flaueſcente ſquamoſo, lamellis terreis obſcuris, annulo araneoſo. Hall. hiſt. n. 2412?

Syluarum incola ad radices & truncos arborum.

Der Hut iſt gelb mit faſt pomeranzen- oder dunkelgoldgelben Flocken oder haarigen Schuppen beſetzt, am Rande etwas weniges geſtreift. Von gleicher Beſchaffenheit und Farbe iſt auch der Stiel. Die Blätter ſind gelblich, im Alter aber faſt erdfarb.

Wächſt in den Wäldern an den Wurzeln der Bäume und an alten Stöcken.

LV.

AGARICVS INCERTVS. Der ungewiſſe Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, vix carnoſus; pileo primum ſubconico, demum planiuſculo, ſubtiliter ſquamoſo, lateritio-rufo; lamellis flauidis; petiolo tereti, ſtriato, ſuperne fiſtuloſo, flauido, baſi tuberoſo, pleno, rufeſcente; velo membranaceo; annulo nullo.

Amanita flauus, pileo hemiſphaerico ſquamoſa. Hall. hiſt. n. 2424?
Fungus ex luteo rufeſcens, cute ſupernae pileoli partis lacera & veluti ſquamoſa. Mich. nou. gen. pl. p. 147.
In ſyluis autumno reperiundus.

Der Hut iſt dunkel ziegelfarb, mit haarigen Schuppen; die Blätter ſind gelblich; der Stiel oben gelblich, unten rothbräunlich, über und über geſtrichelt.
Wird im Herbſt in Wäldern gefunden.

LVI.

AGARICVS CAMPANVLATVS. Der glockenförmige kleine Holzſchwamm.

Tom. I. Tab. LXIII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, non carnoſus; pileo ſubcampanulato, ſtriato, aureo; lamellis concoloribus; petiolo tereti, gracili, fiſtuloſo, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Amanita flauus minimus, pileolo hemiſphaerico. Hall. hiſt. n. 2429.
Fungus paruus fuluus, pileolo in obtuſum conum faſtigiato & a media ſui parte uſque ad oras ſubtiliſſime ſtriato, pediculo altiori, lineam lato & fiſtuloſo. Mich. nou. plant. p. 170?
Creſcit in lignis putridis, ad arbores & inter muſcos in ſyluis autumno.

Der ganze Schwamm iſt im Anfange goldgelb, verliert aber im Alter ſeine Farbe.
Wächſt im Herbſt in Wäldern auf faulem Holze, an den Bäumen und unter dem Mooſe.

LVII.

AGARICVS TERREVS. Der erdfarbige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, quandoque ramoſus, parum carnoſus; pileo primum ſubconico, poſtea conuexo, piloſe ſtriato, terreo; lamellis albis; petiolo tereti, pleno, albido, e baſi craſſiuſcula quandoque ramoſo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus pileo plano lacero anguſto, petiolo cylindraceo tenui. Gled. fung. p. 112.
Amanita petiolo farto gracili, pileo plano murino, ſericeis lineis ſtriato, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2381.

Fungus

Fungus eſculentus, pileolo deſuper cinereo aut murino & in filamenta quaſi lacerato, interne candido & tenuiſſime lamellato, pediculo plerumque candido. Mich. nou. gen. plant. p. 155. n. 11. & 12.
Fungus non veſcus IV. Loeſel. pruſſ. p. 86?
In ſyluis autumno.

Der Hut iſt erdfarb, auch maußfarb, über und über zart geſtrichelt, die Blätter und der Stiel weißlich.
Wächſt im Herbſt in den Wäldern.

LVIII.

AGARICVS INCVRVVS. Der gekrümmte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo primum conuexo, demum concauo, infundibuliformi, flauo; lamellis aurantiis; petiolo tereti, procero, tortili, pleno, flauo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita leoninus ſericeus. Hall. hiſt. n. 2431. Iudicio quidem ipſius Illuſtris Viri, ſed in noſtro annulus araneoſus deficit.
Syluarum incola autumno.

Der Hut und Stiel iſt faſt von einerley gelben Farbe; die Blätter ſind mehr röthlich oder pomeranzengelb.
Man trift ihn im Herbſt in den Wäldern an.

LIX.

AGARICVS LIGNORVM. Der Holzwaſſerſchwamm.

Tom. I. Tab. LXVI.

Agaricus cauleſcens, plerumque ceſpitoſus, non carnoſus; pileo primum conico, luteo, ſtriato, plicato, demum plano, fuſceſcente, margine lacero, reuoluto; lamellis ſordide albis, demum atris; petiolo tereti, procero, fiſtuloſo, albido, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus lignorum. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 427. n. 1482.
Agaricus ceſpitoſus, pileo campanulato, obſolete flauo, puluerulento, ſtriato; vertice glabro tumido; lamellis demum atris, ſeminale pollen explodentibus; ſtipite ſubulato, procero, fiſtuloſo. Scop. fl. carn. I. p. 24. n. 29. var. b.
Amanita tener conicus lacer, ceruinus, lamellis nigris. Hall. hiſt. n. 2485.
Fungus pileolo ex fuluo ferrugineo & ad centrum uſque in plures partes plerumque ſe diuidente, lamellis nigricantibus, pediculo tenuiori cylindrico purpureo. Mich. nou. gen. pl. p. 164.
Fungus pileolo plicatili maior. Buxb. cent. II. t. 50. f. 1.
Fungi multi ex uno pede clypeiformes lutei I. Bauh. hiſt. III. p. 836.

Fungorum pernicioſorum genus XVI. ſpec. III. Cluſ. hiſt. p. CCLXXXII.
Hydrophorus oris laceris. Batarr. fung. arim. p. 54. t. 26. D.
Reperitur in lignis putridis.

Der Hut iſt im Anfang hell ockergelb, zuletzt braun; die Blätter anfangs ſchmuzig weiß, zuletzt faſt ſchwarz; der Stiel weißlich.

Wird auf faulem Holze gefunden.

LX.

AGARICVS FVGAX. Der vergängliche Miſtſchwamm.

Tom. I. Tab. LXVII. & LXVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus; pileo obtuſe conico, plumbeo, vertice laeui, margine ſtriato, demum lacerato, reuoluto; lamellis ſordide albis, demum atris, fatiſcentibus; petiolo tereti, annulato, albido, fiſtuloſo, baſi attenuato; velo nullo; annulo membranaceo fugaci.

Agaricus volua exceptus, pileo campanulato ſtriato, vertice laeui, petiolo annulato cylindraceo fiſtuloſo, in baſin roſtratam deſinente. Gled. fung. p. 89. n. IV.
Fungus, qui voluam vix egreſſus in atramentum reſoluitur, pileolo campanulato plumbeo, vertice laeui, reliqua parte ſtriato, pediculo cylindrico, albo, fiſtuloſo, radice roſtrata. Mich. nou. gen. pl. p. 189 tab. 80. fig. 5.
Fugaciſſimus in coemeteriis, hortis, fimetis poſt pluuias.

Der Hut iſt lichtbleyfarb, am Rand geſtreift, in der Mitte glatt, zuletzt am Rande zerriſſen und aufgerollt; die Blätter ſind ſchmutzig weiß, zuletzt ſchwärzlich; der Stiel weißlich.

Dieſer Schwamm vergehet ſehr geſchwinde, und wird auf Miſthaufen, Kirchhöfen und in Gärten nach regnichtem Wetter angetroffen.

LXI.

AGARICVS LVRIDVS. Der graugelblichte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXIX.

Agaricus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, centro faſtigiato, ex luteo murino; lamellis flauidis; petiolo tereti, ſubbulboſo, albido; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis autumnali tempore reperiundus.

Der Hut iſt grau mit etwas gelb vermiſcht; die Blätter ſind weißlich, mit etwas gelb; der Stiel iſt weißlich.

Iſt im Herbſt in den Wäldern zu finden.

LXII.

AGARICVS TENER. Der zarte Mooßſchwamm.

Tom. I. Tab. LXX.

Agaricus caulefcens, plerumque ſolitarius, vix carnoſus; pileo ſubconico, luteo; lamellis luteis; petiolo tereti, gracili, ſaepe tortili, fiſtuloſo, baſi ſubbulboſo, radicato, luteo; velo & annulo deſtitutus.

Accedit ad campanulatum Tab. LXIII. ut forte ſola varietas maior.
In ſyluis inter folia decidua & muſcos.

Der ganze Schwamm iſt zart und gelb von Farbe, dem glockenförmigen auf der 63ſten Kupfertafel ziemlich ähnlich, und vielleicht nur eine etwas gröſſere Abänderung.
Wächſt unter dem abgefallenen Laub und Mooſe in den Wäldern.

LXIII.

AGARICVS LATERALIS. Schiefſtieliger Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXI. & LXXII.

Agaricus caulefcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, obſcure ſpadiceo; lamellis decurrentibus, albidis, demum ochroleucis; petiolo craſſo, breuiſſimo, laterali, pleno, ſpadiceo, baſi tuberoſo; velo & annulo deſtitutus.

α) Tab. LXXI. Lignis innaſcens varietas.
Amanita petiolo bulboſo breuiſſimo laterali, pileolo hemiſphaerico ſpadiceo, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2380.
Fungus nemoroſus XXV. Loeſel. pruſſ. p. 91?
In ſyluis ad truncos arborum.
β) Tab. LXXII. Terreſtris varietas.
Amanita pediculo bulboſo, pileo hemiſphaerico ſpadiceo, lamellis luteis. Hall. hiſt. n. 2435.
Fungus ſpadiceus aruenſis. Buxb. cent. IV. tab. 8. fig. 1.
In pratis ſyluaticis.

Der Hut iſt dunkelbraun; die Blätter weißgelblich, der Stiel bräunlich, nicht in der Mitte des Hutes.
Wächſt in Wäldern auf Holzſtöcken und auf waldigten Wieſen.

LXIV.

AGARICVS RVBESCENS. Der röthliche Hirſchling oder Wieſen-Retzker.

Tom. I. Tab. LXXIII.

Agaricus caulefcens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; ſucco lacteſcente acri; pileo conuexo, planiuſculo, obſolete rufo, demum infundibuliformi,

formi, decolore; lamellis ramoſis, concoloribus; petiolo tereti, longiuſculo, pleno, concolore; velo ac annulo deſtitutus.

Agaricus rufus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 451. n. 1553.
Fungus infundibuliformis lacteſcens, rufeſcentis coloris. Mich. nou. gen. plant. p. 141.
Fungus lacteſcens piperatus rufus. Vaill. pariſ. p. 61.
In paſcuis & pratis autumno prouenit.

Der ganze Schwamm iſt abgeſchoſſen braunroth, im Alter verlieret ſich die rothe Farbe noch mehr.
Man findet ihn zur Herbſtzeit auf Wieſen und Viehtriften.

LXV.

AGARICVS OBSCVRVS. Der dunkelbraune Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXIV.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo, piloſe ſquamoſo, fuſco; lamellis albidis, demum rufeſcentibus; petiolo tereti, fuſceſcente, pleno, baſi craſſiuſculo; velo & annulo membranaceis albis.

Amanita pileo puluinato, ceruino, lamellis cinnameis. Hall. hiſt. n. 2445?
Fungus campeſtris, bulboſus, pileolo fornicato, deſuper ceruini coloris, & in vertice quaſi faſtigiato, ſubtus lamellis albis, pediculo concolore, annulato, & vix fiſtuloſo, radice bulboſa. Mich. nou. gen. pl. p. 172?
In ſyluis humidis autumno reperiundus.

Der Hut iſt dunkelbraun, haarig geſchuppt; öfters in der Mitte erhoben; die Blätter ſind weißlich, im Alter zimmetfarb; der Stiel untenher braun; die Saamendecke und der Ring weiß.
Wird im Herbſt in feuchten Wäldern angetroffen.

LXVI.

AGARICVS ROSEVS. Der roſenfarbige Täubling.

Tom. I. Tab. LXXV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo roſeo, primum conuexo, demum infundibuliformi; lamellis albis, craſſis; petiolo tereti, craſſo, pleno, albo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2374. var. α.
Fungus eſculentis albus & ſubpurpureus varius, lamellis prorſus albis. Mich. nou. gen. pl. p. 158.
In ſyluis autumno.

Der

Der Hut iſt roſenfarb; der Stiel und die Blätter ſind weißlich.
Wird im Herbſt in den Wäldern gefunden.

LXVII.

AGARICVS HIRSVTVS. Der haarige Holzſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXVI.

Agaricus ſubacaulis, ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceo-lignoſus; pileo planiuſculo, hirſuto, margine fornicato, circulis eleuatis, concentricis, atris, fuluis & flauis; lamellis rectiuſculis, anaſtomoſantibus, flauidis; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus flabelliformis. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 460. n. 1579.
Agaricus flabelliformis villoſus, pileoli margine fornicato. Gled. fung. p. 133.
Agaricus (*betulinus*) acaulis coriaceus villoſus: margine obtuſo, lamellis ramoſis anaſtomoſantibus. Linn. fl. ſuec. I. n. 1085. II. n. 1244. Spec. plant. I. p. 1176. II. p. 1645. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 26.
Agaricus hirſutus nigricans, lamellis luteis. Buxb. cent. V. tab. 6.
Amanita ſeſſilis hirſutus fuluus, lamellis concoloribus. Hall. hiſt. n. 2331.
Agarico-fungus ſuperne villoſus longus & anguſtus. Hall. enum. helu. p. 57. n. 3. Rupp. hall. p. 371.
In ſyluis denſis & ſubudis, ad ligna emortua & arbores ſenio confectas, hyeme & vere.

Der Obertheil dieſes Schwammes beſtehet aus übereinander liegenden, mehr lang, als breiten, nicht dicken, rundlich ausgeſchweiften, oben haarigen, mit dunkelbraunen, dunkelgoldgelben und hellgelben Ringen gezeichneten Schuppen. Die Blätter ſind weißgelblich, auch gelb.
Wächſt im Winter und Frühjahre in dichten und feuchten Wäldern, auf altem Holze und abgeſtorbenen Bäumen.

LXVIII.

AGARICVS CARYOPHYLLAEVS. Nägeleinſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXVII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, luteo, centro faſtigiato, margine plicato; lamellis dilute cinnamomeis; petiolo tereti, gracili, pleno, luteolo, baſi tenuiori; velo & annulo deſtitutus.

Amanita pileo puluinato leonino, centro fuſco ſquamoſo. Hall. hiſt. n. 2360.
Fungus pileolo ſubluteo criſpo & veluti puſtulato, lamellis cum pediculo albis. Mich. nou. gen. pl. p. 152. n. 2.
In ſyluis Iulio & Auguſto menſibus potiſſimum reperitur.

Der Hut iſt abgeſchoſſen goldgelb; die Blätter licht zimmetfarb; der Stiel weißlich gelb.
Wird im Julius und Auguſt hauptſächlich in Wäldern angetroffen.

LXIX.

AGARICVS ALBELLVS. Der weiße Muſſeron.

Tom. I. Tab. LXXVIII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo albido; lamellis concoloribus, demum ochroleucis; petiolo tereti, craſſo, pleno, albido, baſi tuberoſo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita albus ſiccus, cute coriacea. Hall. hiſt. n. 2344.
Omphalomyces nanus albidus. Batarr. fung. arim. p. 38. tab. XVI. F.
Fungus eſculentus totus albus, farinam recenter molitam redolens. Mich. nou. gen. pl. p. 145.
Exeunte aeſtate & incipiente vere in pratis, paſcuis, marginibus agrorum & viarum & in dumetis prouenit.

Nota: Fungi, quos Galli Moucerons vocant, diſtinguuntur carne ſicca, albida, cute craſſa, inſtar corii chirothecarum. Sapor omnibus aliis fungis praefertur. Odor farinaceus.

Der ganze Schwamm iſt weiß, wie ein weiſſer Frauenzimmer-Handſchuh, ausgenommen die Blätter, die im Alter gelbbräunlich werden.
Alle Muſſerons der Franzoſen haben lederartige Haut, trockenes weiſſes Fleiſch, mehligen Geruch. Der Geſchmack wird allen Schwämmen vorgezogen.
Dieſen Schwamm findet man im Frühjahre und Herbſte, auf Wieſen, Viehtriften, an denRänden der Aecker und Wege, auch unter Dornhecken.

LXX.

AGARICVS TVBERCVLOSVS. Der hügligte Holzſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXIX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, ſaturate luteo, verſus oram tuberculoſo, margine ſtriato; lamellis numeroſis, flauidis, demum ochroleucis; petiolo tereti, luteo, ſtriato, pleno; velo nullo; annulo ſpurio, fugaci.

Amanita ceruinus, petiolo bulboſo farto; per oram tuberculoſus & ſtriatus. Hall. hiſt. p. 2401.

Der Hut iſt dunkelgelb, gegen den Rand mit kleinen Erhobenheiten beſetzt, am Rande geſtreift; die Blätter ſind lichtbraun mit etwas gelb; der Stiel iſt dunkelgelb, wie der Hut.
Wächſt in den Wäldern auf alten Baumſtöcken und faulem Holze, ſo, daß er auch öfters unter der Erde auf ſelbigen ſitzt.

LXXI.

AGARICVS PILOSVS. Faſerigter Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXX.

Agaricus cauleſcens, ſaepius ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo piloſe ſquamoſo, planiuſculo, luteo, centro faſtigiato, fuſceſcente; lamellis ochroleucis;

leucis; petiolo tereti, ſtriato, piloſe ſquamoſo, pleno, ſuperne annulato, albido, baſi craſſiuſculo, luteo-fuſceſcente; velo nullo; annulo ſpurio.

Ab agarico floccoſo Tab. LXI., ad quem affinitate accedit, differt pilei & petioli colore magis fuſco, ſquamis minoribus piloſis, non ita floccoſis, in petiolo ſparſis, nec per orbes diſpoſitis.

In ſylvis inter muſcos & ad ligna putrida.

Der Hut iſt dunkelgelb, mit zarten haarigen Schuppen beſetzt, in der Mitte erhoben und dunkelbräunlich, die Blätter ſind gelbbräunlich; der Stiel oben weißlich, unten mit haarigen Schuppen beſetzt, wie der Hut, auch von eben der Farbe. Von dem flockigten Blätterſchwamm auf der 61ſten Kupfertafel unterſcheidet er ſich durch die dunklere Farbe und die zärteren am Stiele zerſtreuten und nicht reyhenweiſe geſetzten Schuppen.

Man trift ihn in den Wäldern unter dem Mooſe und auf faulem Holze an.

LXXII.

AGARICVS ARMENIACVS. Der apricoſenfärbige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXXI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo conuexo, obſolete aurantio; lamellis cum virore pallide carneis; petiolo tereti, pleno, albido, fuluo-ſtriato, baſi tuberoſo; velo filamentoſo; annulo nullo.

In ſylvis & paſcuis ſyluaticis aeſtate exeunte & autumno.

Der Hut iſt abgeſchoſſen goldgelb, wie eine Apricoſe; die Blätter ſind blaßleibfarb mit etwas grün gemiſcht; der Stiel iſt weißlich, mit etwas goldgelb geſtreift.

Wächſt im Ausgang des Sommers und im Herbſte in den Wäldern und waldigten Viehtriften.

LXXIII.

AGARICVS CHANTARELLVS. Der gemeine gelbe Pfifferling, oder Rehgeiß.

Tom. I. Tab. LXXXII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo luteo margine lobato, contorto, centro demum depreſſo; lamellis concoloribus, venoſis, ramoſis, criſpis, decurrentibus; petiolo tereti, pleno, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus luteus, pileo plicato, lobato; lamellis venoſis, ramoſis, decurrentibus. Scop. fl. carniol. I. p. 31. (a).

Agaricus luteus; pileolo turbinato, in margine anguloſo, laciniato & varie contorto; lamellis craſſis, venoſis, ramoſis & criſpis. Gled. fung. p. 103.

Agaricus (*Chantarellus*) ſtipitatus, lamellis ramoſis decurrentibus. Linn. fl. ſuec. I. n. 1049. II. n. 1207. Spec. pl. I. p. 1171. II. p. 1639. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 1.
Agaricus caulescens fuluus, pileo concauo: margine reflexo, lamellis erectis, ſtipite breuiſſimo. Linn. fl. lapp. 493.
Merulius Chantarellus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 461. n. 1581.
Merulius flauus, oris contortis & laceris. Hall. hiſt. n. 2326.
Amanita lutea, oris contortis. Dill. gieſſ. p. 179.
Alectorolophoides ſulcis criſpis. Batarr. fung. arim. p. 29. tab. 14. B. & C.
Fungus eſculentus acris, colore vitellino; pileolo turbinato; oris expanſis, vndulatis & pulchre laciniatis; lamellis ſeu coſtis criſpis & veluti ramoſis. Mich. nou. gen. plant. p. 144.
Fungus anguloſus & veluti in lacinias diſſectus. C. Bauh. pin. p. 558. Vaill. pariſ. p. 60. tab. 11. fig. 14. 15.
Fungorum eſculentorum genus XIV. ſpec. 2. Cluſ. hiſt. p. 271.
Fungus veſcus VI. Loeſel. pruſſ. p. 80.
Auricula leporis lutea. Sterb. theatr. fung. p. 59. 60. 61.
Capreolinus Tabern. hiſt. III. p. 196. Popow. vom Meere ad fin.
Oeder fl. dan. tab. CCLXIV.
In ſyluis variis abunde ab Iulio vsque in Septembrem menſem prouenit.

Der ganze Schwamm iſt dottergelb, des Hutes Figur veränderlich.
Man findet ihn häufig in allerhand Arten von Wäldern vom Monath Julius an bis in den September.

LXXIX.

AGARICVS AMARVS. Bitterer Täubling, Pfefferſchwamm, *Bauaris* händiger Täubling.

Tom. I. Tab. LXXXIII.

Agaricus caulescens, plerumque ſolitarius, carnoſus; ſucco lacteſcente, acri, amaro; pileo planiuſculo, cum flauedine albo, demum infundibuliformi; margine repando; lamellis rectiuſculis, ramoſis, connexis, flauidis; petiolo tereti, craſſo, pleno, cum flauedine albo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus piperatus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 451. n. 1550.
Agaricus pileo concauo, ſaepius lacteſcente; lamellis ramoſis; ſtipite nudo cylindraceo. Scop. fl. carniol. I. p. 33. n. 39.
Agaricus pileolo puluinato, integerrimo & in centro profundius depreſſo; lamellis connexis, anguſtis & compactis; petiolo continuo, cylindrico & craſſo. Gled. fung. p. 97. n. X.
Agaricus (*piperatus*) ſtipitatus, pileo planiuſculo lacteſcente: margine deflexo, lamellis incarnato-pallidis (flauidis potius). Linn. fl. ſuec. I. n. 1036. II. n. 1195. β. ſpec. plant. I. p. 1173. II. p. 1641. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 8.
Amanita vmbilicatus, albus, lacte acri manans. Hall. hiſt. n. 2338.
Amanita piperata alba, lacteo ſucco turgens. Dill. cat. gieſſ. p. 179. Berg. viadr. p. 361.

Fungus

Fungus piperatus albus craſſus, lacteo ſucco turgens. I. Bauh. hiſt. III. p. 823. Tourn. inſt. p. 558. Mich. nou. gen. pl. p. 141. Hall. enum. helu. p. 34. n. 1. Rupp. hall. p. 364.
Fungus veſcus IX. Loeſel. pruſſ. p. 82.
Fungus albus acris. C. Bauh. pin. p. 371.
Fungus piperis ſapore, lacteo liquore. Cord. in Dioſc. p. 68.
Piperitis Popowitſch. vom Meere p. 380.
In pratis, paſcuis & ſyluis Septembri & Octobri menſibus.

Der ganze Schwamm iſt weiß, mit etwas wenigem Gelben vermiſcht, der Hut in der Mitte vertieft, die Blätter etwas mehr gelblich. Giebt allenthalben weiſſe, ſcharfe, bittere Milch von ſich.
Wächſt im September und October auf Wieſen, Viehtriften und in Wäldern.

LXXV.

AGARICVS GIGANTEVS. Der rieſenmäßige Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXXIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo campanulato, piloſe ſquamoſo, flauo; lamellis carneis; petiolo tereti, craſſo, piloſe ſquamoſo, fiſtuloſo, flauido; velo filamentoſo; annulo nullo.

Amanita pileo flaueſcente, lamellis butyraceis, annulo araneoſo. Hall. hiſt. n. 2411?
Fungus viſcidus, pileolo fornicato, deſuper ex aureo pallido, ſubtus dilute violaceo, pediculo albo, annulo non permanente cincto, ac radicem verſus craſſeſcente.
In ſyluis autumno.

Der Hut dieſes Schwammes iſt lichtgoldgelb, mit zarten haarigen Schuppen beſetzt; die Blätter ſind leibfarb; der Stiel blaßgelb, mit zarten haarigen Schuppen, wie der Hut.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

LXXVI.

AGARICVS PLVMBEVS. Der bleyfarbe Eyſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXXV. & LXXXVI.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, mediocriter carnoſus; pileo conuexo, griſeo-plumbeo, margine ſtriato, centro demum faſtigiato, fuſceſcente; lamellis albidis; petiolo tereti, albido, valde fiſtuloſo, baſi tuberoſo, voluato; volua coriacea, albida, perſiſtente; velo & annulo deſtitutus.

Amanita volua exceptus, petiolo farinoſo, pileo cinereo, ſtriato, lamellis albis. Hall. hiſt. n. 2395.
Fungus e volua erumpens, pileolo deſuper obſcuro, & ad oras ſtriato, inferne albo, pediculo concolore, cylindrico, valde fiſtuloſo. Et

Fungus e volua erumpens, ſuperne griſeus, inferne albus, pediculo cylindrico, altiori, fiſtuloſo, externe lacero, & medii quaſi coloris. Mich. nou. gen. plant. p. 184.
In ſyluis abiegnis potiſſimum autumno reperitur.

Der Hut iſt bleyfarb, am Rande geſtreift, zuletzt in der Mitte erhaben und bräunlich; die Blätter, der Stiel und das Ey weißlich.

Wird im Herbſte hauptſächlich in Tannenwäldern gefunden.

LXXVII.

AGARICVS CRASSIPES. Der dickſtielige Blätterſchwamm.

= Collybia fusipes

Tom. I. Tab. LXXXVII. & LXXXVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo valde mutabili, conuexo, inciſo, fuſco; lamellis albidis, demum fuſceſcentibus; petiolo mutabili, fuſco, ſurſum craſſiori, ſulcato, pleno; velo & annulo deſtitutus.

Fungus eſculentus, ex vna radice multiplex, ſature rufeſcens, lamellis primum albis, demum concoloribus, pediculo duro, plerumque criſpo, & complanato, ad radicem verſus in acutum ſenſim attenuato. Mich. nou. gen. plant. p. 190.
Stultorum cuculli faſciculoſi. Sterb. theatr. fung. p. 239. tab. 25. H?
In ſyluis autumnali tempore reperiundus.

Der Hut iſt veränderlich, rothbraun, öfters zerriſſen; die Blätter weißlich, im Alter braun; der Stiel von der Farbe des Huts, obenher dick, fleiſchig, tief gefurcht, untenher dünner.

Wird zur Herbſtzeit in Wäldern gefunden.

LXXVIII.

AGARICVS TIGRINVS. Der getiegerte Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. LXXXIX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & faſciculoſus, carnoſus; pileo conuexo, ſubconico, griſeo, ſtriato, maculato; lamellis ſordide albis; petiolo tereti, craſſo, pleno, albido, baſi tuberoſo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita cinereus, petiolo craſſo & farto. Hall. hiſt. n. 2468.
Paſſim in ſyluis, paſcuis, pratis, coemeteriis & hortis, vario tempore.

Der Hut iſt weißgrau, mit dunklern Flecken, zart geſtrichelt; die Blätter und der Stiel ſind ſchmutzig weiß.

Man findet ihn zu verſchiedenen Zeiten in Wäldern, auf Viehtriften, Wieſen, Kirchhöfen und in Gärten.

LXXIX.

LXXIX.

AGARICVS MACVLATVS. Der fleckigte, braune, wilde Fliegenſchwamm.

Tom. I. Tab. XC.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo orbiculari, planiuſculo, fuſco, margine ſtriato, verrucis albis adſperſo; lamellis ſordide albis, dimidiatis ſolitariis; petiolo tereti, pleno, voluato, albido, apice dilatato, baſi ſquamoſo, tuberoſo; annulo perſiſtente, velo ac volua membranaceis, albidis.

Agaricus volua exceptus, pileolo orbiculari, fuſco, maculato, in margine ſtriato; petiolo annulato, in baſin tuberoſam deſinente. Gled. fung. p. 83. n. 1. var. c.

Fungus muſcas interficiens, fuſcus; maculis albis. Buxb. enum. pl. hall. p. 121.

In ſiccioribus, elatioribus, arenoſis ſyluis, paſcuis & pratis ab exeunte aeſtate vſque in ſerum autumnum occurrit cum Agarico muſcario Tab. XXVII. & XXVIII.

Der Hut iſt braun, am Rande geſtrichelt, mit bräunlich weiſſen, bald gröſſern, bald kleinern Warzen beſetzt; der Stiel, die Blätter, die Saamendecke und der Ring ſind weißlich.

Man trift ihn mit dem gemeinen Fliegenſchwamm auf der 27ſten und 28ſten Kupfertafel in trocken, bergigen, ſandigen Wäldern, auf dergleichen Viehtriften und Wieſen an.

LXXX.

AGARICVS PVSTVLATVS. Der klein geſprenkelte röthlichgraue wilde Fliegenſchwamm.

Tom. I. Tab. XCI.

Agaricus caulefcens, plerumque ſolitarius, parum carnoſus; pileo orbiculari, planiuſculo, rufo-cinereo, margine ſtriato, verrucis paruis albidis adſperſo; lamellis ſordide albis, dimidiatis ſolitariis; petiolo tereti, pleno, voluato, albido, rubello, apice dilatato, baſi ſquamoſo, tuberoſo; annulo perſiſtente, velo ac volua membranaceis, albidis.

Cum praecedente occurrit.

Der Hut iſt röthlich grau, mit kleinen weißlichen Warzen; die Blätter, die Saamendecke, der Ring und die Hülle ſind gelblich oder bräunlich weiß; der Stiel iſt weiß, etwas röthlich.

Man trift ihn mit dem vorhergehenden an.

LXXXI.

AGARICVS RVBER. Der rothe Täubling.

Tom. I. Tab. XCII.

Agaricus caulefcens, plerumque ſolitarius; carne ſicca, compacta, fragili, albida; pileo cum flauedine rubro, primum globoſo, dein conuexo, cen-

tro

tro depreſſo, demum infundibuliformi, margine rugoſo; lamellis craſſis, aequalibus, cum flauedine albis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus Ruſſula. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 486. n. 1502. var. 3.
Agaricus pileo plano rubro; lamellis aureis, baſi transuerſim rugoſis &c. Scop. fl. carniol. I. p. 8. n. 11. (a).
Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2373. var. δ.
Fungus eſculentus; pileolo ſuperne rubro, inferne primum albo, dein obſolete luteo; pediculo longiore & craſſiore, ſemper albo. Mich. nou. gen. pl. p. 155. n. 1.
Reliqua Synonyma videantur n. LI. ad Agaricum Ruſſulam, pro cuius varietate & hunc & duo ſequentes omnes autores habent.

Der Hut iſt roth mit etwas gelb, am Rande etwas geſtreift; der Stiel weißlich; die Blätter ſind gelblich weiß.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

LXXXII.

AGARICVS CYANOXANTHVS. Der blaue Täubling.

Tom. I. Tab. XCIII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius; carne ſicca, compacta, fragili, albida; pileo primum globoſo, dein conuexo, centro depreſſo, demum infundibuliformi, margine rugoſo, centro flauido, tum carneo, ac demum in limbo caeruleo, vario; lamellis craſſis, aequalibus, albidis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2373. var. ε.
Fungus eſculentus, pileolo deſuper dilute ianthino, inferne lamellis & pediculo albis. Mich. nou. gen. pl. p. 156. n. 11.
Fungi vmbilicum referentis variegati prima ſpecies. C. Bauh. pin. p. 370.
Cum praecedente reperitur.

Der Hut iſt am Rande hellblau, hernach fleiſchfarb, und in der Mitte gelb, nach und nach in einander gemiſcht; die Blätter und der Stiel ſind weißlich.
Man trift ihn mit dem vorhergehenden an.

LXXXIII.

AGARICVS VIRESCENS. Der graue Täubling oder Gräuling, oder vielmehr Grünling, grüner Täubling, Kremling, grüner Brödling.

Tom. I. Tab. XCIV.

Agaricus caulescens, ſolitarius; carne ſicca, compacta, fragili, albida; pileo conuexo, centro depreſſo, demum infundibuliformi, margine rugoſo, ex viridi

viridi & flauo vario; lamellis craſſis, aequalibus, albidis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2373. var. ζ.
Amanita Kremlinga, magna, aſpera, vireſcens. Dill. cat. gieſſ. p. 178. Berg. viadr. p. 365.
Fungus eſculentus, pileolo puluinato, deſuper e luteo vireſcente, inferne lamellis & pediculo albis. Uti &
Fungus eſculentus, pileolo puluinato, viridi, inferne cum pediculo albo. Mich. nou. gen. plant. p. 152.
Fungus ſyluarum aſper eſculentus primus, ſeu ex albo vireſcentis coloris. I. Bauh. hiſt. III, p. 872.
Fungus magnus viridis. Sterb. Theatr. fung. p. 67. tab. 5. C.
Fungi vmbilicum referentis variegati tertia ſpecies. C. Bauh. pin. p. 370.

Nota: Huic annulum fugaciſſimum tribuit Clariſſ. Gleditſch, quem nec nos vidimus, nec alii Clariſſ. Viri memorant.

Cum praecedentibus autumno in ſyluis & ericetis obuius eſt.

Der Hut iſt grün und gelb, auch grün und weiß ſchattirt; die Blätter und der Stiel ſind gelblich weiß.

Man findet ihn, wie beyde vorhergehende, im Herbſte in den Wäldern und auf den Heyden.

LXXXIV.

AGARICVS FVLVVS. Der lichtbraune Eyſchwamm.

Tom. I. Tab. XCV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, margine ſtriato, rufeſcente, ſaepe albo-maculato; lamellis albidis; petiolo tereti, ſtriato, albido, pleno, baſi tuberoſo, voluato; volua perſiſtente, albida; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus caulescens. pileo plano fuſco, verrucis albis, lamellis flauis, ſtipite cylindrico, baſi craſſiuſculo. Linn. fl. lapp. p. 513. fl. ſuec. I. n. 1081. II. n. 1240?
Fungus e volua erumpens, pileolo fuluo, ad oras ſtriato, inferne albo, pediculo cylindrico, pariter albo. Mich. nou. gen. plant. p. 184? Fortaſſis quoque
Fungus e volua erumpens, pileolo deſuper ex aureo pallido, & a medio ad oras ſtriato, lamellis & pediculo albis. ibid. p. 183.
In paſcuis editioribus ſyluaticis autumno prouenit.

Der Hut iſt vom abgeſchoſſenen Goldgelben an, nach und nach verſchiedentlich lichtbraun; der Stiel und die Blätter ſind weißlich.

Kommt im Herbſte auf bergigen waldigen Viehtriften hervor.

LXXXV.

AGARICVS PRATENSIS. Der wilde Champignon oder Ehegärtel.

Tom. I. Tab. XCVI.

Agaricus caulefcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, ſubtiliſſime ſtriato, albido-griſeo, ſaepe deformi; lamellis ſordide carneis; petiolo tereti, albido, annulato, parum fiſtuloſo, baſi tuberoſo, curuo, fuſceſcente; velo ac annulo perſiſtente, membranaceis, albidis.

Agaricus pratenſis. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 419. n. 1467.
Fungus eſculentus, magnus albus, pileolo fornicato, lamellis ſubrubentibus, pediculo longiore & craſſiore, ample annulato. Mich. nou. gen. plant. p. 174. n. 1. forte & 2. 3. & 4. Uti etiam
Fungus bulboſus, campeſtris, eſculentus, totus albus &c. Eiusd. l. c. p. 170. n. 1. & n. 5. 6. 7. p. 171.
Fungus ſylueſtris. Sterb. theatr. fung. p. 44. tab. 2. A.
In pratis, ſyluis & paſcuis ab Auguſto in autumnum vsque naſcitur. Lamellae non fatiſcentes ab Agarico campeſtri Tab. XXXIII. diſtinguunt.

Der Hut iſt weißlich, die Blätter ſchmutzig fleiſchfarb, der Stiel meiſtens weiß. Wächſt auf Wieſen, Viehtriften und in Wäldern vom Auguſt bis in den Herbſt hinein.

LXXXVI.

AGARICVS NITIDVS. Der glänzende Blätterſchwamm.

Tom. I. Tab. XCVII.

Agaricus caulefcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo flauido, glutinoſo, primum hemiſphaerico, tandem infundibuliformi; lamellis pallide carneis, ramoſis; petiolo tereti, pleno, albido; velo filamentoſo, viſcido, ſplendente; annulo nullo.

Amanita maximus, albus, infundibuliformis. Hall. hiſt. 2339?
Fungus infundibuli forma maximus albus. Buxb. Cent. IV. tab. 1. fig. 1.
Omphalomyces craſſus. Batarr. fung. arim. p. 38. tab. 17. A.
Structura accedit ad Agaricum glutinoſum Tab. XXXVI. Color vero longiſſime recedit.
Prouenit in ſyluis autumno.

Der Hut iſt gelblich, die Blätter ſind licht iſabellenfarb, der Stiel iſt weißlich. Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

LXXXVII.

Volvaria

AGARICVS BOMBYCINVS. Der wolligte Eyſchwamm.

Tom. I. Tab. XCVIII.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, medio faſtigiato, corio voluae fuſceſcente, ſquamoſo obtecto, ad oras albido, piloſo; lamellis

lis dilute carneis; petiolo tereti, pleno, albido, baſi tuberoſo, voluato; velo ac annulo nullis; volua membranacea, flauida, perſiſtente.

Fungus e volua erumpens, pileolo ſupina parte e griſeo ſubobſcuro, prona vero primum albo, poſtea dilute purpureo, pediculo non fiſtuloſo, ſemper albo, radice bulboſa. Mich. nou. gen. plant. pag. 182?
In ſyluis ad arborum truncos & ligna putrida autumnali tempore.

Der Hut iſt in der Mitte mit der gelbbräunlichen Haut des Eyes bedeckt, am Rande weißlich, faſerig, die Blätter ſind iſabellen- oder blaßleibfarb, der Stiel iſt weißlich.
Wird im Herbſte auf faulem Holze und an alten Baumſtöcken angetroffen.

LXXXVIII.

AGARICVS ALLIATVS. Der Knoblauchſchwamm.

Tom. I. Tab. XCIX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, margine plicato, luteo & rufo; lamellis albidis; petiolo tereti, gracili, obſcure rubro, fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus alliaceus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 454. n. 1561.
Agaricus ſtipitatus, pileo conuexo, glabro, e fuſco palleſcente; lamellis albidis; ſtipite atro, nitido. Iacquin. auſtr. p. 196. obſ. 100.
Agaricus pileo ceruino, campanulato, laeui; lamellis concolore; ſtipite obſcure rubro, nudo, procero, cylindraceo, fiſtuloſo. Scop. pl. carniol. I. p. 27. (i).
Amanita flauus, totus ſtriatus, ſubtiliſſimus. Hall. hiſt. n. 2428.
Fungus campeſtris, paruus, luteus, odore allii, lamellis albis, pediculo ſuperna parte concolore. Mich. nou. gen. plant. pag. 744. tab. 78. f. 5.
Fungus minor allii odore. Iuſſ. act. pariſ. 1728. p. 539.
Autumni ſoboles in ſyluis & agris progerminans.

Der Hut iſt licht ockergelb, zuweilen etwas roth; die Blätter ſind weißlich; der Stiel iſt dunkelroth.
Kommt in Wäldern und auf Feldern im Herbſte hervor.

LXXXIX.

AGARICVS CINEREVS. Der graue Miſtſchwamm. — Coprinus fimetarius

Tom. I. Tab. C.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carne deſtitutus; pileo primum cylindraceo, ſquamuloſo, dilute cinereo, centro dilute ſpadiceo, dein campanulato, radiato, tandem plano, margine lacero, reuoluto; lamellis nigricantibus, deliqueſcentibus; petiolo tereti, gracili, ſubtortili, cinereo, fiſtuloſo, baſi craſſiuſculo; velo filamentoſo ſpurio; annulo nullo.

Agaricus pileolo conum acutum faſtigiato piloſo, petiolo in baſi tumido. Gled. fung. p. 108. n. XVI.
Amanita pileo conico ſtriato murino, lamellis nigris. Hall. hiſt. n. 2484.
Fungus hirſutus paruus candidus tenerrimus ac facile in aquam ſolubilis, pileolo in acutum conum faſtigiato, lamellis nigricantibus. Mich. nou. gen. plant. p. 155.
Fungus murinus totus niger vmbilicatus. Vaill. pariſ. p. 66. n. 39.
Fungorum pernicioſorum genus III. Cluſ. hiſt. II. p. CCLXXXVII.
Hydrophorus cinereus. Batarr. fung. arim. p. 53. t. 25. E.
Lapis molaris gracilis. Sterb. theatr. fung. p. 225. n. 83. tab. A.
In ruderatis, macilentis hortis &c. poſt pluuias.

Der Hut iſt lichtgrau, in der Mitte blaßbräunlich, die Blätter ſind ſchwärzlich, der Stiel lichtgrau, mit etwas blaßbräunlichen zuweilen gefleckt.
Man findet ihn nach regnichtem Wetter auf Schutthaufen und in magern Gärten ꝛc.

XC.

AGARICVS RVFOCANDIDVS. Der fleiſchfärbige Miſtſchwamm.

Tom. III. Tab. CCI.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, non carnoſus; pileo primum cylindraceo, e rufo candicante, ſtriato, demum planiuſculo, fuſco, margine lacero, reuoluto, fatiſcente; lamellis nigreſcentibus, demum atris, deliqueſcentibus; petiolo tereti, valde procero, albido, contorto, fiſtuloſo, baſi bulboſo; velo & annulo deſtitutus.

A ceteris fimetariis diſtinguitur pileo reſpectu petioli paruo, petioli fibris contortis.
In ruderatis, hortis, fimetis, & agris nuper ſtercoratis.

Der Hut iſt im Anfang walzenförmig, röthlich weiß und geſtreift, wird hernach glockenförmig, und zuletzt platt, am Rande aufgerollt und zerriſſen; die Blätter ſind ſchwärzlich, im Alter ganz ſchwarzbraun, der Stiel iſt weißlich. Von den übrigen Miſtſchwämmen unterſcheidet er ſich durch den in Anſehung des hohen Stieles kleinen Hut und die zuſammen gedrehten, gewundenen Faſern des Stieles.
Man trift ihn an auf dem Schutte, in Gärten, auf den Miſthaufen und neu gedüngten Aeckern.

XCI.

AGARICVS ACVMINATVS. Der kegelförmige Mooßſchwamm.

Tom. III. Tab. CCII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo conico, pallide murino; lamellis nigreſcentibus, demum atris; petiolo tereti, gracili, atro rubente, fiſtuloſo, baſi bulboſo; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis humidis inter muſcos pullulat.

Der Hut iſt blaß maußfarb, die Blätter ſind ſchwärzlich, der Stiel ſchwarzroth.
Man findet ihn in feuchten Wäldern unter dem Mooſe.

XCII.

XCII.

AGARICVS PVSILLVS. **Der kleine goldgelbe Blätterſchwamm.**

Tom. III. Tab. CCIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo luteo, primum globoſo, tandem planiuſculo; lamellis fuſceſcentibus; petiolo tereti, gracili, ſubtortili, fiſtuloſo, luteo, baſi craſſiuſculo, radicato; velo & annulo deſtitutus.

Fungus pileolo & pediculo luteis, punctis ſubobſcuris creberrime notatis, lamellis vero omnino ſubobſcuris. Mich. nou. gen. plant. pag. 159.
In muscoſis & ericetis autumnali tempore prouenit.

Der Hut und Stiel ſind abgeſchoſſen goldgelb; die Blätter bräunlich.
Kommt im Herbſte auf Heyden und unter dem Mooſe hervor.

XCIII.

AGARICVS OLIVACEVS. **Der braune oder olivenfarbe Täubling.** = Russula alutacea

Tom. III. Tab. CCIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; carne ſicca, fragili, ſolida, albida; pileo primum globoſo, dein conuexo, centro depreſſo, ſubtiliter punctato, oliuaceo, margine tandem ſurſum reflexo; lamellis craſſis, aureis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, roſeo-albido; velo & annulo deſtitutus.

Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2373. var. η.
In ſyluis autumno progerminat.

Der Hut iſt olivenfarb; der Stiel iſt bleich roſenfarb; die Blätter ſind goldgelb.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

XCIV.

AGARICVS FARINVLENTVS. **Der mehlige Waſſerſchwamm.**

Tom. III. Tab. CCV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, albido, puluerulento, centro luteo, laeui, margine demum lacero; lamellis terreis, polline nigreſcente infectis, demum fatiſcentibus; petiolo tereti, procero, albido, fiſtuloſo, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Accedit ad Agaricum truncorum Tab. VI. & Agaricum lignorum Tab. LXVI. quibus iungitur pileo & petiolo puluerulentis. Differt colore albidiore pilei.

 Reperi-

Reperitur pariter ac dicti affines in truncis arborum putridis, fiſtulis aquariis, & inter muſcos.

Der Hut und Stiel ſind ſtaubig weiß, in der Mitte iſt der Hut gelblich und glatt; die Blätter ſind erdfarb.

Vom gelblichen Kappenſchwamm auf der 6ten Kupfertafel und dem Holzwaſſerſchwam̃ auf der 66ſten, denen er wegen des gleichſam ſtaubigen Hutes und Stieles verwandt iſt, unterſcheidet er ſich durch die weiſſere Farbe des Hutes.

Wird gleichfalls wie erſtgemeldte auf faulen Holzſtöcken, Teicheln und unter dem Mooſe gefunden.

XCV.

AGARICVS ALECTOROLOPHOIDES. Der dunkelgelbe Pfifferling oder Rehgeiß, Rehling.

Tom. III. Tab. CCVI.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, carnoſus; pileo ſaturate luteo, punctato, planiuſculo aut infundibuliformi, margine lobato, contorto; lamellis concoloribus, venoſis, ramoſis, rectis, decurrentibus; petiolo tereti, pleno, baſi attenuato, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus *Chantarellus.* Linn. vid. ſynonyma ad n. LXXIII. Tab. LXXXII. Tom. I.
Alectorolophoides coſtulis rectis. Batarr. fung. arim. p. 39. tab. 14. C.
Fungus eſculentus, acris, pulchre croceus, pileolo turbinato, ad oras angulato, & ſubtus repando. Mich. nou. gen. pl. p. 143.
Fungus angulofus & velut in lacinias ſectus C. Bauh. pin. p. 371. Varietas 2.
Gallinacei ſubcrocei coloris, figura auriculae. Caſalp. hiſt. p. 619.
In ſyluis cum Agarico Chantarello Tab. LXXXII.

Dieſer Schwamm unterſcheidet ſich von dem gemeinen Pfifferling oder Rehgeiß durch die dunklere goldgelbe Farbe, durch die geraden Saamenblätter und den gedippelten Hut.

Man findet ihn übrigens mit dem gemeinen in den Wäldern.

XCVI.

AGARICVS VMBILICATVS. Der weißlichte nabligte Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCVII.

Agaricus caulefcens, ſolitarius & ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, ſordide albo, centro depreſſo, flauido; lamellis concoloribus; petiolo tereti, pleno, concolore; velo & annulo deſtitutus.

a) Varietas ſolitaria.
Fungus albus, infundibulum imitans, pediculo tenuiori. Mich. nou. gen. pl. p. 145. n. 4.
Fungus albus, paruus & habitior, pileolo vmbilicato, ac in plures partes, tanquam per elaſticam vim vtplurimum ſe diuidens, cute lacera ibid. n. 6.

Fungus

Fungus lutoſe albus, pileolo plano, pediculo longiore, cylindraceo, non fiſtuloſo. ibid. n. 7. forte etiam n. 12. 13. 14.
Fungus paruus, totus albus, pileolo in medio vmbilicato. l. cit. p. 146. n. 23.
b) Varietas ceſpitoſa.
Agaricus vmbilicatus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 431. n. 1490?
Agaricus candidus, ex vna baſi multiplex; pileolo vmbilicato. Gled. fung. p. 131. var. b.
Amanita faſciculoſa, alba, ad arborum radices. Dill. cat. gieſſ. p. 180.
Fungus ex vna radice multiplex, totus albus, infundibuli forma, pediculo tumido. Mich. nou. gen. pl. p. 190. n. 2. forſan & ceteri n. 3. 4. 5. 6.
Fungi vmbilicum exprimentes, plures ſimul, albi. C. Bauh. pin. p. 370. I. Bauh. hiſt. III. p. 83.
In ſyluis ad radices arborum poſt pluuias autumnali tempore creſcit.

Der ganze Schwamm iſt gelblich oder bräunlich weiß.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern an den Wurzeln der Bäume nach Regenwetter.

XCVII.

AGARICVS SEMIPETIOLATVS. Der kleine geſtielte Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus; pileo planiuſculo, concauo, lobato, ſubtiliter ſtriato, ochroleuco, circulis alternis concentricis, pallidioribus & ſaturatioribus; lamellis fere concoloribus, ramoſis; petiolo obuerſe conico, curuulo, concolore, pleno; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus membranaceus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 459. n. 1576.
Agaricus ſquamoſus, rufeſcens, pediculo donatus, ſubtus lamellis denſis. Mich. nou. gen. pl. p. 123. n. 18. forte quoque n. 4. n. 19. & 20.
Amanita ſemipetiolatus albidus, ſubtus terreus. Hall. hiſt. n. 2338.
Amanita ſemipetiolatus niueus. ibid. n. 2337?
Fungus paruus lamellatus, pedunculi forma, alno adnaſcens. Vaill. pariſ. p. 70. t. 10. f. 7?
Fungus arboreus albus durus, lamellis inſtar lapidis haematitis. Buxb. cent. V. t. 10. f. 1. & 2?
In trabibus, ſepibus, arboribusque ſemiputridis ſub finem autumni & hyemis primordia.

Der ganze Schwamm iſt bräunlich, der Hut iſt dünn, häutig, mit lichtern und dunklern geſtrichelten Kreiſen, am Rande wellenförmig ausgeſchweift, öfters auch mit weißlichten Körnern beſtreuet, fig. 1. und 2. die Blätter ſind bräunlich, der Stiel umgekehrt kegelartig.

Wächſt zu Ende des Herbſtes und zu Anfang des Winters auf Balken, an Zäunen und halbverfaulten Bäumen.

XCVIII.

AGARICVS FILAMENTOSVS. Der pomeranzenfärbige Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCIX.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, piloſo, ſquamoſo, aurantio, demum plano; lamellis flauo-cinnameis; petiolo tereti, piloſo, ſubcuruo, pleno, aurantio; velo membranaceo; annulo ſpurio fugaci.

Agaricus filamentoſus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 441. n. 1520.
Amanita flauus, pileo hemiſphaerico ſquamoſo. Hall. hiſt. n. 2424.
Fungus totus per maturitatem coloris aurantii. Vaill. pariſ. p. 64. n. 20.
Fungus ex luteo rufeſcens, cute ſupernae pilei partis lacera & veluti ſquamoſa. Mich. nou. gen. pl. p. 127.
Fungus alno adnaſcens, pileolo amplo, clypeato, tenuioris ſubſtantiae, deſuper ex fuluo luteſcente, inferne lamellis, & pediculo breuiori, obſolete luteis. Mich. gen. pl. p. 158?
In ſyluis ſuper ligna putrida autumno inuenitur.

Der Hut und Stiel ſind pomeranzengelb mit dunklern haarigen Schuppen beſetzt; die Blätter ſind dunkelgelb, faſt zimmetfarb.
Wird im Herbſte in den Wäldern auf faulem Holze gefunden.

XCIX.

AGARICVS HELVOLVS. Der fahlgelbe Miſtſchwamm.

Tom. III. Tab. CCX.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo primum conico, tandem campanulato, ſquamoſo, ſordide luteo; lamellis terreis, nigro polline infectis, demum atris; petiolo tereti, gracili, longo, fiſtuloſo, fuſceſcente; velo & annulo deſtitutus.

Fungus fimetarius, pileolo extinctorii forma, leucophaeo, lamellis nigris, pediculo tenuiori, praealto, fiſtuloſo & ſupernae pileoli parti concolore. Mich. nou. gen. pl. 157. n. 7.
In ſyluis, agris & pratis vere & autumno, praeſertim in ſtercore bubulo.

Der Hut iſt fahlgelb mit dunklern Schuppen beſetzt; die Blätter ſind erdfarb, zuletzt ſchwarz; der Stiel iſt bräunlich.
Man trift ihn im Frühjahre und Herbſte in Wäldern, Feldern und Wieſen, zumal im Kühkoth an.

C.

AGARICVS PALLESCENS. Der bleiche gefältelte kleine Kappenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXI.

Agaricus caulefcens, plerumque ceſpitoſus, non carnoſus; pileo ſubconico, ſtriato, ſpadiceo-cinereo; lamellis murinis; petiolo tereti, gracili, longo, fiſtuloſo, albido; velo & annulo deſtitutus.

Fungus

Fungus paruus, ex vno pede multiplex, pileolo griſeo & vbiuis ſtriato, inferne nigricante, pediculo albo, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. p. 195. n. 2.
Ad arborum radices inter muſcos vere & autumno propullulat.

Der Hut iſt bräunlich grau, durchaus geſtrichelt; der Stiel weißlich; die Blätter ſchwärzlich.
Man findet ihn an den Wurzeln der Bäume im Frühjahre und Herbſte.

CI.

AGARICVS INFVNDIBVLIFORMIS Der geſtrichelte gelbe Trichterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo infundibuliformi, ſtriato, piloſo, lateritio, circulis alternis concentricis pallidioribus & ſaturatioribus; lamellis ramoſis, decurrentibus, flauidis; petiolo tereti, pleno, flauido, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis & ericetis autumno pullulat.

Der Hut iſt ziegelfarb, mit hellern und dunklern Kreiſen, mit glatt anliegenden Faſern vom Mittelpunkt heraus geſtrichelt; die Blätter ſind nebſt dem Stiele gelblich.
Man trift ihn im Herbſte auf Heyden und in den Wäldern an.

CII.

AGARICVS MOLLIS. Der weiche Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXIII.

Agaricus acaulis, ſolitarius, gelatinoſo-membranaceus; pileo multiformi, albido, caeſio & giluo vario; lamellis ochroleucis; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus lacteus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 458. n. 1574?
Agaricus albus, ſeſſilis, planus, mollis, glaber, lamellis ſimplicibus. Scop. fl. carniol. I. p. 38. (a)?
Amanita ſemipetiolatus niueus. Hall. hiſt. n. 2337? Ita videtur.
Creſcit in marcidis arboribus.

Der Hut iſt weißlich, mit etwas lichtbräunlich und bläulich hin und wieder ſchattirt; die Blätter ſind blaßbraun, auch erdfarb.
Wächſt auf abſtehenden Bäumen.

CIII.

AGARICVS XERAMPELINVS. Der purpurbraune Täubling.

Tom. III. Tab. CCXIV. & CCXV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo fuſco-purpureo, punctato, primum globoſo, dein conuexo, planiuſculo, centro depreſſo; lamellis

craſſis, flauis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, cum purpura albido; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus Ruſſula. Scop. fl. carn. II. P. II. n. 1502. var. 3.
Agaricus pileo plano rubro; lamellis aureis, baſi transuerſim rugoſis; ſtipite rubro, cylindraceo, nudo. Scop. fl. carn. I. p. 8. n. 11. (a).
Amanita petiolo farto, pileolo conuexo vmbilicato, oris rugoſis, lamellis craſſis & albis. Hall. hiſt. n. 2373. var. δ.
Fungus eſculentus; pileolo ſuperne rubro, inferne primum albo, dein obſolete luteo; pediculo longiore & craſſiore, ſemper albo. Mich. nou. gen. plant. p. 155. n. 1.
Fungus piperatus, non lacteſcens, coloris braſilici. Vaill. pariſ. p. 63.
Reperitur cum affinibus autumno in ſyluis.

Der Hut iſt abgeſchoſſen purpurfarb und bräunlich; die Blätter ſind gelb; der Stiel iſt weißlich mit etwas purpurfarb.

Wächſt unter den übrigen Täublingen im Herbſte in den Wäldern.

CIV.

AGARICVS MARGARITACEVS. Der perlenfarbige Miſtſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXVI.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carne deſtitutus; pileo primum fuſiformi, dein ſemiouato, ſtriato, purpureo-griſeo, centro fuſceſcente, tandem campaniformi, margine lacero, reuoluto; lamellis nigricantibus, demum atris, fatiſcentibus; petiolo tereti, procero, ſordide griſeo, fiſtuloſo, baſi bulboſo; velo & annulo deſtitutus.

Affinis porcellaneo Tab. XLVI. & XLVII. ſed ſquamae pilei & annulus fugax deficiunt.
Reperitur in ruderatis & inter folia & ligna putrida ſyluarum & hortorum autumno poſt pluuias.

Der Hut iſt ſilberfarb und bleich purpurfarb gemiſcht, in der Mitte bräunlich, gegen den Rand zu geſtreift; die Blätter ſind ſchwärzlich; der Stiel ſchmutzig grau.

Wird im Herbſte nach Regenwetter auf Schutthaufen, und unter dem faulen Laub und Holz der Wälder und Gärten angetroffen.

CV.

AGARICVS CANDICANS. Der weißliche Wieſenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCVII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, cum pauca flauedine albido, viſcido; lamellis vmbrinis; petiolo tereti, pleno, albido, baſi craſſiuſculo; velo filamentoſo ac annulo fugaci albidis.

Fungus

Fungus eſculentus, paruus, pileolo puluinato, albo, & limacino glutine infecto, lamellis murinis, pediculo pariter albo, gemino & peranguſto annulo cincto. Mich. nou. gen. pl. p. 172?
In ſyluis, pratis & agris vere prouenit.

Der Hut iſt gelblich weiß, etwas ſchleimig und glänzend; die Blätter ſind braun; der Stiel ebenfalls weißlich.

Man findet ihn im Frühjahre in den Wäldern, auf den Wieſen und Aeckern.

CVI.

AGARICVS PRASINVS. Der graßgrünliche Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, luteo-vireſcente, viſcido, ſquamoſo; lamellis numeroſis, luteis; petiolo tereti, craſſo, pleno, flauido, baſi tuberoſo; velo ac annulo deſtitutus.

Amanita pileo puluinato viridi, lamellis obſcure luteis. Hall. hiſt. n. 2434?
Amanita totus viridis. Hall. hiſt. 2460?
Fungus luteus & ad praſinum nonnihil tendens, pileolo craſſo. Mich. nou. gen. pl. p. 147. num. 2?
Fungus veſcus XXVII. Loeſel. pruſſ. p. 86?
In ſyluis montoſis autumno prouenit.

Der Hut iſt grünlich gelb; die Blätter und der Stiel ſind bräunlich gelb.

Man findet ihn in bergigen Wäldern im Herbſte.

CVII.

AGARICVS RVTILANS. Der feuerfarbe unächte Täubling. — Tricholoma rutilans Sch.

Tom. III. Tab. CCXIX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, rutilo, demum planiuſculo, medio faſtigiato; lamellis flauis; petiolo tereti, craſſo, breui, pleno, flauido, ſuperne purpuraſcente, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Ad Ruſſulas ex reliquis characteribus pertinet, ſed pileus medio faſtigiatus, non vero depreſſus ſiue vmbilicatus, dubium facit.
In ſyluis autumno prouenit.

Der Hut iſt pomeranzen- oder feuerfarb; die Blätter ſind gelb; der Stiel iſt gelblich, oberwärts bleich purpurfarb.

Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

CVIII.

AGARICVS COLLINVS. Der weißliche Herbſtwieſenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXX.

Agaricus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, vix carnoſus; pileo conuexo, albido, viſcidulo, centro faſtigiato, luteolo, margine ſtriato; lamellis albis; petiolo tereti, gracili, fiſtuloſo, albo, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus collinus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 432. n. 1492.
Fungus niuei candoris aemulus, viſcidus, lamellis paruis, rarioribus, pediculo fiſtuloſo. Mich. nou. gen. pl. p. 145. n. 16.
Fungus paruus, coriaceus, viſcidus, totus albus, lamellis rarioribus, ſeu inter ſe longe diſtantibus. ibid. p. 146. n. 20.
Autumno in pratis & agrorum marginibus progerminat cum Colchico.

Der Hut iſt weißlich, etwas ſchleimig, in der Mitte etwas gelb bräunlich; Blätter und Stiel ſind weiß.
Man findet ihn zur Herbſtzeit auf Wieſen, Aengern und an den Rainen.

CIX.

AGARICVS GILVVS. Der fahlgelbe unächte Täubling.

Tom. III. Tab. CCXXI.

Agaricus caulescens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, ſaepe deformi, pallide luteo; lamellis craſſis, luteo-albidis; petiolo tereti, craſſo, pleno, albido, baſi craſſiore; velo ſpurio; annulo nullo.

Amanita ſiccus, pileolo albido, lamellis craſſis flaueſcentibus. Hall. n. 2416?
Etiam hic tota ſtructura Ruſſulam ſeu Fungum vmbilicatum refert, ſed velum ſpurium, quod ceteri Ruſſulae non habent, ab iisdem ſeparat.
Autumno in ſyluis & ericetis prouenit.

Der Hut iſt fahlgelb; die Blätter ſind weißlich, etwas gelblich; der Stiel iſt weiß.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern und auf Heyden.

CX.

AGARICVS ACICVLA. Der ſtecknadelförmige Blätterſchwamm.

Hygrocybe acicula Sch

Tom. III. Tab. CCXXII.

Agaricus caulescens, ſolitarius, non carnoſus; pileo primum conico, poſtea conuexo, coccineo; lamellis paucis aureis; petiolo tereti, gracillimo, fiſtuloſo, flauo, tenuiter radicato; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus coccineus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 436. n. 1503?
Agaricus pileo coccineo, campanulato, laeui; lamellis, cum procero, ſetaceo, caudato ſtipite, albis. Scop. fl. carniol. I. p. 28. n. 31. (a)?
Amanita flauus, viſcidus, pileolo conico. Hall. hiſt. n. 2421. var. β.
Fungus alpinus, totus ſature coccineus, ſeu kermeſinus, pileolo hemiſphaerico. Mich. nou. gen. pl. p. 150.
Fungus paruus coccineus. Vaill. pariſ. p. 66.
Inter muſcos in ſyluis quandoque reperitur.

Der Hut iſt hochroth, höchſtens ſo groß, als ein Hanfkörnlein; die Blätter ſind goldgelb; der Stiel weiß, ſo dünn als eine ſtarke Stecknadel, etwas über einen Zoll hoch.

Man findet ihn zuweilen unter dem Mooſe in den Wäldern.

CXI.

AGARICUS FASCIATUS. **Der kleine Mooßſchwamm mit geriefτem Stiele.**

Tom. III. Tab. CCXXIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, ceruino, ſaepe deformi; lamellis purpuraſcentibus; petiolo tereti, ſulcato, ſaepe ſquamoſo, pleno, fuſceſcente, baſi craſſiuſculo, ſubpurpureo; velo & annulo deſtitutus.

Monomyces puſillus rigidus. Batarr. fung. arim. p. 44. tab. XX. B.
In ſyluis inter muſcos ad radices arborum autumno reperitur.

Der Hut iſt braunroth, faſt rehfarb; die Blätter ſind blaß purpurfarb; der Stiel iſt bräunlich, gefurcht, unten dicker, abgeſchoſſen purpurfarb.

Wächſt zur Herbſtzeit in den Wäldern unter dem Mooſe, an den Wurzeln der Bäume.

CXII.

AGARICUS TREMULUS. **Der ſulzigte Holzſchwamm.**

Tom. III. Tab. CCXXIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, gelatinoſo-coriaceus; pileo concauo, ſaepe deformi, dimidiato, lacero, cinereo-fuſco, circulis concentris, pallidioribus & ſaturatioribus, alternis; lamellis ſordide albis; petiolo tereti, breui, pleno, griſeo, baſi tenuiori; velo & annulo deſtitutus.

Agaricum infundibulum dimidiatum imitans, por oras vndulatum, ſuperna parte obſcurum, & veluti ſericum, inferne lamellatum, & album. Mich. nou. gen. pl. p. 123. t. 65. f. 2.
Accedit ſtructura ad Agaricum ſemipetiolatum Tab. CCVIII. excepto colore.
Creſcit in ſyluis inter muſcos & ad truncos arborum putridos autumno potiſſimum.

Der Hut iſt bräunlichgrau, mit hellern und dunklern Kreiſen, am Rande ausgeſchweift und zerſpalten, öfters verunſtaltet; die Blätter ſind ſchmutzig weiß; der Stiel iſt grau; der ganze Schwamm weich und zitternd.

Wächſt im Herbſte in den Wäldern, unter dem Mooſe und an alten Baumſtöcken.

CXIII.

AGARICVS CANDIDVS. Der weißliche Täubling.

Tom. III. Tab. CCXXV.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo plano, piloſe ſquamoſo, albido, centro depreſſo; lamellis craſſis, ramoſis, connexis, albidis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus albus, acris, pileolo turbinato, centro depreſſo, lamellis anguſtis, vndulatis, ramoſis & ſaepius coniunctis. Gled. fung. p. 99. n. X. var. b.
Amanita maximus, albus, infundibuliformis. Hall. hiſt. n. 2339.
Amanita infundibuliformis, non lacteſcens. Berg. viadr. p. 361.
Omphalomyces craſſus. Battar. fung. arim. p. 38. t. 17. A.
Fungus albus infundibuli forma, non lacteſcens. Hall. enum. helu. p. 34. n. 2. Rupp. hall. p. 364.
Fungus eſculentus. totus albus, pileolo plano, pediculo breuiore. Mich. nou. gen. plant. p. 145. n. 2.
Fungus infundibuli forma, maximus, albus. Buxb. cent. IV. t. 1. f. 1.
Fungus non veſcus V. Loeſel. pruſſ. p. 89.
Fungus albus, pileo inuerſo. I. Bauh. hiſt. III. p. 825. &
Fungus magnus, totus albus, ſine lacteo ſucco edulis, *Columbettes* Montbelgardenſibus. Eiusd. p. 826.
Fungus vmbilicum referens variegatus. C. Bauh. pin. p. 370. var. 5.
In ſyluis autumno prouenit.

Nota: Quod aliqui autores & hunc & alios fungos modo eſculentos, modo noxios eſſe aſſerunt, id ex varia eiusdem fungi aetate, loco natali & tempeſtate accidere certo perſuaſus ſum. Noſter enim hic fungus, dum recens eſt, omnino edulis & innoxius eſt, ac petiolum plenum gerit, dum vero ſenio conficitur, petioli ſubſtantia medullaris primum fit laxa, poroſa, goſſypina, medullæ ſambuci ſimilis, tandem petiolus fit cauus, ac tum demum edulis amplius non eſt fungus, ſed noxius.

Der Hut dieſes Schwammes iſt etwas gelblich weiß, und haarig ſchuppig; die Blätter und der Stiel ſind weiß.

Man findet ihn im Herbſte in den Wäldern.

CXIV.

AGARICVS PVLVERVLENTVS. Der bräunliche weißgeſtäubte Mooßſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXVI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, vix carnoſus; pileo primum ſubconico, tandem planiuſculo, ochroleuco, polline albo conſperſo; lamellis dilute cinnameis, paucis; petiolo tereti, gracili, fiſtuloſo, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Bulla

Bulla platicephala. Batarr. fung. arim. p. 57. t. 28. D?
Autumno inter muſcos ad radices arborum pullulat.

Der Hut iſt hellbraun, ganz dünne weiß beſtäubt; die Blätter ſind blaß zimmetfarb; der Stiel iſt hellbraun.

Wird im Herbſte unter dem Mooſe an den Wurzeln der Bäume angetroffen.

CXV.

AGARICVS SCROBICVLATVS. Der rauhe Hirſchling oder Herbſtling, mit dem maſerigen hohlen Stiele.

Tom. III. Tab. CCXXVII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, parum carnoſus; ſucco flaueſcente acri ſcatens; pileo conuexo, hirſuto, flauo, centro concauo, margine fornicato, ſubuerſo; lamellis ramoſis, pallidioribus; petiolo tereti, breui, craſſo, lacunato, flauido, fiſtuloſo; velo ſpurio, piloſo; annulo nullo.

Agaricus ſcrobiculatus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 450. n. 1551.
Agaricus pileo ſulphureo, concauo, lacteſcente; lamellis pallidioribus, ramoſis; ſtipite lacunato, fiſtuloſo, breui. Scop. fl. carniol. I. p. 33. (a).
Fungus piperatus, lacteſcens, craſſus, pallidus, lamellis albidis, pediculo ſupernae pileoli parti concolore, & lichenis pulmonarii, arborei inſtar lacunato. Mich. nou. gen. pl. p. 141.
Prouenit in ſyluis autumnali tempore.

Der Hut iſt gelb, über und über haarig; der Stiel und die Blätter ſind etwas blaſſer von Farbe; der Stiel wie mit Narben oder Gruben beſetzt; die Milch im Anfang weiß, aber bald hernach ſchwefelgelb.

Wird im Herbſte in den Wäldern angetroffen.

CXVI.

AGARICVS CRINITVS. Der bleiche rauhe Hirſchling oder Herbſtling.

Tom. III. Tab. CCXXVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; ſucco flaueſcente acri ſcatens; pileo conuexo, piloſo, rufo-griſeo, centro concauo, margine fornicato, ſubuerſo; lamellis ramoſis, concoloribus; petiolo tereti, breui, pleno, concolore; velo ſpurio, piloſo; annulo nullo.
Cum praecedente reperitur.

Der Hut iſt wie des vorhergehenden haarig, in der Mitte vertieft, am Rande gewölbt und einwarts gebogen; die Farbe des ganzen Schwammes iſt röthlichgrau; der Stiel iſt voll und ohne Maſern oder Narben.

Man trift ihn mit dem vorhergehenden an.

CXVII.

CXVII.

AGARICVS PYRAMIDATVS. Der zugeſpitzte braune Mooßſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXIX.

Agaricus caulеſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo conico, acuminato, ſtriato, glutinoſo, ceruino; lamellis ruſeſcentibus; petiolo tereti, procero, gracili, fiſtuloſo, pallido; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis & pratis humidis poſt pluuias aeſtate exeunte pullulat.

Der Hut iſt rehfarb, kegelförmig; die Blätter ſind braunröthlich; der Stiel iſt bleich, ſtrohfarb.

Wächſt zu Ausgang des Sommers nach Regenwetter in feuchten Wäldern und Wieſen.

CXVIII.

AGARICVS FRAGILIS. Der zerbrechliche kleine Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXX.

Agaricus caulеſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo conuexo, aureo-fuſco, centro papillato, ad ambitum vsque ſtriato; lamellis flauis; petiolo tereti, gracili, fragili, pleno, nitido, aureo-fuſco; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus (*fragilis*) ſtipitatus, pileo conuexo viſcido, pellucido, lamellisque luteis, ſtipite nudo. Linn. ſpec. pl. I. p. 1175. II. p. 1643. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 21.
Amanita flauo-cinnameus, viſcidus, ſtriatus, papillatus. Hall. hiſt. n. 2425.
Amanita parua, ſtriata, flauo-fuſci vbiuis coloris. Dill. cat. gieſſ. p. 182.
Fungus paruus, flauo-fuſcus, pileolo galericulato, a medio ad peripheriam ſtriato. Mich. nou. gen. plant. pag. 170.
Fungus pediculo croceo, ſplendoris participe. Vaill. pariſ. p. 69. t. 11. f. 16. 17. 18.
Creſcit in lignis putridis & inter muſcos ac deiecta folia.

Der Hut iſt dunkel goldgelb, am Rande geſtreift; in der Mitte mit einer kleinen Warze beſetzt; die Blätter ſind hellgelb; der Stiel noch dunkler als der Hut.

Wächſt auf faulem Holze, unter dem Mooſe und abgefallenem Laube.

CXIX.

AGARICVS DVBIVS. Der unbeſtimmte harte Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXXI.

Agaricus? acaulis, lignoſus, totus quantus irregularis & deformis; ſubſtantia pilei aemula, nodoſa; tuberculis variae magnitudinis, glabris, ochroleucis; ſubſtantia lamellarum aemula, ſparſim interiacente, excauata, fuſco-griſea,

griſea; ſinubus vario modo flexuoſis, confluentibus inter ſe, maioribus & minoribus, ita vt laminae, ſi quae ſint, labyrinthiformes dici debeant.

Ad arbores vetuſtas reperitur. Num varietas monſtroſa Agarici quercini Tab. LVII. dici queat?

Dieſer unordentliche Holzſchwamm iſt an den glatten erhabenen Theilen lichtbraun, an den Vertiefungen bräunlich grau.

Man trift ihn auf alten Bäumen an.

CXX.

AGARICVS NIVEVS. Der weiſſe Blätterſchwamm mit ablaufenden Saamenblättern.

Tom. III. Tab. CCXXXII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, albo, centro depreſſo, margine ſtriato; lamellis longe decurrentibus, albis, minoribus interpoſitis; petiolo tereti, procero, fiſtuloſo, albo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus niueus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 430. n. 1488.
Agaricus albus, pileo conuexo, glabro, viſcido; ſtipite cylindrico, fiſtuloſo, nudo. Scop. fl. carn. I. p. 16. (b).
Agaricus candidus, pileolo plano & viſcido; lamellis paucis & anguſtis; petiolo fiſtuloſo. Gled. fung. p. 119. (c).
Fungus niuei candoris aemulus, viſcidus; lamellis paruis, rarioribus; petiolo fiſtuloſo. Mich. nou. gen. pl. pag. 145. n. 16.
In ſyluis opacis ſub finem aeſtatis prouenit.

Hut, Blätter und Stiel ſind von dieſem Schwamm von einerley gelblichweiſſen Farbe. Der Hut iſt am Rande gefältelt; die Blätter weit am Stiele herablaufend, mit darzwiſchen liegenden kleinern.

CXXI.

AGARICVS DIMIDIATVS. Der halbrunde Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXXIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, ſquamoſo, mutabili, dimidiato, ſpadiceo-griſeo; lamellis ramoſis, albidis; petiolo breui, craſſo, laterali, pleno, inuerſe conico, albido; velo & annulo deſtitutus.

Affinis Agarici lateralis Tab. LXXI. & LXXII. Sed differt pileo ſquamoſo, nec glabro, ſpadiceo-griſeo, nec obſcuro, petioli baſi tenuiori, nec bulboſa.
Creſcit in ſyluis ad truncos arborum.

Der Hut dieſes Schwammes iſt ſchuppig, blaßbräunlich, erhoben, veränderlich, halbrund; die Blätter ſind weißlich; der Stiel oben dicker als unten, weißlich, an der Seite des Huts. Iſt mit dem ſchiefſtieligtem Blätterſchwamm auf der 71ſten und 72ſten Kupfertafel verwandt, aber durch den ſchuppigen Hut, hellerer Farbe und dem unten dünnern Stiele von ſelbigem unterſchieden.

Wächſt in den Wäldern an den Stämmen der Bäume.

CXXII.

AGARICVS ATRORVFVS. Der braunrothe Mooßſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXXIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo ſubconico, ſtriato, fuſco; lamellis concoloribus; petiolo tereti, gracili, concolore, fiſtuloſo, baſi bulboſo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus paruus, atro-rufeſcens, pileolo conico, obtuſo, a vertice ad marginem leuiter ſtriato; lamellis rarioribus; petiolo praealto, tenui & fiſtuloſo. Gled. fung. p. 127. n. XXV. var. h.

Fungus paruus, totus atro-rufeſcens, pileolo deſuper, vndique & leuiter ſtriato, ſubtus rare lamellato, pediculo praetenui & fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. p. 167.

Fungus paruus, pileolo fornicato, deſuper obſcuro, & magis ad oras, quam ad reliquas partes pulchre ſtriato, inferne lamellis fuſco-griſeis, pediculo lineam craſſo, medii coloris & argutiſſime perforato. Mich. nou. geu. plant. p. 169?

In ſyluis inter muſcos ad radices arborum verno tempore obuius eſt.

Der Hut und der untere Theil des Stieles iſt dunkel rothbraun, der Hut in der Mitte etwas zugeſpitzt, am Rande geſtrichelt; die Blätter und der obere Theil des Stieles ſind etwas lichterer Farbe.

Man trift ihn im Frühjahre an den Wurzeln der Bäume an.

CXXIII.

AGARICVS FVSCVS. Der braune Hirſchling oder Herbſtling, Wieſen-Reitzker.

Tom. III. Tab. CCXXXV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; ſucco lacteo acri ſcatens; pileo convexo, planiuſculo, centro depreſſo, margine fornicato, ſubuerſo, fuſco, circulis concentricis alternis, pallidioribus & ſaturatioribus; lamellis albidis; petiolo tereti, breui, craſſo, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus pileolo hemiſphaerico, in margine fornicato, ſpadiceo, lamellis cum breui petiolo luteo-fuſcis. Gled. fung. p. 103. n. XI. var. e?

Amanita piperata, fuſca, lacteo ſucco turgens. Dill. cat. gieſſ. p. 179?

Autumni progenies, incola pratorum & paſcuorum.

Der

Der Hut iſt braun, mit lichtern und dunklern Kreiſen, am Rande etwas unterwarts gebogen, in der Mitte vertieft; die Blätter ſind weißlich; der Stiel weißlich, ins braune ſpielend.

Wächſt im Herbſte auf Wieſen und Viehtriften.

CXXIV.

AGARICVS GRISEVS. Der kleine graue Mooßſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXXVI.

Agaricus caulescens, ſolitarius, non carnoſus; pileo conuexo, cinereo, per tempeſtatem ſpadiceo; lamellis concoloribus, paucis; petiolo tereti, gracili, ſubtortili, fiſtuloſo, radicato, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Fungus griſeus, gracillimus, pileolo galericulato, pediculo lineam craſſo, praealto, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. pl. pag. 147.

Autumno inter muſcos in ſyluis ad radices arborum reperitur.

Der ganze Schwamm iſt weißgrau, durch naſſes Wetter röthlich braun.

Wird im Herbſte in den Wäldern unter dem Mooſe an den Wurzeln der Bäume angetroffen.

CXXV.

AGARICVS SPADICEOGRISEVS. Der fahlgraue Holzwaſſerſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXXXVII.

Agaricus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo primum conico, tandem planiuſculo, ſpadiceo griſeo, ſtriato, centro laeui, faſtigiato; lamellis violaceo-vmbrinis, tandem terreis; petiolo tereti, procero, gracili, fiſtuloſo, baſi craſſiuſculo, albo; velo & annulo deſtitutus.

Amanita cinereo ſpadiceus, cute ſtriata, lamellis vmbrino violaceis. Hall. hiſt. n. 2467?

Fungus paruus, ex vno pede multiplex, ſubfuſcus, pileolo galericulato, vbiuis ſtriato. pediculo tenui, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. pl. pag. 195. &

Fungus paruus, ex vno pede multiplex, pileolo griſeo & vbiuis ſtriato, inferne nigricante, pediculo albo, fiſtuloſo. Ibidem.

Ad arborum radices & ligni putridi fragmenta vere & autumno prouenit.

Der Hut iſt fahlgrau, in der Mitte erhaben und glatt, übrigens geſtrichelt; die Blätter ſind im Anfang blaß und abgeſchoſſen veyelfarb, (gris de lin, lilac) zuletzt ſchwarzbräunlich; der Stiel iſt weiß.

Wächſt an den Wurzeln der Bäume und auf faulem Holze im Frühling und Herbſte.

CXXVI.

AGARICVS NITENS. Der glänzende weiße Täubling.

Tom. III. Tab. CCXXXVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo, demum infundibuliformi, viſcido, flauido-albo; lamellis craſſis, ramoſis, concoloribus; petiolo tereti, pleno, curuo, concolore, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus eſculentus albus, pileolo plano, viſcidus, lamellis criſpis. Mich. nou. gen. plant. p. 145. n. 2?
Fungus albus infundibulum imitans, pediculo tenuiori. Ibid. n. 4? forſan quoque
Fungus totus albus, infundibulum imitans, pileolo paruo, pediculo longiore. Ibid. n. 12.
In ſyluis creſcit autumno.

Der ganze Schwamm iſt gelblich weiß, der Hut oberwärts glänzend; die Saamenblätter äſtig, dick.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

CXXVII.

AGARICVS ANDROSACEVS. Der kleine weiße Mooßſchwamm mit ſchwarzem Stiele.

Tom. III. Tab. CCXXXIX.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo, vmbilicato, margine plicato, albo; lamellis breuibus, raris, albis; petiolo tereti, procero, capillaceo, pleno, nigricante; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus androſaceus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 457. n. 1570.
Agaricus pileo conuexo, plicato, membranaceo; lamellis remotis; ſtipite nigro, procero, capillaceo, nudo. Scop. fl. carn. I. p. 29. (b).
Agaricus pileolo ſtriato, hemiſphaerico, paruo; lamellis anguſtiſſimis, paucis; petiolo capillaceo altiſſimo. Gled. fung. p. 108. n. XV.
Agaricus (*androſaceus*) ſtipitatus albus, pileo plicato membranaceo, ſtipite nigro. Linn. fl. ſuec. I. n. 1034. II. n. 1193. ſpec. pl. I. p. 1175. II. p. 1644. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 23. Dalib. pariſ. p. 374.
Agaricus cauleſcens albus minimus; petiolo anguſto, pileo plano venoſo: margine octofido. Linn. fl. lapp. 472.
Amanita petiolo nigro, pileo albo ſtriato excarni. Hall. hiſt. n. 2351.
Amanita minima muſcoſa. Dill. cat. gieſſ. p. 182. Berg. viadr. p. 361.
Fungus pileo candicante, lamellis paucis, pediculo fuſco ſplendente. Vaill. pariſ. n. 69. t. 11. f. 21. 22. 23. Mich. nou. gen. plant. pag. 168. n. 5. Hall. enum. helu. p. 36. n. 13. Rupp. hall. p. 365.
Fungus minimus, adianti aurei pediculis, an Mithridaticus Menzelii. Sher. ap. Rai. hiſt. III. p. 19. Syn. III. n. 49. Buxb. plant. hall. p. 124.

Fungus caule nigro capillari, androſaces capitulo. Bocc. muſ. p. 143. tab. 104.
In foliis ac conis deiectis, vti & ramulis pini & abietis, inter muſcos & ad ligna putrida reperitur.

Der Hut und die Blätter ſind weißlich, der Stiel zumal untenher ſchwärzlich; der Hut in der Mitte etwas vertieft, am Rande geſtreift.

Man findet ihn auf abgefallenem Nadellaub und Zapfen, auch auf kleinen Aeſtgen der Fichten und Tannenbäume, unter dem Mooſe und auf faulem Holze.

CXXVIII.

AGARICVS GVTTATVS. Der geſprenkelte unächte Eyſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXL.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo primum ſubconico, demum planiuſculo, rubello, lacero-ſquamoſo, ſquamis trapeziis rufo-fuſcis, voluae reliquiis, margine ſtriato; lamellis albidis, alternis integris, interne latioribus, dimidiatis verſus ambitum interiectis; petiolo tereti, breui, pleno, albido, baſi tuberoſo, voluato; volua inferne euanida; velo & annulo deſtitutus.

Pertinet ad Agaricos voluatos, volua parua & non ſpecioſa, in ſuperna parte pilei remanente in fragmenta ſolida, pediculo non annulato, pileolo ſtriato. Vid. Mich. nou. gen. pl. pag. 140. Peculiaris lamellarum ſtructura, alternis integris interne latioribus, prominulis, dimidiatis verſus ambitum interiectis, muſcariis eundem appropinquare facit, defectus annuli vero ab iisdem ſeparat.
In ſyluis autumno obuius eſt.

Der Hut iſt röthlich weiß mit rothbraunen Flecken beſetzt, die Blätter und der Stiel ſind weiß.

Man trift ihn zur Herbſtzeit in den Wäldern an.

CXXIX.

AGARICVS BVLBOSVS. Der weiße glatte unächte Eyſchwamm mit hohem knolligten Stiele.

Tom. III. Tab. CCXLI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo primum globoſo, demum hemiſphaerico, albo; lamellis concoloribus; petiolo tereti, procero, annulato, pleno, concolore, baſi tuberoſo, voluato; volua euanida, velo membranaceo & annulo perſiſtente albis.

Amanita albus, laeuis, puluinatus, annulatus. Hall. hiſt. n. 2353.
Fungus bulboſus, campeſtris, eſculentus, totus albus, pediculo palmari, non fiſtuloſo, peranguſto annulo cincto. Mich. nou. gen. pl. n. 1. Quod ſynonymum ergo deleatur ad Agaricum pratenſem n. LXXXV. tab. XCVI.

In agrorum marginibus, pratis & ad ſepes autumno prouenit.

Der ganze Schwamm iſt weiß, der Hut ohne Glanz.

Wächſt an Rainen und Zäunen, auch auf Wieſen im Herbſte.

CXXX.

AGARICUS SYLVATICUS. Der wilde bräunliche Campignon oder Ehegärtel.

Tom. III. Tab. CCXLII.

Agaricus caulescens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo primum ſubgloboſo, demum planiuſculo, ſquamoſo, ochroleuco; lamellis ſordide carneis; petiolo tereti, craſſo, annulato, fiſtuloſo, ſordide albo, baſi tuberoſo, ſaepe curuo; velo & annulo perſiſtente, membranaceis, albidis.

Fungus eſculentus, pileolo hemiſphaerico, griſeo ceruino, inferne lamellis dilute purpureis, pediculo longo, cylindrico, albo, annulo perangusto cincto. Mich. nou. gen. plant. p. 175. n. 2. &

Fungus pernicioſus, ſuperne griſeus & leucophaeus, inferne dilute purpureus, pediculo albo, breuiore, annulato. Ibid. n. 3.

Fungus eſculentus, pileolo deſuper ex fuluo ſubobſcuro, cute lacera, inferne dilute purpureo, pediculo longo, albo, annulato, ac radicem verſus craſſeſcente. Ibid. p. 176.

In ſyluis & ad ſepes, quandoque etiam in hortis creſcit autumno.

Der Hut iſt licht ockerbraun, mehr oder weniger ſchuppig; die Blätter ſind ſchmuzig fleiſchfarb; der Stiel bräunlich weiß.

Man findet ihn im Herbſte in den Wäldern, an den Zäunen, zuweilen auch in Gärten.

CXXXI.

AGARICUS DEGENER. Der verunſtaltete Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXLIII.

Agaricus caulescens, plerumque ceſpitoſus, parum carnoſus; pileo plerumque infundibuliformi, margine lobato, reuoluto, fuſceſcente, circulis concentricis, alternis pallidioribus & ſaturatioribus; lamellis ? ſinuoſis, venoſis, decurrentibus, pallidioribus; petiolo tereti, ſulcato, pleno, pileo concolore; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus plerumque multiplex; pileo fuſco, plicato, lobato; lamellis venoſis, ramoſis, decurrentibus, flauis; ſtipite compreſſo, breui, pariter flauo. Scop. fl. carn. I. p. 32. (b).

Merulius hiſpidulus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 462. n. 1582.

Superficies ſuperior pilei Agarico fuſco n. CXXIII. Tab. CCXXXV. ſimilis, inferior Eluelae VI. Gled. fung. p. 42.

Ad radices arborum inter muſcos & in truncis putridis creſcit.

Der

Der ganze Schwamm iſt bräunlich; die Blätter und der obere Theil des Stieles ſind etwas blaſſer.
Wächſt an den Wurzeln der Bäume unter dem Mooſe und an faulen Holzſtöcken.

CXXXII.

AGARICVS HYALINVS. Der meergrüne Eyſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXLIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo, margine ſtriato, hyalino; lamellis ſordide flauidis; petiolo tereti, albo, hyalino & roſeo vario, valde fiſtuloſo, baſi tuberoſo, voluato; volua coriacea, albida, perſiſtente; velo & annulo deſtitutus.

Exceptis coloribus accedit Agarico plumbeo n. LXXVI. Tab. LXXXV. & LXXXVI. tota ſtructura & habitu, vt forte ſola varietas.

In ſyluis abiegnis autumno pariter occurrit.

Der Hut iſt meergrün, die Blätter ſchmutzig gelblich, der Stiel weiß, mit meergrün und roſenfarb vermiſcht, die Hülle gelblich weiß.
Iſt dem bleyfarben Eyſchwamm n. LXXVI. auf der 85ſten und 86ſten Kupfertafel, die Farben ausgenommen, dem Baue nach ähnlich.
Wird auch im Herbſte in Tannenwäldern gefunden.

CXXXIII.

AGARICVS BADIVS. Der Caffeebraune Eyſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXLV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo primum ſubouato, demum late conico, badio, margine ſtriato; lamellis integris, ochroleucis; petiolo tereti, craſſo, longo, valde fiſtuloſo, albido, baſi tuberoſo, voluato; volua coriacea, albida, perſiſtente; velo ac annulo deſtitutus.

Fungus e volua erumpens, pileolo deſuper obſcuro, & ad oras ſtriato, inferne albo, pediculo concolore, cylindrico, valde fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. p. 184.

In ſyluis autumno prouenit.

Der Hut iſt dunkelbraun, am Rande geſtreift; die Blätter ſind bräunlich weiß; der Stiel und die Hülle ſind weißlich.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

CXXXIV.

AGARICVS ALNEVS. Der Erlenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXLVI.

Agaricus acaulis, ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceo-gelatinoſus; pileo ſemielliptico, planiuſculo, hirſuto, margine ſublobato, colore vario; lamellis bifidis, puluerulentis; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus

Agaricus alneus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 460. n. 1580.
Agaricus ſeſſilis, coriaceus, villoſus; lamellis puluerulentis, ramoſis, bifidis. Scop. fl. carn. I. p. 38. n. 45.
Agaricus lamellatus cinereus. Batarr. fung. arim. p. 73. t. 38. C. D.
Agaricus ſeſſilis, ſquamoſus, lobatus & villoſus, lamellis diſſectis. Gled. fung. p. 134.
Agaricus ſeſſilis, ſquamoſus, corpore pectunculi in modum lobato, deſuper fuluus & villoſus, lamellis profunde ſectis. Ibid. p. 135. var. a.
Agaricus (*alneus*) acaulis; lamellis bifidis, puluerulentis. Linn. fl. ſuec. I. n. 1083. II. n. 1242. ſpec. plant. I. p. 1176. II. p. 1645. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 27.
Agaricus lamellatus, pectunculi forma, maior. Dill. cat. gieſſ. p. 192.
Agaricus imbricatus, hirſutus, lamellis violaceis. Buxb. cent. V. tab. 7. fig. 1.
Amanita ſeſſilis, laminis puluerulentis bifidis. Hall. hiſt. n. 2333.
Agarico-fungus; lamellis bifidis, puluerulentis. Hall. enum. p. 58. n. 4. Rupp. hall. p. 371.
Agaricum ſquamoſum, arboribus adnaſcens, lobis pectunculum mentientibus, ſuperne ſubhirſutus, & albis ac albicantibus ſtriis ſecundum longitudinem excauatus, inferne lamellis craſſioribus, prorſus albis. Mich. nou. gen. pl. p. 122. n. 1.
Agaricum ſquamoſum & fuluum, lobis pectunculi forma, ſuperne hirſutum, inferne lamellatum. Ibid. p. 123. n. 9.
Ad truncos fatiſcentes alni & aliarum etiam arborum, hyeme & vere.

Hut und Blätter ſind an dieſem Schwamm von verſchiedener Farbe, nachdem deſſelben Alter und die Witterung iſt. Meiſtentheils iſt der Hut am Rande, wie eine Kammmuſchel gefaltet, wie Fig. 1. anzeiget. Die Blätter ſind allezeit geſpalten, der ganze Schwamm nicht viel über einen Zoll breit.
Man trift ihn auf vermoderten Erlen und andern Baumſtöcken im Winter und Frühling an.

CXXXV.

AGARICVS CAESAREVS. Der Kayſerling, Herrenbilz.

Tom. III. Tab. CCXLVII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo primum ouato, demum planiuſculo, centro faſtigiato, margine ſtriato, rutilo-aureo; lamellis lucide flauis, dimidiatis ſolitariis exterioribus; petiolo tereti, craſſo, pleno, ſtriato, annulato, flauido, baſi tuberoſo, voluato; volua membranacea, ampla; velo & annulo perſiſtente, membranaceis, flauidis.

Agaricus caeſareus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 419. n. 1466.
Agaricus ampliſſima volua exceptus, aureus, pileolo hemiſphaerico, in margine ſtriato; petiolo annulato, craſſo, annulo latiſſimo cincto. Gled. fung. p. 85. n. 11. var. b.
Amanita flauus, voluatus, annulo latiſſimo. Hall. hiſt. n. 2430.
Amanita plana, orbiculata, aurea. Dill. cat. gieſſ. p. 179.
Fungus ouinus. Sterb. theatr. fung. p. 64. 65. tab. 4. D. E. F.
Fungus planus, orbiculatus, aureus. C. Bauh. pin. p. 371. Tourn. inſt. p. 557. Mich. nou. gen. pl. p. 186. tab. 77. fig. 1.

Fungi lutei, magni, dicti Iaſeran, ſpecioſi. I. Bauh. hiſt. III. p. 831.
Fungorum eſculentorum genus XVII. Cluſ. hiſt. p. CCLXXII.
Eluela Ciceronis, Volua Plinii, Boletus Anguillarae & Caeſalpini. Batarr. fung. arim. p. 27. tab. 4. C.

In ericetis, pinetis, aliisque ſiccioribus & elatioribus locis ſyluaticis ſub aeſtatis & autumni primordia prouenit.

Fungorum princeps & dominus, gratiſſimi ſaporis & elegantiſſimi coloris, infamis veneficio Agrippinae Auguſtae, quae coniugem Tiberium Claudium Neronem, Caeſarem Auguſtum, eiusmodi fungo, veneno illito, ſuſtulit, vt Domitium Neronem filium ſuum & Claudii priuignum ad imperii culmen eveheret. Hinc Iuvenalis ſales Satyra V. v. 146.

Vilibus ancipites fungi ponentur amicis,
Boletus Domino, ſed qualem Claudius edit,
Ante illum vxoris, poſt quem nihil amplius edit.

Et Satyra VI. v. 620.

- - - Minus ergo nocens erit Agrippinae
Boletus; ſiquidem vnius praecordia preſſit
Ille ſenis, tremulumque caput deſcendere iuſſit
In coelum, & longam manantia labra ſaliuam.

Etiam illud Martialis.

Quid dignum tanto ventrique gulaeque precabor?
Boletum vt, qualem Claudius edit, edas.

Hinc & ipſe Nero Boletum Deorum cibum eſſe cauillatus, quia illo periiſſet Claudius Caeſar & defuncti Caeſares in Deorum numerum referri ſolerent, teſte Suetonio.

Nota: Volua in figura I. deficit, nec annulus ſatis latus eſt, cum ad fungum iam ſeneſcentem icon depicta fuerit.

Der Hut dieſes Schwammes iſt dunkel goldgelb, die Blätter ſind lebhaft zitronengelb, der Stiel, die Saamendecke und der Ring ſind ebenfalls gelblich.
Man trift ihn zu Anfang des Sommers und Herbſtes auf Heyden, in Fichtenwäldern und andern trockenen, erhabenen, waldigen Gegenden an.

CXXXVI. & CXXXVII.

AGARICVS TVBAEFORMIS. Der trompetenförmige Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXLVIII. & CCXLIX.

Agaricus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, lignoſus; pileo infundibuliformi, ſaepe deformi, pallide aureo; lamellis ſimplicibus, denticulatis, decurrentibus, concoloribus; petiolo tereti, longo, curuo, ſquamoſo, ſtriato, lacunato, pleno, concolore; velo & annulo deſtitutus.

Ad truncos arborum vetuſtos reperitur.

Der Hut und Stiel ſind blaß goldgelb, die Blätter noch blaſſer, der Stiel lang, verſchieden gekrümmet, geſtrichelt und gemaſert.
Wird auf alten Holzſtöcken angetroffen.

CXXXVIII.

AGARICVS PVLLVS. Der ſchwarzbraune Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCL.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, vix carnoſus; pileo ſubconico, campanulato, ſtriato, atro-fuſco; lamellis ſordide albis, demum terreis; petiolo tereti, procero, pleno, albido, demum fiſtuloſo, baſi tuberoſo, acuminato, fuſco; velo & annulo deſtitutus.

Fungus campanulatus, pileolo obſcuro, vertice laeui, reliqua parte ſtriato, ſubtus lamellis, & fiſtuloſo ac cylindrico pediculo albis. Mich. nou. gen. plant. p. 168. n. 1?

Ad ligna putrida, inter muſcos & folia deiecta ſyluarum autumno creſcit.

Der Hut iſt recht dunkelbraun, die Blätter und der obere Theil des Stieles ſind ſchmuzig weiß, der Stiel untenher bräunlich.

Wird zur Herbſtzeit auf faulem Holze, unter dem Mooſe und abgefallenem Laube in den Wäldern angetroffen.

CXXXIX.

AGARICVS TRVNCATVS. Der abgeſtuzte Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo primum ſubconico, apice truncato, demum conuexo, planiuſculo, lateritio-rufo; lamellis ſordide albis; petiolo tereti, craſſo, breui, pleno, albido, baſi tuberoſo, fuſceſcente; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus purpuraſcens. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 424. n. 1477?

Agaricus pileo conuexo, ſubrubro, viſcido; lamellis vna cum bulboſo nudo & pleno ſtipite albis. Scop. fl. carniol. I. p. 13. n. 18. (d)?

Agaricus caulefcens; pileo conuexo, purpuraſcente viſcido; lamellis albis; ſtipite attenuato, pallido. Linn. fl. lapp. n. 490. fl. ſuec. I. n. 1073. II. n. 1232?

In paſcuis ſyluaticis autumno reperitur.

Der Hut iſt dunkel ziegelroth, öfters mit einem gelblichen Rande; die Blätter und der obere Theil des Stieles ſind weißlich, der untere Theil des Stieles bräunlich.

Man trift ihn im Herbſte auf waldigen Viehtriften an.

CXL.

AGARICVS CYATHIFORMIS. Der becherförmige Holzſchwamm, giftige Tannenpfifferling.

Tom. III. Tab. CCLII.

Agaricus caulefcens, ſolitarius, vix carnoſus; pileo infundibuliformi, luteo, punctato-ſtriato, margine repando, ſublobato, nonnihil ſubuerſo; lamellis

lis pallidis, ramoſis, decurrentibus; petiolo tereti, breui, pleno, pallide luteo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus aureus infundibuli forma. *Peuera malefica, dorata*. Mich. nou. gen. pl. p. 147.
In ſyluis abiegnis autumni tempore ad radices & truncos arborum deiectarum. Noxius.

Der Hut ſieht in etwas dem Pfifferling oder Rehgeiß ähnlich, iſt becherförmig, am Rande etwas überſtülpt, wellenförmig, auch zuweilen geſpalten, von Farbe abgeſchoſſen goldgelb mit länglichen Punkten geſtrichelt, die Blätter ſind blaß gelb, der Stiel kurz, von mittlerer Farbe.

Man trift ihn zur Herbſtzeit in Tannenwäldern an den Wurzeln und Stöcken der umgeworfenen und abgehauenen Bäume an. Iſt ſchädlich.

CXLI.

AGARICVS CHRYSOPHAEVS. Der dunkelgoldgelbe Holzſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo primum ſubconico, apice truncato, demum campaniformi, ſaturate aureo, pulverulento; lamellis flauidis; petiolo tereti, procero, pleno, cum pauco flauedine albo, demum fiſtuloſo, baſi tuberoſo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus paruus, pileolo conico, ſuperna parte aureo, lamellis, & pediculo tenuiore, albis. Mich. nou. gen. pl. p. 152?
Lignis putridis inſidens, ac inter muſcos degens, ſyluarum incola, autumnique progenies.

Der Hut iſt dunkel goldgelb, mit Staub beſtreuet; die Blätter ſind hellgelb; der Stiel iſt weiß, mit ganz wenigem gelb, unten dicker.

Wächſt auf faulem Holze im Herbſte in den Wäldern, unter dem Mooſe.

CXLII.

AGARICVS PVRPVREVS. Der purpurfarbe Täubling.

Tom. III. Tab. CCLIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, parum carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, ſaturate purpureo, centro depreſſo; lamellis craſſis, ramoſis, connexis, flauis; petiolo tereti, pleno, albo; velo & annulo deſtitutus.

Ad Ruſſulas pertinere indicant pileus centro depreſſus, margine rugoſus, lamellae craſſae, ramoſae, connexae; petiolus breuiuſculus, caro ficca, fragilis, albida.
Autumno in ſyluis ericetisque creſcit.

Der Hut iſt dunkel purpurfarb; die Blätter gelb; der Stiel weiß.

Wächſt im Herbſte in Wäldern und Heiden.

CXLIII.

AGARICVS OCHRACEVS. Der ockerbraune Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo planiuſculo, mutabili, ochraceo; lamellis albidis; petiolo tereti, gracili, fiſtuloſo, albido; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis autumno ad radices & truncos arborum creſcit.

Der Hut iſt ockerbraun; die Blätter und der Stiel ſind bräunlich weiß.

Wächſt im Herbſte in den Wäldern an den Wurzeln und Stöcken der Bäume.

CXLIV.

AGARICVS ALBVS. Der ganz weiſſe Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLVI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, tandem plano, albo; lamellis craſſiuſculis, albis, exterioribus dimidiatis, interiacentibus; petiolo tereti, pleno, longiuſculo, albo, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus eſculentus paruus & habitior, totus albus & viſcidus. Mich. nou. gen. plant. p. 145. n. 10?

In ſyluis autumno creſcit.

Der ganze Schwamm iſt weiß; zwiſchen den längern Saamenblättern liegen gegen den Rand zu kleinere; der Stiel iſt länglich, unten dicker.

Wird im Herbſte in den Wäldern gefunden.

CXLV.

AGARICVS LACER. Der zerſpaltene Blätterſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLVII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo primum conico, demum planiuſculo, albido, centro faſtigiato, margine ſtriato, ſaepe reuoluto, lacero; lamellis concoloribus; petiolo tereti, ſtriato, pleno, albido, baſi craſſiuſculo, ſaepe radicato; velo & annulo deſtitutus.

Fungus ſubalbidus, oris laceris, pediculo craſſiore, radice granuloſa. Mich. nou. gen. plant. p. 145. n. 5.

In ſyluis humidis autumno reperitur.

Der ganze Schwamm iſt weißlich, von lockerem Gewebe.

Wächſt im Herbſte in feuchten Wäldern.

CXLVI.

AGARICVS CAESAREVS iunior, in euolutione & mox poſt eandem, reliquiis voluae in pileo & ad baſin petioli adhuc conſpicuis, annuloque adhuc latiori.

Der Kayſerling oder Herrenbilz in, und bald nach ſeiner Entwickelung, da die Ueberbleibſel des Eyes oder Hülle, theils oben auf dem Hute, theils unten am Stiele noch ſichtbar ſind, und der Ring noch breiter iſt.

Tom. III. Tab. CCLVIII.

Deſcriptio & ſynonyma videantur ad n. CCXXXV. & Tab. CCXLVII.

CXLVII.

AGARICVS OEDEMATOPVS. Der dickſtieligte Stockſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLIX.

Agaricus cauleſcens, plerumque ceſpitoſus, carnoſus; pileo ſubconico, rufo, puluerulento; lamellis rufeſcentibus; petiolo tereti, craſſo, pleno, rufeſcence, puluerulento, baſi attenuato; velo & annulo deſtitutus.

Fungus eſculentus, ex vna radice multiplex, ſature rufeſcens, lamellis primum albis, poſtea concoloribus, pediculo duro, plerumque criſpo, & complanato, ac radicem verſus in acutum ſenſim attenuato. Mich. nou. gen. pl. p. 190?

In ſyluis vere & autumno reperitur.

Der Hut iſt rothbraun, gleichſam mehlig beſtäubt; die Blätter und der Stiel ſind braunröthlich, letzterer ebenfalls beſtäubt.

Wird im Frühjahre und Herbſte in den Wäldern gefunden.

CXLVIII.

AGARICVS MONSTROSVS, cum duobus minoribus quaſi inuerſis pileo innatis.

Ein verunſtalteter Blätterſchwamm, mit zwey kleinern, gleichſam umgekehrten oben auf dem Hut ſitzenden Schwämmgen.

Tom. III. Tab. CCLX.

Num ſit varietas monſtroſa Agarici craſſipedis Tab. LXXXVII. & LXXXVIII. aut ceruini Tab. X?

Vielleicht eine Abartung des dickſtieligten Blätterſchwammes auf der 87 und 88ſten Kupfertafel, oder des rehfarbigen, auf der 10den Kupfertafel.

CXLIX.

AGARICVS MYODES. Der röthliche wilde Fliegenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXI.

Cum Agarico puſtulato n. LXXX. Tab. XCI. in reliquis omnibus, excepto colore pilei, conuenit, qui illi rufo-cinereus, huic carneus, verrucaeque pilei illi paullo minores.

Kommt mit dem klein geſprenkelten röthlich grauen wilden Fliegenſchwamm n. 80 auf der 91ſten Kupfertafel, in allem überein, bis auf die Farbe des Hutes, die hier mehr fleiſchfarb, dorten aber mehr grau iſt.

CL.

AGARICUS PSITTACINUS. Der hochgrüne und goldgelbe Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCI.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo primum ſubconico, planiuſculo, viridi-aureo, viſcido, centro faſtigiato, margine ſubſtriato; lamellis baſi dentatis, citrinis; petiolo tereti, gracili, curuulo, fiſtuloſo, ſuperne viridi, inferne aureo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus (*dentatus*) ſtipitatus, pileo conuexo, lamellis baſi mucrone dentatis. Linn. ſpec. pl. I. p. 1172. II. p. 1640. fl. ſuec. II. n. 1206. ſyſt. nat. XII. p. 722. n. 5.
Agaricus cauleſcens, pileo flauo laeui margine inflexo, lamellis pallidioribus baſi angulatis. Linn. fl. ſuec. I. n. 1048.
Amanita flauus, viſcidus, pileolo conico. Hall. hiſt n. 2421. var. γ & δ.
Fungus paruus, totus viridis, & ad aureum nonnihil tendens, ac limacino glutine oblitus, pileolo extinctorii forma, pediculo fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. p. 150.
Fungus viſcidus, glutine flauo limacino ſplendens. Vaill. pariſ. p. 62. n. 14.
Locis herbidis inter herbas & muſcos reperitur autumnali tempore.

Der Hut iſt hochgrün und goldgelb, ſchleimig und glänzend; die Blätter ſind zitronengelb; der Stiel oberwärts hochgrün, unten goldgelb.

Wird zur Herbſtzeit auf kräuterreichen, graſigen Boden unter dem Graſe und Mooſe gefunden.

CLI.

AGARICUS COCCINEUS. Der hochroth und gelbe Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo primum ſubconico, demum planiuſculo, coccineo-flauo, viſcido, centro faſtigiato, margine ſubſtriato; lamellis baſi dentatis, coccineo-flauis; petiolo tereti, gracili, curuulo, fiſtuloſo, ſuperne coccineo, inferne flauo; velo & annulo deſtitutus.

Agaricus (*dentatus*) &c. Linn. l. cit. vid. praecedens.
Amanita flauus, viſcidus, pileolo conico. Hall. hiſt. n. 2421. var. β.
Fungus alpinus, totus ſaturo-coccineus, ſeu kermiſinus, pileolo hemiſphaerico. Mich. nou. gen. pl. p. 150.

Fungus

Fungus paruus coccineus. Vaill. pariſ. n. 66.
In ſyluis montoſis ac paſcuis pratisque montanis autumno viget.

Der Hut iſt hoch karmeſinroth und gelb untereinander ſchattirt; die Blätter ſind gelb mit etwas karmeſinroth; der Stiel iſt meiſt karmeſinroth.

Wächſt auf bergigen Wieſen, Viehtriften und Wäldern im Herbſte.

CLII.

AGARICVS RVBELLVS. Der blaß purpurfarbe Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCIII.

Agaricus cauleſcens, ſubſolitarius, non carnoſus; pileo primum ſubconico, demum planiuſculo, cum purpura albido, centro faſtigiato, margine ſtriato; lamellis pallide purpureis; petiolo tereti, gracili, curuulo, fiſtuloſo, pilei colore, baſi craſſiuſculo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus paruus, pileolo mammoſo, ſupina parte ex albo ſubuinoſo dilutiſſimo colore, prona vero ſaturo, pediculo candido, vix fiſtuloſo. Mich. nou. gen. pl. p. 156. n. 13.
In ſyluis Auguſto & Septembri menſibus obuius.

Der Hut iſt weiß mit ganz wenig purpurfarb vermiſcht; die Blätter ſind etwas mehr purpurfarb; der Stiel iſt mittlerer Farbe.

Iſt im Auguſt und September in Wäldern anzutreffen.

CLIII.

AGARICVS CARNEVS. Der iſabellfärbige Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCIV.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, non carnoſus; pileo conuexo, planiuſculo, ſquamoſo, farinoſo, giluo-carneo; lamellis raris, ſuaue rubellis; petiolo tereti, gracili, tortili, fiſtuloſo, carneo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus paruus, ſuperne e griſeo rufeſcens, inferne purpureus, pediculo albo, tenui, cylindrico, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. p. 160. n. 2? Et forſan
Fungus eſculentus, ſuperne griſeus, inferne ſuaue rubens, pediculo albo, tenui. Ibid. n. 3.
In vdis inter muſcos, ſcirpos & arundines, vere & autumno.

Der Hut iſt gelblich fleiſchfarb oder iſabellenfarb; die Blätter ſind licht röthlich; der Stiel iſt fleiſchfarb.

Wächſt im Frühjahre und Herbſte an feuchten Orten unter dem Rohre, Binſen und Mooſe.

CLIV.

CLIV.

AGARICUS AGGREGATUS. Der zuſammengehäufte Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCV. & CCCVI.

Agaricus cauleſcens, ceſpitoſus, ſaepius ramoſo-connatus, carnoſus; pileo planiuſculo, fuſco, centro ſaepe concauo, margine lobato, criſpo; lamellis ramoſis, rufeſcentibus; petiolo craſſo, curuo, pleno, ſaepe deformi, albido; velo & annulo deſtitutus.

Fungus ramoſus, maximus, pileolo deſuper griſeo, inferne lamellis, & lanuginoſo pediculo albis. Mich. nou. gen. plant. p. 190.

In ſyluis ad truncos & radices arborum inter muſcos ſub aeſtatis finem reperitur.

Der Hut iſt braun, auf verſchiedene Art gekrauſt, geſpalten und gebogen; die Blätter ſind äſtig röthlich; der Stiel iſt bräunlich weiß.

Wird zu Ende des Sommers an den Stämmen und Wurzeln der Bäume unter dem Mooſe angetroffen.

CLV.

AGARICUS CLAVAEFORMIS. Der käulenförmige Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCVII.

Agaricus cauleſcens, plerumque ſolitarius, carnoſus; pileo turbinato, ſuperne planiuſculo, ſaepe concauo, paruo, albido, quandoque flauo & roſeo vario, margine criſpo; lamellis decurrentbus, ſurſum & extrorſum verſis, albidis; petiolo tereti, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

Quis ſit? an alterius agarici primordium?

In ſyluis autumno repertus.

Der Hut iſt klein, platt, etwas vertieft, weißlich, manchmal etwas roſenfarb und gelb; die Blätter ſind auswärts und aufwärts gekehret, ablaufend und weißlich; der Stiel ebenfalls weißlich. Vielleicht ein unausgebildeter anderer Blätterſchwamm?

Iſt im Herbſte im Walde gefunden worden.

CLVI.

AGARICUS MINUTULUS. Der ganz kleine Mooßſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCVIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, non carnoſus; pileo campanulato, luteo; lamellis raris, flauidis; petiolo tereti, gracili, curuulo, pleno, albido; velo & annulo deſtitutus.

In ſyluis humidis inter muſcos gregatim naſcitur. Ex minimis eſt.

Der

Der Hut iſt abgeſchoſſen goldgelb; die Blätter ſind gelblich; der Stiel iſt weiß.
Wächſt häufig beyſammen in feuchten Wäldern unter dem Mooſe.

CLVII.

AGARICVS VMBELLIFERVS. Der paraſolförmige Mooßſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCIX.

Agaricus caulescens, ſolitarius, non carnoſus; pileo conuexo, ſubconico, ſtriato, plicato, albido, tandem planiuſculo, centro faſtigiato; lamellis raris, baſi latioribus, albis; petiolo tereti, procero, gracili, fiſtuloſo, albo; velo annuloque deſtitutus.

Agaricus vmbelliferus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 457. n. 1571.
Agaricus pileo conuexo, plicato, membranaceo, tenero; lamellis remotis, ſtipite procero, capillaceo, nudo, lamellis concolore. Scop. fl. carn. I. p. 30. (c).
Agaricus (*vmbelliferus*) ſtipitatus, pileo plicato, membranaceo; lamellis baſi latioribus. Linn. fl. ſuec. I. n. 1033. II. n. 1192. ſpec. plant. I. p. 1175. II. p. 1643. ſyſt. nat. XII. pag. 723. n. 21.
Amanita albus, tener, pileolo campanulato, ſtriato. Hall. hiſt. n. 2346.
Fungus minimus, totus albus, pileolo hemiſphaerico, vtrinque ſtriato, lamellis rarioribus. Mich. nou. gen. plant. pag. 166. tab. 80. fig. 11. Hall. enum. helu. 36. n. 8. Rupp. hall. p. 364.
Fungus paruus candidiſſimus lamellatus, pediculo longo gracili. Rai. angl. 3. pag. 9. Buxb. cent. IV. p. 21. t. 32. f. 3.
In ſyluis inter muſcos ac folia deiecta arborum putreſcentia autumno potiſſimum reperitur, attamen & Maio menſe.

Der Hut iſt weißlich, mit etwas rothbräunlichem vermiſcht; die Blätter und der Stiel ſind weiß.
Wird unter dem Mooſe und abgefallenem faulenden Laube hauptſächlich im Herbſte, doch aber auch im Maymonate, angetroffen.

CLVIII.

AGARICVS ARVENSIS. Der große weiſſe glatte Champignon oder Ehegärtel.

Tom. IV. Tab. CCCX. & CCCXI.

Agaricus caulescens, ſaepius ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, laeui, albo; lamellis primum albis, dein rufis, tandem vmbrinis, fatiſcentibus; petiolo tereti, craſſo, pleno, albido, baſi tuberoſo; velo & annulo perſiſtente membranaceis, albis.

A plerisque autoribus ad Agaricum campeſtrem relatus, differt pileo laeui, nec ſquamoſo, albo, petiolo paulo longiori. Pleraque ſynonyma ſub Agarico campeſtri n. XXVIII. recenſita, etiam ad hunc ſpectant. Speciatim vero huc pertinet

Fungus eſculentus, magnus, albus, pileolo fornicato, lamellis ſubrubentibus, pediculo longiore & craſſiore, ample annulato. Mich. nou. gen. pl. p. 174. n. 1.
Fungus totus albus edulis. Vaill. pariſ. p. 75. n. 8.
In paſcuis & pratis elatioribus ac ſyluaticis autumno gignitur.

Der ganze Schwamm iſt anfangs weiß; die Saamenblätter werden hernach röthlich, endlich bräunlich und erdfarb, und vergehen.

Wächſt auf bergigen und waldigen Viehtriften und Wieſen im Herbſte.

CLIX.

AGARICUS LIMACINUS. Der braune ſchleimige Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo primum ſubconico, demum conuexo, viſcido, atro-fuſco, centro faſtigiato; lamellis cinereis; petiolo tereti, longiuſculo, ſquamoſo, ſtriato, pleno, ſpadiceo-griſeo, maculato; velo filamentoſo; annulo nullo.

Agaricus lubricus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 447. n. 1541?
In ſyluis autumno reperitur.

Der Hut iſt ſchwarzbraun und ſchleimig; der Stiel aſchgrau, mit braun und gelblicher Farbe geſtrichelt; die Blätter ſind lichtgrau.

Wird im Herbſte in den Wäldern angetroffen.

CLX.

AGARICUS MINIATUS. Der gelbrothe Blätterſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXIII.

Agaricus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, filamentoſo, rubroflauo, demum campanulato, patente; lamellis lucide aurantiis; petiolo tereti, craſſo, curuulo, pleno, albido, demum fiſtuloſo; velo & annulo deſtitutus.

Fungus paruus, pileolo ſubhirſuto, & veluti araneoſa lanugine infecto, colore ſubrufo, lamellis ex fuluo-aureis, pediculo cylindrico, albo. Mich. nou. gen. plant. p. 161?
In ſyluis, pratis & paſcuis ſyluaticis autumno creſcit.

Der Hut iſt gelbroth, faſerig, weit glockenförmig; die Blätter ſind hoch pomeranzenfarb; der Stiel iſt weißlich.

Wächſt im Herbſte auf waldigen Viehtriften und Wieſen, auch in den Wäldern ſelbſt.

BOLETI.

BOLETI.

CLXI.

BOLETVS IVGLANDIS. Der Nußbaumbilz.

Tom. II. Tab. CI. & CII.

Boletus ſubacaulis, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo ſemiorbiculari vel ſemielliptico, conuexo, planiuſculo, ſquamoſo, ochroleuco, margine lobato; ſquamis piloſis, reflexis, atro-fuſcis; tubulis amplis, ſubtetragonis, pallidioribus, margine ſerratis, non ſecedentibus; petiolo breui, tuberoſo nigricante, vel nullo.

Polyporus ſeſſilis, conuexo-planus, poris ampliſſimis albidis. Hall. hiſt. n. 2278.
Ad arbores ligni durioris, potiſſimum ad iuglandes reperitur.

Der Hut iſt flach erhaben, oben licht ockerbraun, mit ſchwarzbraunen in die Höhe gebogenen, haarigen Schuppen beſetzt; der untere Theil iſt blaſſer, mit weiten faſt viereckigen, am Rande gezähnten Löchern; der Stiel iſt kurz, knollig, ſchwärzlich, oder mangelt ganz und gar.

Wird an den Bäumen, die hartes Holz haben, beſonders an den Nußbäumen gefunden.

CLXII.

BOLETVS RVFVS. Der rothe Kühbilz, in Bayern der rothkopfige Bilzling.

Tom. II. Tab. CIII.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, marginato, glabro, primum ouato, attracto, miniato, demum planiuſculo, rufo-fuſco; tubulis angulatis, breuibus, ſecedentibus, albidis, demum ochraceis; petiolo tereti, hirſuto, baſi craſſiori, terreo.

Boletus bouinus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 463. n. 1586. var. b.
Boletus ſtipitatus, pileo puluinato, glabro; tubulis connexis, angulatis, carne pilei breuioribus. Scop. fl. carn. I. p. 40.
Boletus pileolo hemiſphaerico; tubulis angulatis, petiolo ventricoſo. Gled. fung. p. 63.
Boletus (*bouinus*) ſtipitatus, pileo glabro puluinato marginato, poris compoſitis acutis; porulis angulatis breuioribus. Linn. ſpec. plant. I. p. 1177. II. p. 1646. fl. ſuec. II. n. 1246. ſyſt. nat. XII. p. 724. n. 11.
Boletus cauleſcens, pileo teſtaceo, poris compoſitis angulatis griſeis. Linn. fl. ſuec I. n. 1087. Dalib. pariſ. 382.
Boletus magnus Iulii menſis. Dill. cat. gieſſ. p. 188. Berg. viadr. p. 366.

Nota: Synonyma hactenus recenſita pluribus aliis ſequentibus communia ſunt.

Polyporus carne ſecedente, petiolatus, pileo ouato miniato, poris ochroleucis, Hall. hiſt. n. 2310.
Suillus eſculentus, craſſus, ſuperne ex rubro ferrugineus, inferne albidus, pediculo concolore, rimoſo, vel ſtriato. Mich. nou. gen. plant. p. 127.
Fungus poroſus, magnus, craſſus, tuberculis minimis exaſperatus, colore aurantii exſiccati. Vaill. pariſ. pag. 59. conuenit cum fig. V. tabulae noſtrae.
Fungus aurantius, pediculo longo. Sterb. theatr. fung. pag. 119. tab. 16. fig. A.
Fungus veſcus XVII. Loeſel. pruſſ. p. 84.
Fungorum eſculentorum genus XVI. ſpec. 3. Cluſ. hiſt. p. CCLXXII.
In ſyluis frequens exeunte aeſtate occurrit.

Der Hut iſt glatt, im Anfange eyrund, hellroth, mit gegen den Stiel angezogenem Rande, hernach mehr platt und rothbraun; der untere Theil anfangs weißlich, hernach bräunlich, mit eckigen kleinen Löchern; der Stiel iſt rauh, erdfarb, oder ſchmutzig weiß, unten dicker; das Fleiſch iſt weiß, und ſondert ſich von den Röhrgen leicht ab.

Iſt zu Ende des Sommers häufig in den Wäldern anzutreffen.

CLXIII.

BOLETVS BOVINVS. Der ſchwarzkopfige Bilzling oder Küh-Bilzling.

Tom. II. Tab. CIV.

Boletus caulescens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, marginato, glabro, fuſco, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, breuibus, ſecedentibus, pallide ſtramineis, demum ochroleucis; petiolo tereti, hirſuto, ſtriato, baſi craſſiori, ſordide albo.

Boletus bouinus. Scop. fl. carn. II. P. II. pag. 463. n. 1586. var. d.
Boletus (*bouinus*). Linn. l. cit.
Polyporus carne ſecedente, petiolatus, pileo ſpadiceo, inferne pallido. Hall. hiſt. n. 2308.
Suillus craſſus, ſuperne obſcurus, inferne luteus, pediculo medii coloris, & ſumma parte ſtriato. Mich. nou. gen. plant. p. 129.
Fungus tertius bufonis. Sterb. theatr. fung. p. 183. n. 18.
Fungorum eſculentorum gen. XVI. ſpec. I. Cluſ. hiſt. pag. CCLXXII.
Fungus poroſus, magnus, craſſus. I. Bauh. hiſt. III. p. 333.
In ſyluis etiam hic frequens autumnali tempore reperitur.

Der Hut iſt oben glatt, braun, im Anfange rund, mit gegen den Stiel angezogenem Rande, hernach mehr platt; der untere Theil anfangs blaß ſtrohfarb, hernach blaß bräunlich, mit eckigen kleinen Löchern; der Stiel iſt haarig geſtrichelt, ſchmutzig weiß, unten dicker; das Fleiſch iſt weiß, und ſondert ſich von den Röhrgen leicht ab.

Auch dieſer iſt häufig in den Wäldern im Herbſte zu finden.

CLXIV.

BOLETUS OLIVACEUS. Der olivenfärbige Kühbilz.

Tom. II. Tab. CV.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, marginato, glabro; oliuaceo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, breuibus, ſecedentibus, flauis, demum pallide oliuaceis; petiolo tereti, ſuperne flauo, baſi craſſiore, purpureo, venis fuſcis reticulato.

Boletus bouinus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 463. n. 1586. var. 1?
Boletus (*bouinus*). Linn. l. cit.
Boletus pileolo craſſo, campanulato, deſuper e flauo ſpadiceo & viſcido, inferius flaueſcente; tubulis anguſtioribus; petiolo breui & tenui concolore, maculis & lituris rubris diſtincto. Gled. fung. pag. 65. n. 1. var. e?
Boletus laeuis & viſcidus, ſuperne coloris fuſci, caſtanei, inferne lutei. Dill. cat. gieſſ. p. 188.
Suillus eſculentus, craſſus, viſcidus, ſuperne obſcurus, inferne ſubluteus, pediculo breui, tenui, concolore, punctis & lituris rubris notato. Mich. nou. gen. plant. p. 128.
Autumno pariter in ſyluis reperiundus.

Der Hut iſt glatt, olivenfärbig, im Anfang eyrund, mit gegen dem Stiele angezogenem Rande, hernach mehr platt; der untere Theil anfangs gelb, hernach blaß olivenfärbig, mit eckigen kleinen Löchern; der Stiel iſt obenher gelb, unten purpurfärbig, und dicker, mit bräunlichen Aedergen gegittert; das Fleiſch iſt weiß, endlich bläulich, und ſondert ſich von den Röhrgen leicht ab.

Wird gleichfalls im Herbſte in den Wäldern angetroffen.

CLXV.

BOLETUS ANNULATUS. Der geringelte Baumbilz.

Tom. II. Tab. CVI.

Boletus acaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo ſemielliptico, conuexo, glabro, verſicolore, margine acuto, faſciis concentricis, ochroleucis, flauis, pallidis, rufis, ſubcaeruleis, atris; tubulis angulatis, tenuiſſimis, breuibus, non ſecedentibus, albidis, demum fuſcis.

Polyporus ſeſſilis, conuexo planus, annulis verſicoloribus, poris albis tenuiſſimis. Hall. hiſt. n. 2283.
Agaricus imbricatus laciniatus maior. Buxb. cent. V. p. 1. tab. 1.
Frequens ad arbores, perſiſtens, immarceſcibilis.

Der Hut iſt halbeyrund, erhoben, mit einem ſcharfen Rande; obenher mit Kreiſen von allerhand Farben gezeichnet, bräunlich, gelb, bleich, rothbraun, bläulich, ſchwärzlich; untenher anfangs weißlich, zuletzt braun, mit ganz kleinen eckigen Löchern. Das Fleiſch iſt weiß, hart, locker, und ſondert ſich von den Röhrgen nicht ab.

Wird häufig an den Bäumen gefunden.

CLXVI.

BOLETVS LVRIDVS. Der ſchwarzgelbe Kühbilz.

Tom. II. Tab. CVII.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, marginato, glabro, luride flauo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, breuibus, ſecedentibus, ex luteo vireſcentibus, apice rubris; petiolo tereti, craſſo, ſuperne flauido, inferne craſſiori, rubro, venis fuſcis reticulato, baſi atro, radicato.

Boletus bouinus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 463. n. 1586. var. n.
Polyporus carne ſecedente, petiolatus, pileolo terreo, inferne aurantio. Hall. hiſt. n. 2307.
Pariter in ſyluis & montibus reperitur autumno.

Der Hut iſt olivenfarb, unten menigroth; die Röhrgen ſind grünlich, nur an der Spitze roth, die Löcher eckig, klein; der Stiel iſt oberwärts ſchmutzig gelb, unten dicker, und roth, überall mit braunen Aedergen gegittert, ganz am Ende ſchwarz, mit Wurzeln verſehen; das Fleiſch iſt gelblich, zuletzt blaulich, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wird gleichfalls im Herbſte in Wäldern und auf Bergen gefunden.

CLXVII.

BOLETVS RETICVLATVS. Gegitterter Kühbilz.

Tom. II. Tab. CCVIII.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, fuſco, rimoſo, pallidius reticulato, primum ſubgloboſo, margine attracto, demum planiuſculo; tubulis anguloſis, paruis, ſecedentibus ex luteo vireſcentibus; petiolo tereti, craſſo, pilei ſupernae parti concolore, venoſo-reticulato, baſi craſſiori.

Boletus bouinus Scop. & aliorum.
Polyporus carne ſecedente, petiolatus, fuluus, inferne vireſcens. Hall. hiſt. n. 2305. var. β.
Fungus poroſus medius, ſuperficie ſordide alba, tuberculis caſtaneis variegata. Vaill. pariſ. p. 59. n. 6.
Fungus poroſus, maximus, craſſus, luteus, lacer, pediculo longiſſimo, vireſcente. Ibid. tab. 14. fig. 6. 7. 8.
In ſyluis montoſis pariter autumno viget.

Der Hut iſt oberwärts braun, hin und wieder gegittert zerriſſen, daß die innere bleichere Haut durchſieht, unten grünlich gelb; die Röhrgen ſind durchaus grünlich gelb; die Löcher eckig, klein; der Stiel iſt von der Farbe, wie die obere Fläche des Hutes, mit dunklern Aedergen gegittert, unten dicker; das Fleiſch iſt weiß, wird blaulich, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wird ebenfalls im Herbſte in den Wäldern und auf Bergen gefunden.

CLXVIII.

BOLETVS AVRANTIVS. Die gelbe Hirſchzunge.

Tom. II. Tab. CIX. & CX.

Boletus ſubacaulis, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, valde difformi, varie lobato, plicato, aurantio; tubulis tenuiſſimis, difformibus, non ſecedentibus, citrinis ſeu paleaceis; petiolo breuiſſimo, craſſo, albido, aut nullo.

a) Tab. CIX. Lobis magis oblongis & laciniatis.
Polyporus ſeſſilis, carnoſus, flauus, digitatus, maximus. Hall. hiſt. n. 2277.
Fungus ramoſus maior aureus, nulla membrana ſuperne tectus. Dill. ſyn. III. p. 22. n. 5.
Fungus caſearius ex Campenhout. Sterb. theatr. fung. p. 170. n. 79. tab. 12. A.
Tab. CX. Lobis magis ſubrotundis, conuexo-planis.
Polyporus ſeſſilis, conuexo-planus, laciniatus, flauus, imbricatus & ceſpitoſus. Hall. hiſt. n. 2291.
Agaricus poroſus, coloris ſature aurantii. Dill. cat. gieſſ. p. 192.
Agaricus igniarius heteroclitus. Batarr. fung. arim. p. 71. t. 37. H.
Agaricum ſquamoſum, ilicibus, lauris & oxyacanthae plerumque adnaſcens. Mich. nou. gen. plant. p. 118. n. 6.
Fungus quernus inſulae Monae. Ephem. Nat. Curioſ. Vol. 1. obſ. 119.
In ſyluis & aliis locis paſſim ad arbores & ligna reperitur. Mollis & eſculentus eſt, facileque putreſcit.

Der Hut iſt pomeranzenfarb, von verſchiedener Geſtalt, lappig, zungenförmig, fingerförmig, blattförmig, unten zitronengelb, ſtrohfarb, auch noch bleicher, mit ſehr kleinen Löchern von verſchiedener Figur; öfters iſt auch ein kurzer, dicker, weißlicher Stiel vorhanden, der ebenfalls mit Löchern verſehen iſt, das Fleiſch iſt vor einen Holzſchwamm ſehr weich und ſchwammig, gehet leicht in Fäulung und iſt mit den Röhrgen völlig verwachſen.

Man trift ihn in den Wäldern auch an andern Orten an den Bäumen und Holzſtöcken an.

CLXIX.

BOLETVS RAMOSISSIMVS. Der Eichhaaſe.

Tom. II. Tab. CXI. CXXVII. CXXVIII. CXXIX.
Tom. III. Tab. CCLXV. & CCLXVI.

Boletus cauleſcens, ramoſiſſimus, carnoſus; pileis conuexis, planiuſculis, medio depreſſis, glabris, lineatis, terreo-fuſcis; tubulis rotundis minutiſſimis, connexis, non ſecedentibus, albidis; petiolo ramoſiſſimo, albido, poroſo.

Boletus ramoſiſſimus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 470. n. 1598.
Boletus imbricatus, ſquamoſus, & ſeſſilis, tubulis minutiſſimis, connexis; lobis fimbriatis, ramoſo-foliaceis. Gled. fung. 75.
Polyporus frondoſus, ceſpitoſus, imbricatus, ſpadiceus, poris albidis. Hall. hiſt. n. 2276.

Agari-

Agaricum ſquamoſum, ceſpitoſum, eſculentum, criſtatum & laciniatum, ſuperne obſcurum, inferne album, foraminulis breuiſſimis, rotundis, exiguis. Mich. nou. gen. pl. p. 119. n. 13.
Agaricus intybaceus. Tourn. inſt. 562.
Fungus maior carnoſior, dendroides, criſtatus. Bocc. muſ. p. 302.
Fungus foliaceus maior, carnoſior, dendroides, criſtatus. Barrel ic. 1268.
Fungus intybaceus & alius, interaneorum vituli ſimilis, cinereus. I. Bauh. hiſt. III. p. 859.
Fungus maximus Vngaricus; multis laciniis ſquamatim incumbentibus. C. Bauh. pin. p. 372.
Fungi eſculenti genus XXI. monſtroſum. Cluſ. hiſt. p. CCLXV.
Florum faſciculus. Sterb. theatr. fung. p. 269. n. 130. tab. 25. A.
In quercubus annoſioribus gignitur ſub autumni initium.

Nota: Duplex eſt varietas, alia pileis ſquamoſis, quaſi foliaceis, petiolis partialibus lateralibus, qualis depingitur Tom. II. Tab. CXXVIII. & CXXIX. criſtam galeae pennaceam quaſi referens, altera pileolis orbicularibus, vmbilicatis, petiolis partialibus teretibus, medio fere pileoli inſertis, Tom. II. Tab. CXI. & Tom. III. Tab. CCLXV. & CCLXVI. depicta.

Dieſer Schwamm iſt über und über äſtig; unten weißlich, mit kleinen Löchern bis an die Stiele verſehen; obenher bräunlich, oder erdfarb, geſtreift, glatt und gegen die Mitte vertieft. Man findet ihn mit platten Stielen und halbrunden Hüten, wie die 128. und 129. Kupfertafel des 2ten Theils vorſtellet; und mit rundlichen Stielen und rundlichen in der Mitte vertieften Hüten, ſo auf der 111. Kupfertafel des 2ten Theils und der 265. und 266ſten des 3ten Theiles befindlich.

Zu Anfang des Herbſtes findet man dieſen Schwamm auf alten Eichbäumen.

CLXX.

BOLETVS CRASSIPES. Der dickſtielige Kühbilz.

Tom. II. Tab. CXII.

Boletus cauleſcens, ſubſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, aurantio, tuberculis fuluis adſperſo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis anguloſis, ampliuſculis, ſecedentibus, luteo vireſcentibus; petiolo tereti, ventricoſo, luteolo.

Boletus bouinus. Scop. l. cit. var. e?
Boletus pileo hemiſphaerico, tubulis angulatis, petiolo ventricoſo. Gled. fung. p. 63.
Polyporus carne ſecedente, petiolatus, fuluus, inferne vireſcens. Hall. hiſt. n. 2502.
Suillus eſculentus, craſſus, ſuperne fuluus, inferne initio albidus, deinde ex flauo ſubuireſcens, pediculo ventricoſo, & ſupernae pileoli parti concolore. Mich. nou. gen. pl. p. 127. n. 8.
Fungus poroſus, magnus, noſtras. Rai. hiſt. 100.
Fungus ſuillus eſculentus. Caeſalp. hiſt. p. 617.
In ſyluis montoſis Iulio & Auguſto menſibus reperiundus.

Der Hut iſt goldgelb mit dunklern Flecken oder Warzen beſetzt; die Röhren ſind anfangs weißlich, hernach grünlichgelb, mit eckigen Löchern; der Stiel von der Farbe

be der Röhrgen, ungleich dick; das Fleiſch iſt weiß, hernach gelb, und löſet ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wird in bergigen Wäldern im Julius und Auguſt gefunden.

CLXXI.

BOLETVS FLABELLIFORMIS. Der wedelförmige Bilz.

Tom. II. Tab. CXIII.

Boletus caulescens, ſolitarius, carnoſus; pileo coriaceo, multiformi, centro depreſſo, ochroleuco, margine lacero, lobato, plicato, reuoluto, caeruleſcente; tubulis angulatis, pallidis, ſeu albidis; petiolo tereti, craſſo, irregulari, concolore, pariter poroſo, baſi ochroleuco.

In ſyluis autumno incipiente reperitur.

Der Hut iſt in der Mitte vertieft, bräunlich, am Rande zerſpalten, gefalten, umgebogen, blaulich, übrigens iſt der Hut von keiner beſtändigen Figur; der untere Theil ſamt dem gleichfalls unregelmäßigen Stiele iſt weißlich und gelöchert. Das Fleiſch iſt weiß und von den Röhrgen abzuſondern.

Wird im Anfang des Herbſtes in den Wäldern gefunden.

CLXXII.

BOLETVS LVTEVS. Das doppelte Schaafeiterl.

Tom. II. Tab. CXIV.

Boletus caulescens, ſubſolitarius, carnoſus; pileo badio, piloſe ſtriato, primum faſtigiato, demum planiuſculo, viſcido; tubulis ſature flauis, ſecedentibus, rotundis; petiolo tereti, ſordide albo, apice dilatato, baſi tuberoſo; velo & annulo membranaceis, albidis, perſiſtentibus.

Boletus luteus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 465. n. 1587. Dill. cat. gieſſ. p. 188. t. 10. n. 1. Berg. viadr. p. 367.

Boletus pileo plano, carnoſo, glabro; tubulis difformibus; ſtipite annulato, longo. Scop. fl. carniol. I. p. 44. n. 3.

Boletus (*luteus*) ſtipitatus; pileo puluinato, ſubuiſcido; poris rotundatis, conuexis, flauiſſimis; ſtipite albido. Linn. ſpec. pl. I. p. 1177. II. p. 1646. fl. ſuec. II. n. 1247. ſyſt. nat. XII. p. 724. n. 10.

Boletus caulescens, pileo liuido ſubuiſcido, poris flauis conuexis, ſtipite albido. Linn. fl. ſuec. I. n. 1088.

Polyporus carne ſecedente, petiolatus, annulatus. Hall. hiſt. n. 2301.

Fungus poroſus autumnalis viſcidus. Buxb. cent. V. t. 14.

In ſyluis autumno creſcit.

Der Hut iſt oberwärts dunkelgelb, caffeebraun, oder auch erdfarb, glatt, etwas haarig, öfters etwas ſchleimig, unten her allezeit hochgelb, ohne Beymiſchung einer andern

 Farbe

Farbe, mit ungleichen Löchern, da die Röhrgen etwas hervorſtechen; der Stiel iſt rund, lang, ſchmutzig weiß, auch erdfarb, oben gegen den Hut dicker, unten auch knollig, mit einer häutigen Saamendecke und bleibenden Ring verſehen. Das Fleiſch iſt weiß, wird blaulich, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Er wächſt im Herbſte in den Wäldern.

CLXXIII.

BOLETVS AVREVS. Der goldgelbe Kühbilz.

Tom. II. Tab. CXV.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, pallide aurantio, punctato, ſtriato, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis anguloſis, cinnameis, ſecedentibus; petiolo tereti, flauido, baſi craſſiuſculo.

Boletus bouinus. Scop. & Linn.
Polyporus carne ſecedente, petiolatus, leoninus, inferne cinnameus. Hall. hiſt. n. 2304.
Fungus poroſus, petiolo ouali, pileoli ſuperficie ſplendide crocea. Vaill. pariſ. p. 60.
Auguſto menſe in ſyluis gignitur.

Der Hut iſt oberwärts abgeſchoſſen und bleich pomeranzen oder goldgelb, etwas gedippelt und geſtrichelt; untenher zimmetfarb, mit kleinen eckigen Löchern; der Stiel iſt dick, gelblich; das Fleiſch iſt weiß und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wächſt in den Wäldern im Auguſtmonate.

CLXXIV.

BOLETVS HEPATICVS. Der Leberbilz, Blutſchwamm, rothe Hirſchzunge.

Tom. II. Tab. CXVI. CXVII. CXVIII. CXIX. & CXX.

Boletus ſubacaulis, ſubſolitarius, carnoſus; molliuſculus, ſucco ſanguineo ſcatens; pileo vtrimque conuexo, punctato, lobato, valde mutabili, ſuperne ſaturate rubro; tubulis maiuſculis, apice tumidis, ſecedentibus, roſeis aut pallidis; petiolo rubro, mutabili, punctato, vel nullo.

Boletus corpore ſeſſili, latiſſimo, ſuperius lobato, inferius gibboſo. Gled. fung. p. 77.
Polyporus ſeſſilis, ſanguineus, craſſus, mollis, obſcure lobatus. Hall. hiſt. n. 2315.
Agaricum eſculentum, caſtaneae adnaſcens, latiſſimum, hepatis facie, ſuperne ex rubro ferrugineum, interne ſanguineum, ſubtus ochroleucum. Mich. nou. gen. pl. p. 117. tab. 60.
Agaricus poroſus, rubens, carnoſus, hepatis facie. Dill. cat. gieſſ. p. 192.
Fungus arboreus, rubens, carnoſus, hepatis facie. Rai. ſynopſ. II. app. 340. III. 23. n. 12.
Fungus iecorarius, praetextatus, ſanguineus, criſtatus. Bocc. muſ. P. I. pag. 305.
Fungus non veſcus IX. Loeſel. pruſſ. pag. 90.
Fungus latus, ſanguinei coloris. C. Bauh. pin. p. 371.

Linguae

Linguae in caudicibus caſtanearum. Caeſalp. hiſt. 619.
Ad radices arborum, durioris ligni praeſertim, vt Quercus, Fagi, Caſtaneae &c. etiam in cauis arboribus, quandoque etiam ad ſalicum truncos reperitur vere & potiſſimum autumno.

Der ganze Schwamm iſt fleiſchig, weich, innwendig voll rothen Saftes; der Hut oben und unten gewölbt und gedippelt, ſehr veränderlich, oberwärts dunkelroth, unten blaßroth oder bleichgelb, mit weiten, am Ende mit einem dicken Ringe verſehenen Röhrgen; der Stiel iſt veränderlich, gedippelt, roth, oder fehlt gar.

Dieſer Schwamm wird im Frühjahre und hauptſächlich im Herbſte an den Wurzeln der Bäume, die hartes Holz haben, als Eichen, Buchen, Caſtanien u. d. g., auch in hohlen Bäumen, zuweilen auch an Weidenſtämmen angetroffen.

CLXXV.

BOLETVS OVINVS. Das weiße Schaafeiterl.

Tom. II. Tab. CXXI. CXXII.

Boletus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, villoſo, pallido ſeu ceruino-albido, demum planiuſculo, rimoſo; tubulis breuiſſimis, minimis, hexagonis, flauo-albidis; petiolo tereti, craſſo, albido; baſi ſaepius tuberoſo.

Polypus carne ſecedente, petiolatus, pileo villoſo, ceruino, poris albidis. Hall. hiſt. n. 2311.
Suillus eſculentus, craſſus, totus pallidus. Mich. nou. gen. pl. p. 127.
Suillus eſculentus, craſſus, albus, ſubtus pallidus, pediculo ventricoſo, pariter albo. Ibid. &
Suillus paruus, craſſus, pediculo, & ſuperna parte pilei fuluis, ſericea, perbreuique lanugine infectis, inferne vero ochroleucis. Ibid. p. 128. tab. 68. fig. 2.
Fungus poroſus, tenuis, coriaceus. Buxb. cent. V. tab. 15. f. 1.
In ſyluis abiegnis & pinetis verno & autumnali tempore occurrit.

Der Hut iſt oben bräunlich weiß, etwas haarig, öfters von der Sonnenhitze zerriſſen und ſchuppig, untenher gelblich weiß, mit kleinen ſechseckigen Löchern, und ganz kurzen Röhrgen; der Stiel iſt dick, weißlich, unten dicker; das Fleiſch iſt weiß, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Man trift ihn im Frühjahre und Herbſte in Tannen- und Fichtenwäldern an.

CLXXVI.

BOLETVS FLAVORVFVS. Der gelbrothe Kühbilz.

Tom. II. Tab. CXXIII.

Boletus cauleſcens, ſubſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, flauo-rufo; primum globoſo, attracto, demum planiuſculo, centro faſtigiato; tubulis angulatis, ſecedentibus, citrinis; petiolo tereti, craſſo, pallide citrino, baſi craſſiuſculo.

Boletus bouinus. Scop. & Linn. l. cit.
Suillus eſculentus, craſſus, ſuperne ſordide rubens, inferne dilute luteus. Mich. nou. gen. plant. pag. 127?
In ſyluis autumno gignitur cum ceteris bouinis.

Der Hut iſt oben gelbroth, mehr als pomeranzenfarb, untenher zitronengelb, mit eckigen Löchern; der Stiel iſt blaß zitronengelb, unten etwas dicker; das Fleiſch iſt weiß, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wird mit den übrigen Kühbilzen im Herbſte in den Wäldern gefunden.

CLXXVII.

BOLETVS ALBIDVS. Der weiſſe Baumbilz.

Tom. II. Tab. CXXIV.

Boletus ſubacaulis, ſubſolitarius, lignoſus; pileo utrimque conuexo, multiformi, albido; tubulis difformibus, angulatis, non ſecedentibus, albidis; petiolo multiformi, albido, vel nullo.

Boletus flabelliformis. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 467. n. 1590. var. 2.
Ad arbores vetuſtas & ligna putrida reperitur.

Der ganze Schwamm iſt weißlich, oben und unten erhaben, unten mit eckigen Löchern verſchiedener Figur und Größe, meiſtentheils ohne, oder mit einem ſehr unregelmäßigen Stiele; die Röhrgen ſind mit der weißen holzigen Subſtanz verwachſen.

Wird an alten Bäumen und faulem Holze angetroffen.

CLXXVIII.

BOLETVS CORIACEVS. Der lederartige Bilz.

Tom. II. Tab. CXXV.

Boletus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus; pileo planiuſculo, centro depreſſo, vel infundibuliformi, piloſe ſtriato, rufo, fuſceſcente, circulis concentricis, alternis pallidioribus & ſaturatioribus; tubulis multiformibus, rotundis & angulatis, non ſecedentibus, ochraceis vel ochroleucis; petiolo tereti, rufo fuſco, baſi craſſiuſculo.

Boletus coriaceus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 465. n. 1588 var. 1.
Boletus pileo plano, cinnamomeo, faſciato, vmbilicato, coriaceo, villoſo; tubulis connexis, tenuibus, albis; ſtipite breui. Scop. fl. carniol. I. p. 44. (b).
Boletus tubulis connexis; pileolo orbiculari & plano, ſuperne lineis concentricis diſtincto, centro excauato; petiolo breui & tenui. Gled. fung. p. 67. n. 11.
Boletus coriaceus, ceſpitoſus; tubulis tenuiſſimis, connexis; pileolo plano, crenato, & lineis concentricis variegato, centro ſubfuſco; petiolo breui. Ibid. p. 68. var. a.
Polyporus petiolatus, infundibuli forma, ceſpitoſus, intus nigricans, extus albus. Hall. hiſt. n. 2298.

Polypo-

Polyporus exiguus, coriaceus, fuluus, pileolo concauo, ac in medio nonnihil vmbilicato. Mich. nou. gen. pl. p. 130. t. 70. f. 9. &

Polyporus lignoſus & ceſpitoſus, infundibulum imitans, ſuperne nigricans, inferne cum pediculo albus, areolis carbonariis innaſcens. Ibidem. p. 131. tab. 70. fig. 6.

In ſyluis, areolis carbonariis & ad ligna putrida reperitur ab Julio menſe vsque in autumnum.

Der Hut iſt oben rothbräunlich, auch dunkel rothbraun, mit hellern und dunklern Kreiſen, haarig geſtrichelt, in der Mitte vertieft, auch gar trichterförmig, am Rande wellenförmig ausgeſchweift, untenher mit runden und eckigen Löchern, weißlich, bräunlich, auch ockerbraun; der Stiel rothbraun, faſt wie Spaniolſchnupftoback, unten dicker; die Röhrgen ſondern ſich vom Fleiſche nicht ab.

Man findet ihn vom Julius an bis in den Herbſt in Wäldern, auf Kohlenbrennerplätzen und faulem Holze.

CLXXIX.

BOLETVS FERRVGINEVS. Der roſtfärbige Kühbilz.

Tom. II. Tab. CXXVI.

Boletus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, ferrugineo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, ſecedentibus, luteis; petiolo tereti, pilei ſupernae parti fere concolore, baſſi craſſiuſculo.

Boletus bouinus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 463. n. 1586. var. q.

In ſyluis montoſis cum ceteris boletis bouinis ſub finem æſtatis pullulat.

Der Hut iſt oberwärts roſtfärbig; unten gelb, mit kleinen, eckigen Löchern; der Stiel iſt ebenfalls roſtfärbig, nur etwas lichter, unten verdickt; das Fleiſch iſt weiß, wird hernach gelblich, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wächſt in bergigen Wäldern zu Ausgang des Sommers.

CLXXX.

BOLETI RAMOSISSIMI, varietas criſtata, pileis ſquamoſis, lobatis, petiolis partialibus lateralibus, planiuſculis.

Der Eichhaaſe, die Abänderung mit den ſchuppenartigen lappigen Hüten und flachen Stielen.

Tom. II. Tab. CXXVII. CXXVIII. & CXXIX.

Synonyma & reliqua vid. No. IX. Tab. CXI.

Man ſehe No. IX. die CXI. Kupfertafel.

CLXXXI.

BOLETUS APPENDICULATUS. Der dickſtielige Kühbilz, mit dem unten zugeſpitzten, bewurzelten Stiele.

Tom. II. Tab. CXXX.

Boletus caulescens, ſubſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, lateritio, ſubtiliſſime punctato, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, ſecedentibus, citrinis; petiolo tereti, ſuperne citrino, reticulato, medio ventricoſo, pallide rubente, baſi attenuato, radicato, fuſco.

Cum reliquis ſub finem aeſtatis reperitur.

Der Hut iſt ziegelfarb, unten zitronengelb, mit kleinen, eckigen Löchern; der Stiel oben zitronengelb, in der Mitte bleichroth und bauchig, am Ende braun, zugeſpitzt und bewurzelt.

Wird mit den übrigen Kühbilzen zu Ende des Sommers gefunden.

CLXXXII.

BOLETUS CAUDICINUS. Der buſchige Baumbilz.

Tom. II. Tab. CXXXI. & CXXXII.

Boletus acaulis, ceſpitoſus, carnoſus, coriaceus; pileis irregularibus, ſquamoſis, imbricatis, lobatis, glabris, ſtriatis, rufeſcentibus; tubulis difformibus, non ſecedentibus, flauis.

Boletus caudicinus. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 469. n. 1596. var. 2?
Agaricus ſpecioſus. Batarr. fung. arim. p. 68. tab. XXXIV. B?
Fungus ceraſorum imbricatim alter alteri innatus variegatus. C. Bauh. pin. pag. 372?
In caudicibus arborum prouenit.

Der ausgewachſene Schwamm beſtehet aus lauter übereinander liegenden, lederartigen, dicken, lappigen Schuppen, die die Stelle der Hüte vertretten. Obenher ſind ſie röthlich, glatt, geſtrichelt; untenher gelb, mit kleinen Löchern verſchiedener Figur. Die Röhrgen ſind in dem weißlichen Fleiſche verwachſen.

Er befindet ſich an den Stämmen der Bäume.

CLXXXIII.

BOLETUS CUPREUS. Der kupferfärbige Kühbilz.

Tom. II. Tab. CXXXIII.

Boletus caulescens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, fuſcopurpureo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, ſecedentibus, lacteſcentibus, citrinis; petiolo tereti, baſi craſſiuſculo, flauo, cum purpura maculato, reticulato, punctato.

Boletus

Boletus bouinus. Scop. fl. carn. II. P. II. pag. 463. n. 1586. var. a.
Polyporus carne ſecedente, purpureus, inferne flauus. Hall. hiſt. n. 2305.
Suillus eſculentus, craſſus, ſuperne ſordide rubens, inferne dilute luteus. Mich. nou. gen. plant. pag. 127.
Panis bufonis magnus. Sterb. theatr. fung. p. 136. n. 27.
In ſyluis cum ceteris bouinis autumno creſcit.

Der Hut iſt abgeſchoſſen dunkel purpurfärbig, oder kupferfärbig, unten zitronengelb, mit kleinen eckigen Löchern; der Stiel iſt gelb, und purpurfärbig gefleckt, geädert und gedippelt, unten etwas dicker; das Fleiſch iſt weißgelblich, und ſondert ſich leicht von den Röhrgen.

Wächſt mit den übrigen Kühbilzen im Herbſte in den Wäldern.

CLXXXIV.

BOLETVS BVLBOSVS. Der Steinbilz.

Tom. II. Tab. CXXXIV.

Boletus cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo conuexo, ſpadiceo vel ochraceo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo, ſaepe rimoſo; tubulis angulatis, ſecedentibus, luteis, vel ochroleucis; petiolo tuberoſo, craſſiſſimo, ſordide albo, vel terreo, baſi radicato.

Boletus bouinus. Scop. & Linn.
Boletus magnus auguſti menſis. Dill. cat. gieſſ. p. 188. Berg. viadr. p. 367.
Polyporus carne ſecedente, petiolatus, pileo ſpadiceo, inferne pallido. Hall. hiſt. n. 2308.
Suillus eſculentus, craſſus, ſuperne ex rubro ferugineus, inferne dilute luteus. Mich. nou. gen. plant. p. 126.
Fungus poroſus maximus. Rupp. fl. jen. p. 302.
Fungus poroſus magnus, craſſus. S. Bauh. hiſt. III. p. 833.
Fungus auguſti menſis. C. Bauh. pin. p. 371. var. 3.
Fungi eſculenti XVI. genus. Cluſ. hiſt. p. CCLXXXII.
In ſyluis & paſcuis montoſis ac ericetis Auguſto & Septembri reperitur.

Nota: Omnes Boletos bouinos valde appetunt tam ferae, quam armenta, attamen nimius eorundem uſus grauiſſimas tam bobus & vaccis, quam ouibus noxas infert, praeſertim pluuio tempore & ſi boletorum ſubſtantia iam corrupta aut verminoſa fuerit. Speciatim mictus cruentus, inflammationes viſcerum, intumeſcentia abdominis, diarrhoea torminoſa, hepatis ſcirrhi, tabes, tuſſis, hydrops. Larvae muſcarum & ſcarabaeorum pilulariorum numeroſa grex hoſce boletos corrumpi incipientes inhabitant & conſumunt.

Der Hut iſt oben braun, öfters von der Sonnenhitze gegittert zerriſſen, unten blaß zitron- oder ockergelb; der Stiel iſt beſonders dick, ſchmutzig weiß, oder erdfarb; das Fleiſch iſt weiß und ſondert ſich leicht von den Röhrgen ab.

Wird im Auguſt und September in bergigen Wäldern und Viehtriften und auf Heiden gefunden.

CLXXXV.

CLXXXV.

BOLETVS VERSICOLOR. Der bunte Holzbilz.

Tom. II. Tab. CXXXVI.

Boletus acaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo conuexo, ouato vel hemiſphaerico, aureo, piloſe punctato, circulis concentricis rufo-fuſcis notato; tubulis angulatis, pallidis, vel ochroleucis, non ſecedentibus.

Boletus verſicolor. Scop. flor. carniol. II. P. II. p. 468. n. 1592.
Boletus acaulis; pileo coriaceo, villoſo, lineis concentricis, dicoloribus, faſciato; tubulis albis, tenuiſſimis. Scop. fl. carn. I. p. 46. n. 6.
Boletus coriaceus, ſquamoſus, ſeſſilis & multiplex, lobis varie diuiſis & expanſis, tubulis tenuiſſimis, connexis. Gled. fung. p. 70.
Boletus (*verſicolor*) acaulis; faſciis dicoloribus; poris albis. Linn. fl. ſuec. I. n. 1094. II. n. 1254. ſpec. plant. I. p. 1176. II. p. 1645. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 4.
Polyporus ſeſſilis, ceſpitoſus, planus, hirſutus; annulis verſicoloribus. Hall. hiſt. n. 2282.
Agaricus ſquamis iridiformibus. Batarr. fung. arim. p. 69. tab. XXXV. A.
Agaricus varii coloris, ſquamoſus. Tourn. inſt. p. 562.
Fungi ceraſorum, coloris varii, pernicioſi. I. Bauh. hiſt. III. p. 842.
In truncis arborum ſiccis reperiundus.

Der Hut iſt oberwärts erhaben, etwas haarig, eyrund oder halbrund, goldgelb, mit rothbraunen Kreiſen, unten weißlich, bleich oder blaßbraun, mit eckigen Löchern. Die Röhrigen ſondern ſich vom Fleiſch nicht ab.

Man findet ihn auf dürren Baumſtöcken.

CLXXXVI.

BOLETVS VNGVLATVS. Der Pferdhufbilz, Feuerſchwamm, Zunderſchwamm.

Tom. II. Tab. CXXXVII. & CXXXVIII.

Boletus ſubacaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo conuexo, imbricato, tuberculato, ſubrotundo, colore vario; tubulis tenuiſſimis, albidis; petiolo horizontali, breuiſſimo, aut nullo.

Boletus igniarius. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 469. n. 1594.
Boletus ſubrotundus, petiolo horizontali breuiſſimo, tubulis ſubtiliſſimis. Gled. fung. p. 78. n. XII.
Boletus (*igniarius*) acaulis, puluinatus, laeuis; poris tenuiſſimis, Linn. fl. lapp. 382. fl. ſuec. I. n. 1096. II. n. 1256. ſpec. pl. I. p. 1176. II. p. 1645. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 3.
α) Tab. CXXXVII.
Polyporus conuexo planus, duriſſimus, cinereus, inferne albidus. Hall. hiſt. n. 2288.
Agaricus pedis equini facie. Tourn. inſt. p. 562.

Agari-

Agaricum igniarium, Agarici officinalis facie, ſed non amarum, ſuperne ex albo cinereum & glabrum, inferne primum eiusdem coloris, deinde argutiſſime & denſiſſime perforatum, foraminulis rotundis. Mich. nou. gen. plant. pag. 117.
Bouiſta igniaria. Dill. cat. gieſſ. p. 197.
Fungus durus igniarius. Parkinſ. theatr. 1323.
Fungus in caudicibus naſcens, vnguis equini figura. C. Bauh. pin. p. 372.
Fungi arborei ad ellychnia. I. Bauh. hiſt. III. p. 840.
β) Tab. CXXXVIII. Varietas ferruginea & ſubrufa.
Polyporus ſeſſilis, conuexo-planus, inferne albidus, ſuperne fuluis diſcoloribus zonis. Hall. hiſt. n. 2289.
Agaricum quercubus & ilicibus adnaſcens, ferrugineum & glabrum, inferne album, & argutiſſime & denſiſſime perforatum, foraminulis rotundis. Mich. nou. gen. pl. pag. 118. n. 2. vt & ſequentes duo n. 3. & 4.
Agaricus fauaginoſus vuidus. Batarr. fung. arim. pag. 67. tab. 33. D. E. F. G.
Agaricus pedis equini facie. Batarr. fung. arim. pag. 71. tab. 37. E.
In ſiccis arborum caudicibus prouenit; ad fomitem, atque in vulneribus ad ſupprimendas haemorrhagias diuerſimode praeparatus adhibetur.

Der Hut iſt oberwärts erhaben, rundlich, mit kleinern Erhabenheiten öfters beſetzt, ſehr oft von der Figur eines Pferdehufes, von Farbe entweder grau, auch etwas grünlich, oder roſtfarb und braunroth, unterwärts faſt platt, weißlich oder lichtbraun, mit rundlichen Löchern. Der Stiel iſt entweder kurz, und ungeſtalt, oder mangelt gar. Das Fleiſch iſt holzig, mit den Röhrgen derwachſen.

Man findet ihn auf alten Baumſtöcken, und braucht ihn verſchiedentlich zugerichtet zum Zunder und bey Wunden zum Blutſtillen.

CLXXXVII.

BOLETUS FULVUS. Der goldgelbe Pferdehufbilz oder Feuerſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXII.

Boletus acaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo ſuperne conuexo, tuberculato, glabro, verſicolore, fuluo & purpuraſcente, inferne plano, ochroleuco, ſeu pallido; tubulis non ſecedentibus, rotundiuſculis, pallidis ſeu ochroleucis.

Etiam hic ad ſiccas arbores eſt, & forſan ſub praecedente ſpecie tanquam varietas, comprehenditur.

Die obere Fläche dieſes Schwammes iſt erhaben, rundlich, mit kleinen Knötgen beſetzt, pferdehufförmig, mit goldgelben und blaßpurpurfärbigen Kreiſen; die untere Fläche platt, blaßbräunlich oder blaßgelblich, mit rundlichen Löchern.

Iſt ebenfalls an alten Baumſtöcken und vielleicht eine Abänderung des vorhergehenden.

CLXXXVIII.

BOLETVS VARIEGATVS. Der ſchattirte Baumbilz.

Tom. III. Tab. CCLXIII.

Boletus ſubacaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo ſemielliptico, conuexo, punctato, margine repando, lobato, vel etiam plicato, diuerſicolore, faſciis concentricis, pallidis, citrinis, aureis, rufis, fuſcis; tubulis ſordide albis, ſeu leucophaeis, paruis, difformibus, non ſecedentibus; petiolo difformi, breui, craſſo, fuſco aut nullo.

Varietas Boleti verſicoloris Tab. CXXXVI. forte, glabra, coloribus aliis & pluribus. Ad arbores vetuſtas reperiundus.

Vielleicht eine glatte Abänderung des bunten Holzbilzes auf der 136ſten Kupfertafel, mit andern und mehreren Farben.

Wird auf alten Bäumen gefunden.

CLXXXIX.

BOLETVS DEFORMIS. Der große ungeſtalte Holzbilz.

Tom. III. Tab. CCLXIV.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, lignoſus; pileo conuexo, craſſo, deformi, cum pauca flauedine & purpura albido; tubulis angulatis, breuibus, non ſecedentibus, albis; petiolo craſſo, deformi, pileo concolore.

In ſyluis ad radices & truncos arborum reperitur.

Der Hut iſt erhaben, dick, ungeſtalt, weißlich, mit etwas gelblichem und roſenfarbigem vermiſcht; von eben dieſer Beſchaffenheit und Farbe iſt auch der Stiel; die Röhrgen ſind kurz, eckig, weiß, mit dem gleichfalls weißen, holzigen Fleiſche verwachſen.

Man findet ihn an den Wurzeln und Stöcken der Bäume in den Wäldeen.

CXC.

BOLETI RAMOSISSIMI varietas, pileolis rotundiuſculis, vmbilicatis & petiolis partialibus teretibus, poroſis.

Der Eichhaaſe, die Abänderung mit den rundlichen, nabeligen Hütgen und runden, löcherigen Stielen.

Tom. III. Tab. CCLXV. & CCLXVI.

Synonyma & reliqua huc ſpectantia videantur ad Tab. CXI

Man ſehe das hieher gehörige bey der 111ten Kupfertafel.

CXCI.

BOLETVS MESENTERICVS. **Der gekröſeförmige Holzbilz.**

Tom. III. Tab. CCLXVII.

Boletus caulescens, plerumque ceſpitoſus, coriaceus; pileo planiuſculo, tuberculato, ſtriato, ochraceo; margine criſpo, vndulato, plicato, lobato, ochroleuco; tubulis non ſecedentibus, breuibus, anguſtis, difformibus, albidis; petiolo inuerſe conico, breui, craſſo, poroſo, albido.

Accedit ad Agaricum ſpecioſum. Batarr. fung. arim. pag. 68. tab. XXXIV. B. ſed colores & magnitudo differunt.

Ad radices & truncos arborum reperitur.

Der Hut dieſes Schwammes iſt wie ein Gekröſe geſtaltet, am Rande krauß, wellenförmig, gefalten und eingeſchnitten, ſonſten flach, mit kleinen Hügeln, in der Mitte dunkel, am Rande licht ockerfarb, und geſtrichelt. Die Röhrgen unter dem Hut, und der Stiel ſind weißlich. Die Röhrgen ſondern ſich von dem Fleiſche nicht ab. Der Stiel iſt umgekehrt kegelförmig und ebenfalls voll Löcher.

Wächſt an den Wurzeln und Stöcken der Bäume.

CXCII.

BOLETVS ATROFVSCVS. **Der ſchwarzbraune geringelte Baumbilz.**

Tom. III. Tab. CCLXVIII.

Boletus acaulis, ſolitarius & ceſpitoſus, coriaceus; pileo planiuſculo, ſtriato, verſicolore, annulis concentricis, alternis nigricantibus, fuſcis, extimis cinereis & ochroleucis, margine repando, albido; tubulis non ſecedentibus, anguſtis, breuiſſimis, difformibus, albis.

Ad Boletum verſicolorem tab. CXXXVI. accedit, etiam ab autoribus ad eum relatus, coloribus, tenuitate corii & tubulorum eximia breuitate ab eodem & ſequente multicolore differt.

Gignitur pariter ad arborum truncos.

Die Schuppen oder Hüte ſind platt, geſtrichelt, mit dunkelbraunen und ſchwärzlichen, wechſelsweiſen Ringen, am Rande etwas wellenförmig ausgeſchweift, mit grauen, lichtbraunen, und zu äuſſerſt weißlichen Ringen. Die Röhrgen ſind ſehr kurz, und eng, ſondern ſich von der übrigen Subſtanz nicht ab.

Man findet ihn ebenfalls an den Stämmen der Bäume.

CXCIII.

BOLETVS MVLTICOLOR. **Der vielfärbige Baumbilz.**

Tom. III. Tab. CCLXIX.

Boletus acaulis, ſolitarius, coriaceus; pileo conuexo, planiuſculo, ſtriato, multicolore, annulis concentricis, alternis, rufis, fuſcis, ochroleucis, flauidis, ſubuiridibus; tubulis tenuiſſimis, non ſecedentibus, albis.

Boletus verſicolor. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 468. n. 1592. & Linn. ſpec. pl. II. p. 1645. ſyſt. nat. XII. p. 723. n. 4. aliique hunc cum aliis coniungunt.
Ad caudices arborum naſcitur.

Der Hut iſt flach erhaben, geſtrichelt, mit vielerley farbigen Ringen, rothbraun, dunkelbraun, lichtbraun, gelblich, grünlich. Die Röhrgen ſind weiß und ſondern ſich nicht ab.

Wächſt ebenmäßig an den Stämmen der Bäume.

CXCIV.

BOLETUS SEMIOVATUS. Der halbrunde Zunderbilz.

Tom. III. Tab. CCLXX.

Boletus acaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo ſemielliptico, conuexo, planiuſculo, ſature ſanguineo & fuſco, margine repando, flauido; tubulis anguſtis, angulatus, non ſecedentibus, flauidis.

Varietas forte Boleti vngulati Tab. CXXXVIII.
Ad ſiccos arborum truncos pariter naſcitur.

Der Hut iſt flach erhaben, mit kleinen Hügeln beſetzt, ſchwarz und dunkel purpurroth, mit einem blaßgelben Rande; die Röhrgen ſind klein, eckig, gelblich, und löſen ſich von der übrigen Subſtanz nicht ab.

Wird ebenfalls an trockenen Baumſtöcken angetroffen.

CXCV.

BOLETUS ALBUS. Der weißliche haarige Baumbilz.

Tom. IV. Tab. CCCXIV.

Boletus acaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo ſubgloboſo, hirſuto, albido; tubulis angulatis, difformibus, non ſecedentibus, albidis.

Polyporus ſeſſilis, conuexo-planus, albiſſimus, ſuperne hirſutus, poris latioribus. Hall. hiſt. n. 2280?
Agaricus villoſus & poroſus candidus. Dill. cat. gieſſ. pag. 193?
Ad arbores emortuas & ligna putrida.

Der ganze Schwamm iſt weißlich, oberwärts haarig. Die Röhrgen ſind eckig, feſt mit dem holzigen Theile verbunden.

Wächſt an abgeſtorbenen Bäumen und auf faulem Holze.

CXCVI.

BOLETUS TERREUS. Der erdfarbe Kühbilz.

Tom. IV. Tab. CCCXV.

Boletus cauleſcens, ſolitarius, carnoſus; pileo conuexo, terreo, primum globoſo, attracto, demum planiuſculo; tubulis angulatis, ſecedentibus,

bus, luteo - vireſcentibus; petiolo tereti, purpureo, venoſe reticulato, baſi craſſiuſculo.

Boletus bouinus. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 463. n. 1586. var. s?
Accedit ad Boletum oliuaceum, n. CLXIV. tab. XV.
Cum reliquis bouinis auctorum gignitur autumno in ſyluis montoſis.

Der Hut iſt erdfarb, unten abgeſchoſſen gelblich grün, mit eckigen kleinen Löchern; der Stiel iſt purpurfarb, geädert, unten dicker. Das weißliche Fleiſch ſondert ſich leicht von den Röhrgen.

Kommt mit den übrigen Kühbilzen im Herbſte in bergigen Wäldern hervor.

CXCVII.

BOLETVS CRISTATVS. Der goldgelbe buſchige Holzbilz.

Tom. IV. Tab. CCCXVI. & CCCXVII.

Boletus ſubacaulis, ſolitarius, lignoſus; pileo multiformi, laciniato, lobato, contorto, valde irregulari, aureo; tubulis difformibus, non ſecedentibus, pallidis ſeu ochroleucis; petiolo deformi, craſſo, poroſo, ſubfuſco vel nullo.

Affinis Boleto caudicino tab. CXXXI. & CXXXII. pariterque ad truncos arborum repe-riundus.

Der Hut dieſes Schwammes iſt von verſchiedener Geſtalt, zerriſſen, zerſpalten, in einander gewunden, ſehr unregelmäßig, von Farbe oben goldgelb, unten ſchmutzig weiß, oder blaßbräunlich, mit verſchiedenen Löchern. Der Stiel iſt ebenfalls verunſtaltet, gelöchert, dick, bräunlich, oder mangelt gar. Das holzige Fleiſch ſondert ſich nicht von den Röhrgen.

Wächſt an den Stämmen der Bäume und iſt dem buſchigen Baumbilze n. 182. auf der 131ſten und 132ſten Kupfertafel verwandt.

H Y D N A.

CXCVIII.

HYDNVM CYATHIFORME. Der becherförmige Stachelſchwamm.

cyathiforme Sch

Tom. II. Tab. CXXXIX.

Hydnum caulescens, ſolitarium & ceſpitoſum, coriaceum; pileo infundibuliformi, ſtriato, piloſo, fuſco, circulis concentricis, alternis, pallidioribus & ſaturatioribus, margine repando, crenato, albido; aculeis non ſecedentibus, albidis; petiolo inuerſe conico, fuſco, baſi radicato.

Echinus infundibuliformis, rufus, intus annulatus. Hall. hiſt. n. 2320.
Boletus coriaceus, pileo campanulato, inuerſo, deſuper ſericeo & fuluo ferrugineo, lineis concentricis diſtincto; tubulis ſubtus connexis, echinato-denticulatis. Gled. fung. p. 69. n. II. var. d.
Erinaceus infundibulum imitans, coriaceus, colore ex fuluo ferrugineo, pileolo deſuper veluti ſericeo & pluribus ſtriis circularibus excauato. Mich. nou. gen. plant. pag. 132. tab. 72. fig. 4. Rupp. hall. p. 363. &
Erinaceus ceſpitoſus, coriaceus, ferrugineus, ſuperne circularibus ſtriis excauatus & ſericeus, pediculo tenuiori. Ibid. n. 6.
Fungus campanulatus lignoſus. Sterb. theatr. fung. pag. 258. tab. 27. lit. I.
In ſyluis montoſis autumno inueniendus ad truncos arborum.

Der Hut iſt trichterförmig, haarig geſtrichelt, braun, mit hellern und lichtern Kreiſen, und einem wellenförmig gekerbten weißlichen Rande, öfters mit andern zuſammengewachſen. Die Stacheln ſind weißlich, und ſondern ſich nicht ab. Der Stiel iſt umgekehrt kegelförmig, braun, unten bewurzelt.

Man findet ihn in bergigen Wäldern im Herbſte an den alten Baumſtöcken.

CXCIX.

HYDNUM IMBRICATUM. Die braune Hirſchzunge.

imbricatum L.

Tom. II. Tab. CXL.

Hydnum cauleſcens, ſolitarius & ceſpitoſus, carnoſus; pileo orbiculari, conuexo, ſaepe deformi, pallide fuſco, medio depreſſo, ſquamoſo; ſquamis eleuatis, acutis, ſubatris; aculeis ſecedentibus, ochroleucis; petiolo tereti, craſſiuſculo, pallide fuſco, baſi tuberoſo.

Hydnum (*imbricatum*) ſtipiatum, pileo conuexo imbricato. Linn. fl. lapp. 523. fl. ſuec. I. n. 1097. II. n. 1257. ſpec. plant. I. pag. 1178. II. pag. 1647. ſyſt. nat. XII. p. 724. n. 1.
Echinus petiolatus albicans, ſuperne ſquamoſus. Hall. hiſt. n. 2324. var. β.
Erinaceus eſculentus, pileolo ſuperne veluti ſquamoſo, & fuliginoſo, inferne cinereo, pediculo cum ſuperna pileoli parte eiuſdem coloris. Mich. nou. gen. pl. pag. 133. &
Erinaceus eſculentus, albus, craſſus. Ibid. pag. 132. tab. 72. fig. 2.
Fungus erinaceus maior, atrocinereus, ad petaſi fere amplitudinem accedens, prona parte ſquamatus. Hoffm. fl. altd.
Fungus echinatus maximus, vmbraculo ampliſſimo, obſcuro & nigricante. Rupp. jen. p. 301.
In ſyluis aceroſis autumno prouenit.

Der Hut iſt blaßbraun, öfters verunſtaltet, in der Mitte vertieft, mit erhabenen, zugeſpitzten, dunklern Schuppen beſetzt; die Stacheln ſind lichtbraun, und ſondern ſich von dem weiſſen Fleiſche leicht ab; der Stiel iſt von der Farbe des Hutes, walzenförmig, etwas dick, am Ende knollig.

Man trift ihn im Herbſte in Tannen und Fichtenwäldern an.

CC.

HYDNVM RVFESCENS. Der röthliche Stachelſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLI.

Hydnum caulefcens, ſolitarium & ceſpitoſum, carnoſum; pileo multiformi, conuexo, planiuſculo, ſubrepando, rufeſcente; aculeis breuibus, non ſecedentibus, rufo-griſeis; petiolo craſſiuſculo, rufo-albido, ſaepe deformi, baſi tuberoſo.

Hydnum repandum. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 471. n. 1599.
Hydnum (*repandum*) ſtipitatum, pileo conuexo, laeui, flexuoſo. Linn. fl. ſuec. I. n. 1098. II. n. 1258. ſpec. plant. I. p. 1178. II. p. 1647. ſyſt. nat. XII. p. 724. n. 2.
Echinus petiolatus, ſubrufus, petiolo leui. Hall. hiſt. n. 2325.
Boletus pileolo, integerrimo, tubulis connatis, echinato-denticulatis. Gled. fung. pag. 74.
Oed. fl. dan. tab. CCCX.
Autumno in pinetis aliisque ſyluis aceroſis praecipue gignitur.

Der Hut iſt öfters verunſtaltet, flach erhaben, röthlich, fleiſchfärbig, auch mennigroth; die Stacheln ſind röthlich grau, kurz, und ſondern ſich nicht von dem Fleiſche ab; der Stiel iſt öfters verunſtaltet, dick, unten knollig, blaß röthlich, oder fleiſchfarb.

Wächſt im Herbſte in Fichten und Tannenwäldern hauptſächlich.

CCI.

HYDNVM CORALLOIDES. Der corallenförmige oder äſtige Stachelſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLII.

Hydnum caulefcens, ramoſum, carnoſum, album; pileo nullo; petiolo tereti, craſſiuſculo, ſubhorizontali, ramoſo, albido: ramis ſubaſcendentibus, ramoſiſſimis: ramulis extimis deflexis, aculeatis; aculeis non ſecedentibus, incuruis, ſubulatis, paralellis & faſciculatis.

Hydnum coralloides. Scop. fl. carniol. II. p. II. pag. 472. n. 1602.
Echinus ramoſus; aculeis paralellis. Hall. hiſt. n. 2317.
Clavaria ramoſa; extremis ramulis teretibus, ſubulatis, recta deorſum deſcendentibus. Scop. fl. carniol. I. pag. 61. n. 5.
Agaricum eſculentum, album, ceſpitoſum, multifidum, & denticulatum, denticulis aſperis. Mich. nou. gen. plant. pag. 122. n. 2. tab. 64. fig. 2. a noſtro paulo diuerſum aculeis rectis, paralellis, per ſeries diſpoſitis.
Agaricus multifidus & villoſus. Tourn. inſt. 562.
Fungus muſcoſus albus, villis patentibus, raſtriformis. Bocc. muſ. I. p. 303.
Fungus abietinus niueus. Ibid. p. 304.

Cornu

Cornu cervi calcinatum. Sterb. theatr. fung. pag. 255. tab. 27. fig. G.
In ſyluis montoſis arboribus & lignis putridis innaſcitur.

Der ganze Schwamm iſt weiß und äſtig. Die äuſſerſten Aeſte ſind etwas abwärts gebogen und an ſolchen ſitzen die gekrümmten, zugeſpitzten Stacheln, theils reihen, theils büſchelweiſe. Sie löſen ſich von dem weiſſen Fleiſche nicht ab.

Wächſt in bergigen Wäldern, an den Bäumen und auf faulem Holze.

CCII.

HYDNUM AURISCALPIUM. Der ohrlöffelförmige Stachelſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLIII.

Hydnum cauleſcens, ſolitarium & ceſpitoſum, coriaceum; pileo ſemiorbiculari, conuexo, laterali, reniformi, lobato, piloſo, punctato, fuſco; aculeis non ſecedentibus, pallidioribus; petiolo tereti, gracili, procero, piloſo, fuſco, baſi bulboſo.

Hydnum (*auriſcalpium*) ſtipitatum, pileo dimidiato. Linn. fl. lapp. 524. fl. ſuec. I. n. 1100. II. n. 1260. ſpec. pl. I. p. 1178. II. 1648. ſyſt. nat. XII. p. 724. n. 4.
Echinus petiolo gracili, laterali, pileolo plano, obſcuro. Hall. hiſt. n. 2321.
Erinaceus paruus, hirſutus, ex fuſco fuluus, pileolo ſemiorbiculari, pediculo tenuiore. Mich. nou. gen. plant. pag. 132. tab. 72. fig. 8.
Boletus pileolo ſemiorbiculari, leuiter faſtigiato; tubulis connexis, echinato-denticulatis; petiolo praealto & tenui. Gled. fung. pag. 74. n. VII.
Fungus erinaceus paruus, in conis abietis naſcens. Buxb. cent. I. tab. 57. fig. 1.
Fungus erinaceus paruus, pediculo longiore, auriſcalpium referens, buxei coloris, in ſtrobilis abietis proueniens. Id. enum. pl. hall. pag. 129. cum icone.
Fungus non veſcus, echinatus, minor, hirſutus, pileolo ſemiorbiculari, fuſco. Breyn. mſc. cit. apud Mich. loc. cit.
In truncis, ramulis, conis, foliisque deiectis, putreſcentibus pini & abietis autumno pullulat.

Der Hut iſt halbrund, nierenförmig, am Rande eingeſchnitten, haarig, gedippelt, braun; die Stacheln ſind blaßbraun, und ſondern ſich nicht ab; der Stiel iſt rundlich, dünn, hoch, haarig, braun, am Ende knollig, an der Seite des Hutes.

Wächſt im Herbſte auf faulen Stöcken, Aeſten, Zapfen und abgefallenen Nadeln der Tannen und Fichten.

CCIII.

HYDNUM GELATINOSUM. Der gallerichte Stachelſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLIV. & CLXV.

Tremellodon gelat.

Hydnum ſubacaule, ſolitarium & ceſpitoſum, molle, gelatinoſum; pileo multiformi, truncato, angulato, clauato, ſquamoſo, lobato, viſcido, albido, demum glauco & ochroleuco; aculeis difformibus, imbricatis, non ſeceden-

ſecedentibus, albidis; petiolo inuerſe conico, breui, craſſo, albido, vel nullo.

Hydnum gelatinoſum. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 472. n. 1601.
Echinus gelatinoſus, cryſtallinus. Hall. hiſt. n. 2319.
Boletus acaulis, gelatinoſus, ſubtus aculeatus. Scop. fl. carniol. I. p. 48. n. 16.
Fungus erinaceus, candidus, ſubſtantia gelatinea. Hoffm. flor. Altdorf?
Fungus non veſcus IX. Loeſel. pruſſ. pag. 96.
In truncis & arboribus deiectis, aliisque lignis putreſcentibus reperitur.

Der ganze Schwamm hat keine beſtimmte Figur, bald iſt der Hut ohrförmig, bald abgeſtutzt, faſt viereckig, käulförmig, lappig, oder ſchuppig, allezeit aber ſchleimig, ſulzig, weich, glänzend, weißlich, hernach graulich, oder bräunlich; die Stacheln ſind ungleich, über einander liegend, weißlich, und ſondern ſich vom Fleiſche nicht ab; der Stiel iſt umgekehrt kegelartig, kurz, dick, weißlich, oder mangelt ganz und gar.

Wird auf faulem Holze, an alten Baumſtöcken und niedergeworfenen Bäumen angetroffen.

CCIV.

HYDNUM FLORIFORME. Der blumenförmige Stachelſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLVI. & CXLVII. 2. 3. 4. 5. 6.

Hydnum cauleſcens, ſubſolitarium, lignoſum; pileo primum truncato, albido, micis albis cryſtallinis adſperſo, dein conuexo, tandem planiuſculo, aureo, medio depreſſo, ſquamoſo: ſquamis eleuatis, acutis: margine criſpo, pallidiore; aculeis imbricatis, non ſecedentibus, pallide rufeſcentibus; petiolo inuerſe conico, breui, craſſo, rufo-fuſco, baſi tuberoſo.

In ſyluis aceroſis autumno creſcit.

Der Hut iſt im Anfange abgeſtutzt, weißlich, gleichſam mit Zucker überzogen, hernach erhaben, endlich platt, in der Mitte vertieft, mit aufgeworfenen, ſpitzigen Schuppen beſetzt, goldgelb, am Rande krauß und blaſſer; die Stacheln liegen übereinander, löſen ſich nicht ab vom Fleiſche, ſind von Farbe blaßröthlich; der Stiel umgekehrt kegelartig, kurz, dick, braunroth, unten knollig; das Fleiſch iſt holzig, roth von Farbe.

Wächſt in Tannen- und Fichtenwäldern im Herbſte.

CCV.

HYDNUM CRISPUM. Der krauße Holzſtachelſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLVII. fig. 1. 7. 8.

Hydnum ſubacaule, ſolitarium & ceſpitoſum, lignoſum; pileo planiuſculo, ſquamoſo, ſtriato, criſpo, lobato, plicato, rufo-fuſco; aculeis imbri-

imbricatis, non ſecedentibus, pallide rufis; petiolo breui, craſſo, rufo-fuſco, aut nullo.

Ad arborum truncos & ligna putrida reperitur.

Der Hut dieſes Baumſchwammes iſt flach, geſtrichelt, krauß, lappig, gefalten, braunroth; die Stacheln liegen über einander, ſind blaß röthlich, löſen ſich nicht ab; der Stiel iſt kurz, dick, braunroth, oder mangelt ganz und gar.

Wird an alten Baumſtöcken und auf faulem Holze angetroffen.

CCVI.

HYDNUM STRIATUM. Der geſtrichelte Stachelſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXI.

Hydnum cauleſcens, ſubſolitarium, carnoſum, duriuſculum, pileo planiuſculo, radiatim ſtriato, plicato, ceruino; aculeis imbricatis, ſecedentibus, pallidioribus; petiolo inuerſe conico, breuiſſimo, craſſo, concolore, baſi tuberoſo.

In ſyluis aceroſis autumno gignitur.

Der Hut iſt flach, geſtrahlt geſtrichelt, gefalten, rehfarb; die Stacheln ſind blaſſer, liegen über einander, ſondern ſich von dem bräunlichen Fleiſche ab; der Stiel iſt umgekehrt kegelförmig, ſehr kurz, dick, bräunlich, unten knollig.

Wächſt im Herbſte in Tannen- und Fichtenwäldern.

CCVII.

HYDNUM PULLUM. Der ſchwärzliche Stachelſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXII.

Hydnum cauleſcens, ſubſolitarium, coriaceum; pileo planiuſculo, ſtriato, nigricante, circulis alternis concentricis atris, medio depreſſo, margine repando, albido; aculeis non ſecedentibus, breuibus, plumbeis; petiolo inuerſe conico, ſtriato, nigricante, baſi radicato.

Erinaceus infundibulum imitans, colore pullo, ſuperne ſericeus, & circularibus ſtriis excavatus, inferne plumbeus, pediculo concolore. *Stecherino nero, malefico.* Mich. nou, gen. plant. pag. 133. tab. 72. fig. 5.

Boletus pileolo explanato, inaequali, deſuper ſericeo, lineis concentricis diſtincto, centro cauo; tubulis ſubtus conuexis, echinato denticulatis. Gled. fung. p. 69.

In ſyluis aceroſis, ericetis, aliisque locis montoſis, ſabuloſis, autumnali tempore occurrit.

Der Hut iſt flach, in der Mitte vertieft; ſchwärzlich, mit wechſelsweiſen dunklern Kreiſen, über und über geſtrichelt, am Rande weißlich und wellenförmig gebogen; die Stacheln ſind bleyfärbig, kurz und ſondern ſich nicht ab; der Stiel iſt ſchwärzlich.

Wird im Herbſte in Tannen- und Fichtenwäldern, auf Heyden und ſandigen, bergigen Orten angetroffen.

CCVIII.

HYDNVM SQVAMOSVM. Der ſchuppige Stachelſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXIII.

Hydnum cauleſcens, ſolitarium, carnoſum; pileo conuexo, rufeſcente, medio depreſſo, ſquamoſo, margine fornicato, inflexo; aculeis non ſecedentibus, imbricatis, pallidioribus; petiolo inuerſe conico, breui, craſſo, albido.

Hydnum (*imbricatum*). Linn. loc. cit.
Fungus pene albus, prone parte erinaceus. I. Bauh. hiſt. III. p. 828.
Cum Hydno imbricato, Tab. CXL. in ſyluis reperitur autumni tempore.

Der Hut iſt rothbräunlich, in der Mitte vertieft, ſchuppig, am Rande gewölbt, und eingebogen; die Stacheln ſind blaſſer, liegen über einander und ſondern ſich nicht ab; der Stiel iſt umgekehrt kegelförmig, kurz, dick, weißlich.

Wird mit der braunen Hirſchzunge auf der 140ſten Tafel im Herbſte in den Wäldern gefunden.

CCIX.

HYDNVM FLAVIDVM. Der gelbliche Stachelſchwamm. = repandum

Tom. IV. Tab. CCCXVIII.

Hydnum cauleſcens, ſolitarium & ceſpitoſum, carnoſum; pileo multiformi, conuexo, planiuſculo, ſubrepando, flauido; aculeis breuibus non ſecedentibus, pallidis; petiolo craſſiuſculo, flauo-albido, ſaepe deformi, baſi tuberoſo.

Hydnum repandum. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 471. n. 1599.
Hydnum (*repandum*) ſtipitatum, pileo conuexo, laeui, flexuoſo. Linn. loc. cit.
Erinaceus eſculentus, pallide luteus. Mich. nou. gen. plant. pag. 132. tab. 72. fig. 3.
Erinaceus coloris pallide citrei. Dill. cat. gieſſ. pag. 188. tab. 1.
Boletus pileolo puluinato, integerrimo, tubulis connatis, echinato-denticulatis. Gled. fung. pag. 74.
Fungus puluinatus, buxei fere coloris, volam manus aequens inferne multis appendiculis linguae vitulinae inſtar exaſperatias, nullo ſucco turgens. Hoffm. fl. altdorf.
In ſyluis acetoſis autumno creſcit.

Der Hut iſt öfters verunſtaltet, flach erhaben, gelblich; die Stacheln ſind blaßgelb, kurz, und ſondern ſich nicht von dem Fleiſche ab; der Stiel iſt öfters verunſtaltet, dick, unten knollig, weißlich gelb.

Wächſt im Herbſte in Fichten- und Tannenwäldern.

ELVELAE.

CCX.

ELVELA COCCINEA. Der hochrothe Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLVIII.

Eluela acaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, cartilaginea, fragilis; pileo concauo, plicato, multiformi, extus ſubhirſuto, albido, ſeu carneo, intus glabro, ſplendente, cinnabarino.

Eluela orbicularis, ſeſſilis, excauata, intus coccinea, tota glabra. Gled. fung. p. 49. n. IX. var. g.
Peziza caua, albida, intus coccinea. Hall. hiſt. n. 2222.
Peziza acetabuliformis, coccinei intus coloris. Dill. cat. gieſſ. p. 194. Berg. viadr. p. 372.
Peziza miniata maior. Dill. l. cit. Berg. viadr. p. 371.
Fungoides coccineum, acetabuli forma. Tourn. inſt. p. 561. Mich. nou. gen. plant. p. 206. n. 13.
Fungoides infundibuli forma, exterius album, intus coccineum. Mich. nou. gen. pl. p. 207.
Fungus membranaceus, ſeu coriaceus, acetabuli modo concauus, colore intus coccineo ſeu cremiſino ſaturato. Rai. ſynopſ. II. 19. n. 39. III. 18. n. 5.
Fungi pernicioſi generis XXIV. ſpec. 2. Cluſ. hiſt. p. 287.
Parua concha marina, colore concinneo. Sterb. theatr. fung. p. 242. tab. 26. D.
In ſyluis ſubhumidis, ad arborum truncos putridos, ad ſemitas & margines viarum, in terra argilloſa vere & autumno.

Der Hut iſt oben ausgehöhlt, von verſchiedener Geſtalt, trichterförmig, ſchüſſelförmig, ohrförmig, rund oder eckig, auch gefalten, mennigroth, hochzinnoberroth, mit und ohne gelber Beymiſchung, auch karmeſinroth, ganz platt und glänzend, die äußere oder untere Seite iſt etwas rauh, weißlich oder fleiſchfarb.

Wächſt in feuchten Wäldern an faulen Baumſtöcken, auch in thonigtem Erdreich, an den Fußſteigen und neben den Wegen im Frühjahre und Herbſte.

CCXI.

ELVELA CLAVATA. Der kaulenförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CXLIX.

Eluela cauleſcens, ſolitaria & ceſpitoſa, carnoſa, molliuſcula; pileo ouato, compreſſo, obliquo, margine inaequali, circa petiolum plicato, vario, flauo; petiolo tereti, longo, flexuoſo, pleno, concolore, baſi tuberoſo.

Agaricum gelatinoſum, petiolatum, capitatum, flauum. Hall. hiſt. n. 2269.
Fungoidaſter paruus, gelatinoſus, lubricus, pileolo ſubuiridi, oris ſubtus repandis, pediculo aureo, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. pag. 201. tab. 82. fig. 2?
Fungus gelatinoſus flauus. Vaill. pariſ. pag. 58. tab. 13. fig. 7. 8. 9.
Sero autumno in ſyluis gignitur.

Der ganze Schwamm iſt weich, faſt gallerich, gelb. Der Hut iſt eyrund, zuſammengedrückt, ſchief, um den Stiel gefalten, am Rande ungleich, verſchieden geſtaltet; der Stiel rund, lang, etwas gebogen, voll, unten knollig.

Wächſt in ſpätem Herbſte in den Wäldern.

CCXII.

ELVELA SCVTELLATA. Der gelbe becherförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CL.

Eluela acaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, cartilaginea, fragilis; pileo concauo, plicato, multiformi, glabro, luteo.

Peziza bracteata, ſordide lutea, ſubuilloſa. Hall. hiſt. n. 2223.
Fungoides ſcutellatum, maius, cerae flauae colore. Mich. nou. gen. plant. pag. 206.
Fungoides luteſcens, ollam referens. Buxb. comm. acad. petrop. tom. IV. pag. 283. tab. 29. fig. 2. 7.
Fungus tenuis, cerae flauae ſimilis, ventricoſum mortarium referens. Bocc. muſ. p. 300.
Ad ſemitas viarum & agrorum margines & ad ligna putrida vere & autumno reperitur.

Der ganze Schwamm iſt gelb, glatt und ohne Stiel, knorplig, gebrechlich, hohl, gefalten, von verſchiedener Geſtalt.

Wächſt im Frühjahre und Herbſte an den Wegen, Fußſteigen und Rainen, auch auf faulem Holze.

CCXIII.

ELVELA ALBIDA. Der weißliche Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLI.

Eluela acaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo concauo, hemiſphaerico, intus e caeruleo albido, glabro, extus ſubfuſco, hirſuto, margine inaequali, piloſo, inferne radicato.

Eluela hemiſphaerica, excauata & ſeſſilis, radice longa. Gled. fung. pag. 46. n. IX.
Eluela hemiſphaerica, excauata & ſeſſilis, intus candida, glabra, extus piloſa & ſubobſcura. Ibid. var. a.
Peziza ſeſſilis, hemiſphaerica, extus villoſa, ſpadicea. Hall. hiſt. n. 2231.
Fungoides ſcutellatum, album, foris hirſutum. Mich. nou. gen. pl. p. 206. n. 9.
Fungoides ſcutellatum, interne album, externe obſcurum & ſubhirſutum. Ibid. pag. 208. n. 8. tab. 86. fig. 4.

In ſyluis humidis & paludoſis autumno prouenit, ſaepius lignis putridis inſidens.

Dieſer Schwamm iſt lederhaft, halbrund, bewurzelt, auſſen und am Rande haarig, bräunlich, innen glatt, weiß, mit etwas blau vermiſcht.

Wächſt im Herbſte in feuchten und ſumpfigen Wäldern, öfters auf faulem Holze.

CCXIV.

ELVELA HYPOCRATERIFORMIS. Der präſentirtellerförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLII.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, coriacea; pileo concauo, planiuſculo, glabro, margine vario, intus fuſco, extus ſordide albo; petiolo tereti, breui, ſordide albo, pleno, baſi tuberoſo, radicato.

Fungoides hypocrateris forma, pediculo donatum, ſuperne fuluum, inferne album. Mich. nou. gen. plant. pag. 205. tab. 86. fig. 6.

Syluarum incola, autumnique progenies.

Der Hut iſt oberwärts glatt, hohl, bräunlich, mit verſchiedenem Rande, unten oder auswärts nebſt dem Stiele ſchmutzig weiß; der Stiel rundlich, unten knollig und bewurzelt.

Wächſt in den Wäldern im Herbſte.

CCXV.

ELVELA INFLATA. Der blaſenförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLIII.

Eluela cauleſcens, ſed per ſpeciem ſeſſilis, ſolitaria & ceſpitoſa, cartilaginea, fragilis; pileo conuexo, inaequali, rugoſo, tuberculoſo, ambitu vario, atro-fuſco, ſubtus concauo, e flauido & fuſco albido; petiolis in vno pileo pluribus, teretibus, breuibus, gracilibus, albidis.

Eluela lamina gyroſa, ſub inaequalis pileoli forma deorſum late & fimbriatim expanſa. Gled. fung. pag. 39. n. 2.

Fungus poroſus communis, inteſtinorum gyros referens. Menz. pag. var. tab. 6.

In arenoſis ſyluarum locis verno tempore pullulat, & ſaepe autumno temperato & pluuioſo redit.

Der ganze Schwamm ſiehet einer aufgeblaſenen Rinde ähnlich, iſt verſchiedentlich erhaben, knorpelig, ungleich, von verſchiedenem Umfange, oben ſchwarzbraun, unten hohl, gelblich und bräunlich weiß. Jede Blaſe hat untenher rundliche, kurze, dünne, weißliche Stiele.

Kömmt im Frühjahre an ſandigen Orten in und an den Wäldern hervor, und öfters im Herbſte wieder.

CCXVI.

ELVELA NIGRICANS. Der ſchwärzliche Pfaffenhut.

Tom. II. Tab. CLIV.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, nigricante; petiolo craſſo, plicato, ſtriato, ſubtortili, rimoſo, albido, intus cauernoſo, baſi bulboſo.

Elvela

Eluela petiolata, lamina in formam capituli deorſum plicata, laciniata & criſpa; petiolo fiſtuloſo, ſtriato & rimoſo. Gled. fung. p. 36. n. 1.
Eluela pileo plicato, criſpo; ſtipite rimoſo, cauernoſo, pleno. Scop. fl. carniol. I. p. 51. (a).
Heluella (*Mitra*) pileo deflexo, adnato, lobato, difformi. Linn. fl. ſuec. I. n. 1103. II. n. 1265. ſpec. plant. I. pag. 1180. II. pag. 1649. ſyſt. nat. XII. p. 725. n. 1. Hunc & plures alios ex ſequentibus comprehendit.
Boletus capitulo explanato, laciniato. Hall. hiſt. n. 2246. var. β.
Boletus petiolo rugoſo, pileolo latiſſimo, laciniato. Hall. enum. helu. p. 23. Rupp. hall. p. 360.
Boletus pileolo ſpiralibus plicis contorto. Batarr. fung. arim. tab. II. G.
Phallus criſpus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 475. n. 1606.
Fungoides fungiforme, criſpum, laciniatum, & complicatum, pediculo craſſo, ſtriato, rimoſo & fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. pag. 204. n. 3. tab. 86. fig. 7. Forſan potius
Fungoides fungiforme, criſpum, & laciniatum, ſuperne nigrum, inferne albidum, pediculo fiſtuloſo, craſſiore, albo. Ibid. n. 5.
In ſyluis humidioribus vere & autumno gignitur.

Der Hut iſt verſchiedentlich gefalten, hohl, gleichſam aufgeblaſen, eckig, ſchwärzlich; der Stiel iſt dick, gefalten, gewunden gerieft, löcherig, weißlich, unten dicker, innen voll Höhlen.
Wächſt in feuchten Wäldern im Frühlinge und Herbſte.

CCXVII.

ELVELA OCHRACEA. Der braune becherförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLV.

Eluela acaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, cartilaginea, fragilis; pileo concauo, plicato, multiformi, ochraceo.

Peziza bracteata, ſordide lutea, ſubuilloſa. Hall. hiſt. n. 2223.
Fungoides criſpum, & vndoſum, acetabuli forma, intus, & foris obſcurum. Mich. nou. gen. pl. pag. 206. n. 4.
Fungoides fuſcum maius. Buxb. comment. acad. petrop. T. IV. p. 283. t. 29. f. 1. 6.
Fungoides luteſcens, ollam referens. Ibid. f. 1. 2. 7.
Reperitur ad ſemitas, margines viarum & agrorum, & ad ligna putrida, vere & autumno.

Der ganze Schwamm iſt ockerbraun, oben hohl, verſchieden gefalten und geſtaltet, knorpelig, gebrechlich, meiſt glatt.
Man findet ihn im Frühlinge und Herbſte, an den Wegen, Fußſteigen und Rainen, auch auf faulem Holze.

CCXVIII.

ELVELA AVRICVLA. Der ohrförmige Faltenſchwamm.

= Auricularia Auricula

Tom. II. Tab. CLVI.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria, coriacea; pileo concauo, obouato, cucullato, inaequali, ochroleuco; petiolo tereti, breuiſſimo, concolore.

Peziza

Peziza bracteata, ſordide lutea, ſubuilloſa. Hall. hiſt. n. 2223. auriculae forma.
Cum praecedente reperitur.

Der ganze Schwamm iſt abgeſchoſſen dunkelgelb oder licht ockerfarb, von der Geſtalt eines Thierohrs oder eines Löffels, mit einem ganz kurzen Stiele.

Wird an eben den Orten und zu eben der Zeit, wie der vorhergehende, gefunden.

CCXIX.

ELVELA TVBAEFORMIS. Der trompetenförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLVII.

Eluela cauleſcens, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo conuexo, ſtriato, fuſco, circulis alternis ſaturatioribus & dilutioribus notato, centro concauo, margine fornicato, attracto, inaequali, ſublobato, ſubtus venoſo, plicato, obſolete aurantio; venis decurrentibus; petiolo inuerſe conico, incuruo, obſolete aurantio, fiſtuloſo.

Eluela lubrica. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 477. n. 1609?
Fungoidaſter paruus, gelatinoſus, lubricus; pileolo ſubuiridi; oris ſubtus repandis; pediculo aureo, fiſtuloſo. Mich. nou. gen. plant. pag. 201. tab. 82. fig. 2.
Fungus gelatinoſus, flauus. Vaill. pariſ. pag. 58. tab. 13. fig. 7. 8. 9.
In ſyluis autumno gignitur.

Der Hut iſt oberwärts braun, geſtrichelt, mit hellern und dunklern Kreiſen, in der Mitte vertieft, am Rande gewölbt, gegen den Stiel umgebogen, ungleich, öfters geſpalten, unterwärts abgeſchoſſen goldgelb, geädert, gefalten: mit ablaufenden Adern; der Stiel iſt ebenfalls abgeſchoſſen goldgelb, umgekehrt kegelförmig, gekrümmt, innen hohl.

Wächſt im Herbſte in den Wäldern.

CCXX.

ELVELA PVLLA. Der ſchwarzbraune becherförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLVIII.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, carnoſa; pileo ſuperne concauo, ſaepe rugoſo, atro-fuſco, margine repando, inferne ſeu externe fuſco, punctato, rugoſo; petiolo tereti, breui, rugoſo, fuſco, aut nullo.

Peziza ſeſſilis, infundibuliformis, extus hirſuta, vmbrina, intus nigerrima. Hall. hiſt. n. 2219.
Ad putrida ligna & deiectos arborum truncos autumno reperitur.

Der Hut iſt oberwärts hohl, öfters runzelich, ſchwarzbraun, auch faſt ganz ſchwarz, unten oder auſſen erhaben, braun, gedippelt, runzelich; der Stiel iſt rundlich, kurz, runzelich, braun, oder mangelt gar.

Man findet ihn im Herbſte auf faulem Holze und umgeworfenen Baumſtämmen.

CCXXI.

CCXXI.

ELVELA INFVLA. Der lichtbraune Biſchofshut, Pfaffenhut, oder Stockmaurache.

Tom. II. Tab. CLIX.

Eluela caulescens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, ſuperne bi- tri- quadricuſpidato, ochraceo; petiolo tereti, ſaepe compreſſo, ſuperne dilatato, quaſi duplicato, albido, fiſtuloſo.

Eluela parua, lamina biſulca, in formam capituli duplicati, plani & nonnihil faſtigiati deorſum contracta. Gled. fung. pag. 38. n. 1. var. e.

Heluella (*Mitra*) pileo deflexo, adnato, lobato, difformi. Linn. fl. ſuec. I. n. 1103. II. n. 1265. ſpec. plant. I. pag. 1180. II. pag. 1649. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 1. Plures comprehendit.

Boletus capitulo explanato, laciniato. Hall. hiſt. n. 2246. var. α.

Boletus mitram pontificis referens, pullus. Rupp. fl. ien. pag. 302.

Phallus Monacella. Scop. flor. carniol. II. P. II. p. 476. n. 1607.

Fungoides fungiforme, criſpum, laciniatum, & varie complicatum, ſuperne ſubobſcurum, inferne ſimul cum fiſtuloſo pediculo album. Mich. nou. gen. plant. pag. 725. tab. 86. fig. 8.

Fungus autumnalis biſulcus, velut apex flaminis Plinii. Menzel. pug. rar. plant. tab. 6.

Oed. fl. dan. tab. CXVI.

Occurrit autumno poſt pluuias diuturniores in pratis, circa pagos & ſtagna, praeſertim in lignis putridis.

Der Hut iſt lichtbraun, häutig, knorpelig, gebrechlich, aufgeblaſen, gefalten, hohl, eckig, oberwärts zwey- drey- bis vierſpitzig; der Stiel oben dicker, rundlich, öfters zuſammengedrückt, gleichſam gedoppelt, weißlich, hohl.

Man findet ihn im Herbſte, nach lange anhaltendem Regenwetter auf den Wieſen, um die Dörfer und Teiche, beſonders auf faulem Holze.

CCXXII.

ELVELA MITRA. Der dunkelbraune Biſchofshut, Pfaffenhut, Stockmaurache.

Tom. II. Tab. CLX. & CLXI.

Eluela caulescens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, rugoſo, ſuperne bi- tricuſpidato, rufo-fuſco, fuliginoſo; petiolo tereti, ſaepe quaſi duplicato, albido, fiſtuloſo.

A proxime praecedente differt pileo magis rugoſo, ſaturatius fuſco.

Locus & tempus cum praecedente conueniunt.

Dieſer Schwamm unterſcheidet ſich vom vorhergehenden, durch den mehr runzlichen, und dunkler gefärbten Hut.

Ort und Zeit iſt mit dem vorhergehenden einerley.

CCXXIII.

ELVELA MONACELLA. Der erdfarbe Biſchofshut.

Tom. II. Tab. CLXII.

Eluela caulefcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, ſuperne bi- tricuſpidato, terreo; petiolo craſſo, plicato, ſtriato, rimoſo, fere concolore, intus cauernoſo.

Eluela pileo plicato, fuſco; ſtipite rimoſo, fiſtuloſo. Scop. fl. carn. I. p. 51. (b).
Eluela petiolata, lamina in formam capituli deorſum plicato-laciniata & criſpa; petiolo fiſtuloſo, ſtriato & rimoſo. Gled. fung. pag. 36. n. 1.
Heluella (*Mitra*). Linn. l. cit.
Phallus criſpus. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 475. n. 1606.
Boletus capitulo explanato, laciniato. Hall. hiſt. n. 2246. var. β.
Creſcit in humidis verno & autumnali tempore.

Der Hut iſt dunkelgrau, zuweilen etwas grünlich, aufgeblaſen, gefalten, eckig, oben zwey- oder dreyſpitzig; der Stiel iſt dick, gefalten, geſtreift, gerieft, faſt von der Farbe des Hutes, innen voll Höhlen.
Wächſt in feuchten Wäldern im Frühlinge und Herbſte.

CCXXIV.

ELVELA RAMOSA. Der äſtige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXIII.

Eluela caulefcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo laciniato, ramoſo, foliaceo, criſpo: foliis multifidis, criſpis, irregularibus, albidis, vel ochroleucis; petiolo inuerſe conico, craſſo, carnoſo, pleno, ochraceo.

In ſyluis ad radices arborum gignitur autumno.

Der Hut dieſes Schwammes iſt völlig äſtig und blätterig, zerriſſen und krauß; die einzelnen Blättern ſind vielſpaltig, krauß, ungleich weißlich, oder ganz lichtbraun; der Stiel iſt umgekehrt kegelig, dick, fleiſchig, voll, ockerbraun.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern an den Wurzeln der Bäume.

CCXXV.

ELVELA CARNEA. Der fleiſchfärbige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXIV.

Eluela caulefcens, ſolitaria & ceſpitoſa, carnoſa; pileo primum clauato, ſuperne truncato, ochraceo, ad latera ſtriato, plicato, ſubpurpureo, demum infundibuliformi, margine lobato, repando, criſpo, intus luteo, ſtriato, extus purpuraſcente, longitudinaliter rugoſo; petiolo tereti, breui, pleno.

Auguſto

Auguſto & Septembri in ſylvis caeduis, circa truncos arborum putridos oritur.

Dieſer Schwamm iſt anfangs käulenförmig, oben abgeſtutzt, ockerbraun, an den Seiten geſtreift, gerieft, abgeſchoſſen purpurfarb, hernach trichterförmig, am Rande geſpalten, wellenförmig, krauß, innen gelb, geſtrichelt, auſſen fleiſchfärbig, der Länge nach runzlich. Der Stiel iſt rundlich, kurz, voll.

Wächſt im Auguſt und September in Holzſchlägen, an den faulen Baumſtöcken.

CCXXVI.

ELVELA CORNVCOPIAE. Das braune Fühlhorn, ein trichterförmiger Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXV.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo primum clauato, demum profunde infundibuliformi, intus fuſco, ſtriato, margine lobato, repando, reflexo, extus caeruleſcente, venoſe rugoſo; petiolo breuiſſimo, aut nullo.

Eluela cornucopioides. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 476. n. 1608.
Eluela corpore infundibuliformi, intus fuſco, extus cinereo, margine tumido, extrorſum reflexo. Gled. fung. pag. 41. n. V. var. b.
Peziza membranacea, tubae ſimilis; marginibus replicatis. Hall. hiſt. n. 2216.
Peziza conica, labro reflexo. Hall. enum. helu. 21.
Fungoides nigricans, maius, cornucopiae forma. Vaill. pariſ. pag. 57. tag. 13. fig. 2. Mich. nou. gen. pl. 201. n. 6.
Fungoides ceſpitoſus, ſuperne fuſcus, inferne cinereus. Mich. nou. gen. pl. pag. 201. n. 5. tab. 82. fig. 5.
Fungoidaſter, qui Fungoides tubae acuſticae forma, fuſcus, externe cinereus D. Breynii. Mich. nou. gen. plant. pag. 201. n. 7. tab. 82. fig. 6.
Oed. fl. dan. tab. CCLXVIII.
Creſcit in ſylvis ad muſcoſas arborum radices ſero autumno.

Der Trichter dieſes Schwammes iſt innen braun und geſtrichelt, am Rande geſpalten, wellenförmig, umgebogen, auſſen blaulichgrau, äderig, runzelich, mit einem ſehr kurzen oder gar keinem Stiele. Vor der Entwickelung iſt er käulenförmig, oben abgeſtutzt, und geſchloſſen.

Wächſt im ſpäten Herbſte in den Wäldern an den mooßigen Wurzeln der Bäume.

CCXXVII.

ELVELA PVNCTATA. Das gedippelte Fühlhorn, ein blumenförmiger Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXVI.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo primum clauato, demum profunde infundibuliformi, intus ochraceo, punctato, margine profunde

funde lobato, planiuſculo, reflexo, extus caeruleſcente, venoſe rugoſo; petiolo breuiſſimo, aut nullo.

Eluela cornucopioides. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 476. n. 1608.
Eluela ſtipitata; pileo infundibuliformi, punctato, margine reflexo. Scop. fl. carniol. I. pag. 52 n. 2.
Eluela infundibuliformis, ore expanſo, laciniato, punctato. Guett. ſtamp. 1. p. 11. Dalib. pariſ. 384.
Peziza (*cornucopioides*) infundibuliformis, diſco patente ſinuato punctato. Linn. ſpec. plant. I. pag. 1181. II. pag. 1650. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 3.
Cum praecedente reperitur.

Der Trichter dieſes Schwammes iſt innen ockerbraun und gedippelt, am Rande tief geſpalten, etwas platt und umgebogen, blumenförmig, auſſen blaulich, ăderig, runzelich, mit einem ſehr kurzen oder gar keinem Stiele. Vor der Entwickelung iſt er ſäulenförmig, oben abgeſtutzt und geſchloſſen.

Wird mit dem vorhergehenden gefunden.

CCXXVIII.

ELVELA HISPIDA. Der rauhe praſentirtellerförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXVII.

Eluela cauleſcens, ſubſolitaria, coriacea; pileo ſubhemiſphaerico, ſuperne concauo, laeui, ochroleuco, inferne conuexo, piloſo, pallido; petiolo tereti, ſurſum attenuato, piloſo, pleno, ochroleuco, baſi bulboſo.

Peziza terrea, petiolo longo gracili, acetabulo extus ſubaſpero, plano aut concauo. Hall. hiſt. n. 2227.
Fungoides fuſcum, pediculo longiori donatum. Buxb. comm. acad. petrop. IV. p. 282. t. 29. f. 3.
In ſyluis reperitur autumno.

Der Hut iſt faſt halbrund, oben hohl, glatt, lichtbraun, unten erhaben, haarig, gelblich weiß; der Stiel rundlich, oben verdünnert, haarig, voll, lichtbraun, unten knollig.

Wird im Herbſte in den Wäldern angetroffen.

CCXXIX.

ELVELA MESENTERICA. Der gekröſeförmige Faltenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXVIII.

Eluela acaulis, ceſpitoſa, gelatinoſa, viſcida; pileo membranaceo, in gyros varie contortuplicato, aureo, demum fuluo.

Eluela membranacea, multiplex, membranis ſeſſilibus, fimbriato-plicatis. Gled. fung. p. 51. n. X.
Agaricus membranaceus, ſinuoſus, ſubſtantia gelatinae. Dill. cat. gieſſ. p. 194.

Agaricum

Agaricum gelatinoſum, intortum & meſenteriforme. Hall. hiſt. n. 2261.
Agaricum gelatinoſum, membranaceum, aureum, ſinuatum & criſpum. Mich. nov. gen. plant. pag. 124. n. 3.
Noſtoch luteum, meſenterii forma. Vaill. pariſ. tab. 14. fig. 4.
Fungus membranaceus, aureus, paruus. Sterb. theatr. fung. pag. 247. tab. 26.
Fungi pernicioſi generis XXIV. ſpecies 3. Cluſ. hiſt. pag. 287.
Verno tempore in putridis arborum truncis oritur.

Der ganze Schwamm iſt ſulzig, ſchleimig, krauß in einander gefalten, wie ein Gekröſe, goldgelb, im Alter bräunlich gelb.

Wächſt im Frühjahre auf faulen Baumſtöcken.

CCXXX.

ELVELA OCHROLEVCA. Der lichtbraune becherförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXIV.

Eluela acaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, cartilaginea, fragilis; pileo concauo, plicato, multiformi, glabro, extus terreo, intus ochroleuco.

Accedit ſtructura ſua ad Eluelam ſcutellatam n. CCXII. Tab. CL. colore differt.
Conuenit quoque loco & tempore naſcendi.

Dieſer Schwamm kommt, dem Baue nach, dem gelben becherförmigen Faltenſchwamm n. CCXII. auf der 150ſten Kupfertafel, nahe, iſt aber durch die Farbe von ſelbigem unterſchieden, auſſen erdfärbig, innen blaßbraun.

Auch Zeit und Ort kommt mit n. CCXII. überein.

CCXXXI.

ELVELA TVBVLOSA. Der röhrenförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXV.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo tubuloſo, intus nigricante, ſtriato, margine inaequali, conniuente, extus cinereo, venoſe rugoſo; petiolo breuiſſimo, aut nullo.

Forſan varietas Eluelae cornucopiae n. CCXXVI. Tab. CXLV. nondum penitus explicatae.
In ſyluis ad arborum radices autumno reperitur.

Dieſer Schwamm iſt vielleicht eine bloſſe Abänderung des braunen Füllhorns n. CCXXVI. auf der 165ſten Kupfertafel, ſo nicht gänzlich entwickelt iſt.

Wird im Herbſte an den Wurzeln der Bäume gefunden.

CCXXXII.

ELVELA PVRPVRASCENS. Der purpurfärbige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXVI.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria & ceſpitoſa, carnoſa; pileo primum clauato, ſuperne truncato, demum infundibuliformi, margine lobato, repando, criſpo, inaequa-

inaequali, intus pallide luteo, laeui, extus obſolete purpureo, longitudinaliter rugoſo; petiolo breuiſſimo, aut nullo.

Videtur eſſe varietas Eluelae carneae, tab. CLXIV. a qua differt colore extus purpureo-nigricante, intus pallide luteo aut ſtramineo, ſtriisque intus nullis.
Loco ceterum temporeque natali conuenit.

Dieſer Schwamm ſcheinet eine Abänderung des fleiſchfärbigen Faltenſchwammes auf der 164ſten Kupfertafel zu ſeyn, von welchem er ſich durch die Farbe und den Mangel der Streifen auf der innern Seite unterſcheidet. Hier iſt die Farbe auſſen ſchwärzlich purpurfarb, innen blaßgelb, oder ſtrohfarb, in jenem hingegen iſt die äuſſere Seite fleiſchfarb, die innere mehr zitronengelb.
Uebrigens kommt Zeit und Ort bey beyden überein.

CCXXXIII.

ELVELA INFVNDIBVLIFORMIS. Der trichterförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXVII.

Eluela caulescens, plerumque ceſpitoſa, coriacea; pileo ſuperne concauo, ſtriato, ochroleuco, margine lobato, repando, parum reuoluto, inferne ſordide albo; petiolo inuerſe conico, pleno, ſuperne ſordide albo, inferne fuſco.

Eluela petiolata, luteo-fuſca & glabra, corpore excauato, infundibuliformi. Gled. fung. p. 41. n. V. var. a?
In ſyluis occurrit ſero autumno.

Der Hut iſt oben hohl, geſtrichelt, blaßbraun, am Rande eingeſchnitten, wellenförmig, etwas umgebogen, unten ſchmutzig weiß; der Stiel umgekehrt kegelförmig, voll, oben ſchmutzig weiß, unten braun.
Man findet ihn im ſpäten Herbſte.

CCXXXIV.

ELVELA FLORIFORMIS. Der blumenförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXVIII.

Eluela cauleſcens, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo planiuſculo, glabro, ſtriato, fuſco-griſeo, medio plicato, concauo, margine lobato, repando; petiolo inuerſe conico, gracili, pleno, concolore.

In ſylvis ad radices arborum muſcoſas verno & autumnali tempore pullulat.

Der Hut iſt blumenförmig, flach, glatt, geſtrichelt, bräunlich grau, in der Mitte gefalten, vertieft, am Rande getheilt, wellenförmig; der Stiel umgekehrt kegelförmig, dünn, voll, von eben der Farbe, wie der Hut.

Wächſt

Wächſt in den Wäldern an den mooſigen Wurzeln der Bäume im Frühling und Herbſte.

CCXXXV.

ELVELA CLAVVS. Der nagelförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXIX.

Eluela cauleſcens, ſolitaria & ceſpitoſa, carnoſa; pileo ſuperne conuexo, inferne planiuſculo, vndique laeui, e fuſco albido; petiolo tereti, gracili, pleno, concolore.

Creſcit in putridis fungis, fructibus, lignis, autumnali tempore.

Der Hut iſt oberwärts gewölbt, unten faſt eben, allenthalben glatt, blaßbräunlich; der Stiel walzenförmig, dünn, voll, eben dieſer Farbe.

Wächſt auf faulen Schwämmen, Früchten und Holze zur Herbſtzeit.

CCXXXVI.

ELVELA PYXIDATA. Der gelbe büchſenförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXX.

Eluela ſeſſilis, ſubſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo ſubgloboſo, glabro, ſordide flauo, intus concauo, inferne plicato, margine ſubdentato, inaequali, lacero.

Ad viarum, agrorumque margines repetitur vere & autumno.

Der Hut iſt faſt kugelrund, glatt, ſchmutzig gelb, innen hohl, unten gefalten, am Rande ausgezackt, ungleich, zerriſſen.

Wird an den Wegen und Rainen im Frühjahre und Herbſte angetroffen.

CCXXXVII.

ELVELA PILEVS. Der hutförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXXI.

Eluela ſubacaulis, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo ſuperne conuexo, glabro, obſolete luteo, ſaepius trigono, lateribus inflexis, inferne concauo, punctato, albido; petiolo tereti, breui, pleno, albido.

In ſyluis autumno reperitur.

Der Hut iſt oben abgeſchoſſen gelb, glatt, erhaben, öfters dreyeckig, mit unterwärts gebogenem Rande, unten hohl, weißlich gedippelt; der Stiel iſt kurz, voll, weißlich.

Wird im Herbſte in den Wäldern gefunden.

CCXXXVIII.

ELVELA PALLIDA. Der fahle Pfaffenhut.

Tom. III. Tab. CCLXXXII.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, pallido; petiolo craſſo, plicato, ſtriato, ſubtortili, rimoſo, ſubconcolore, intus cauernoſo, baſi bulboſo.

Reperitur cum Eluela nigricante Tab. CLIV. cuius forte varietas eſt, & a quo ſolo colore differt, tota ſtructura ceterum ſat ſimilis.

Wird mit dem ſchwärzlichen Pfaffenhut auf der 154ſten Kupfertafel angetroffen, wovon er vielleicht eine Abänderung iſt, und bloß durch die fahle Farbe ſich unterſcheidet, da er übrigens dem ganzen Baue nach demſelben ähnlich iſt.

CCXXXIX.

ELVELA SPADICEA. Der braune Pfaffenhut.

Tom. III. Tab. CCLXXXIII.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, ſubrotundo, ſpadiceo; petiolo tereti, ſaepe compreſſo, plicato, curuato, ſuperne dilatato, ſubconcolore, fiſtuloſo.

Eluela petiolata, lamina in formam capituli deorſum plicato-laciniata & criſpa, ſubfulua; petiolo fiſtuloſo, ſtriato & rimoſo, concolore. Gled. fung. pag. 37.
In ſyluis reperitur Maio menſe.

Der Hut iſt braun, eckig, gefalten, aufgeblaſen, rundlich, der Stiel öfters gewunden, zuſammengedrückt, oben weiter, innen hohl, faſt von gleicher Farbe, wie der Hut.
Wird im Maymonat in den Wäldern gefunden.

CCXL.

ELVELA CILIATA. Der hochrothe haarige ſchaalenförmige Faltenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXXIV.

Eluela acaulis, ſolitaria, coriacea; pileo hemiſphaerico, coccineo, ſuperne concauo, glabro, inferne & in margine piloſo, tenuiſſime radicato.

Eluela ciliata. Scop. fl. carn. II, P. II. pag. 481. n. 1620.

Eluela ſeſſilis, diſco coccineo, plano; oris ciliatis. Scop. fl. carn. I. p. 54. (a).

Eluela orbicularis, minima, ſeſſilis, coccinea, plana; margine ciliato vel nudo. Gled. fung. pag. 45. n. VIII. var. b.

Peziza ſeſſilis, miniata, plana, ora ciliata. Hall. hiſt. n. 2245.

Peziza

Peziza (*ſcutellata*) plana: margine conuexo piloſo. Linn. ſpec. pl. I. p. 1181. II. p. 1651. fl. ſuec. II. n. 1272. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 7.
Fungoides coccineum, lentiforme; oris piloſis. Mich. nou. gen. pl. pag. 207. tab. 86. fig. 19.
Verno tempore pullulat ad vias, margines agrorum, radices arborum muſcoſas & ad ligna putrida, ſaepiusque autumno redit.

Der Hut iſt hochroth, ſchüſſelförmig, oben glatt, am Rande und auſſen haarig, unten dünn bewurzelt.
Wächſt im Frühjahre an den Wegen, Rainen, mooſigen Wurzeln der Bäume und auf faulem Holze, und kömmt öfters im Herbſte wieder.

CCXLI.

ELVELA FOLIACEA. Der blätterichte Faltenſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXIX.

Eluela acaulis, ceſpitoſa, coriacea; pileo concauo, planiuſculo, margine lobato, laciniato, ſuperne albido, glabro, inferne fuſco, hirſuto.

Eluela multiplex & ſeſſilis, foliaceo-laciniosa, lobis varie, tenuiter & profunde diuiſis. Gled. fung. pag. 52. n. XII.
Agaricum lichenoſum, album, & eleganter laciniatum. Mich. nou. gen. plant. pag. 125. n. 15.
In ſyluis humidis inter folia deiecta putrida & ad radices arborum muſcoſas ſero autumno & initio veris reperitur.

Dieſer Schwamm iſt lederartig, oben weißlich, glatt, flach ausgehöhlet, am Rande verſchiedentlich zerſpalten, unten braun und haarig.
Man findet ihn im ſpäteſten Herbſte und angehendem Frühjahre in feuchten Wäldern unter dem abgefallenen verfaulenden Laube, auch an den mooſigen Wurzeln der Bäume.

CCXLII.

ELVELA FVLIGINOSA. Der ſchwarzgraue oder rauchfarbe Biſchofshut.

Tom. IV. Tab. CCCXX.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, ſuperne bi- tricuſpidato, nigricante; petiolo tereti, ſaepe compreſſo, ſuperne dilatato, quaſi duplicato, griſeo, fiſtuloſo.

Boletus mitram pontificis referens, nigricans. Rupp. fl. jen. pag. 302.
Autumno in pratis humidis & ad ligna putrida occurrit.

Der Hut iſt ſchwarzgrau, zuſammengefalten, hohl, oben zwey-dreyſpitzig; der Stiel oben dicker, rundlich, öfters zuſammengedrückt, gleichſam gedippelt, weißgrau, hohl.
Wird im Herbſte auf feuchten Wieſen und an faulem Holze angetroffen.

CCXLIII.

ELVELA VILLOSA. Der zottigte Faltenſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXXI.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, rotundiuſculo, villoſo, nigricante; petiolo tereti, pleno, curuato, albido.

In lignis putridis, inter folia deiecta & muſcos reperitur verno tempore.

Der Hut iſt ſchwärzlich, zottigt, zuſammengefalten, rundlich, innen hohl; der Stiel voll, krumm, weißlich.

Wird auf faulem Holze, unter dem abgefallenen Laube und unter dem Mooſe im Frühjahre angetroffen.

CCXLIV.

ELVELA PALLESCENS. Der fahle Biſchofshut.

Tom. IV. Tab. CCCXXII.

Eluela cauleſcens, ſolitaria, cartilaginea, fragilis; pileo membranaceo, inflato, plicato, angulato, ſuperne bicuſpidato, pallido; petiolo plicato, ſtriato, concolore, pleno.

Boletus mitram pontificis referens, albicans. Rupp. fl. jen. pag. 302.
In pratis humidis & ad ligna putrida obvius vere & autumno.

Der ganze Schwamm iſt fahl, der Hut zuſammengefalten, hohl, oben zweyſpitzig; der Stiel oben dicker, rundlich, gerieft, voll.

Iſt im Frühjahre und Herbſte auf feuchten Wieſen und faulem Holze anzutreffen.

CCXLV.

ELVELA PVRPVREA. Der purpurfärbige Faltenſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXXXIII. & CCCXXXIV.

Eluela ſubacaulis, plerumque ceſpitoſa, gelatinoſa; pileo vario, hemiſphaerico, infundibuliformi, floriformi, lobato, plicato, criſpo, purpureo; petiolo vario, ſaepe deformi, breui, pleno, ſubconcolore, aut nullo.

Peziza gelatinoſa, coccinea, ſcyphis conicis, ſimplicibus & gregariis. Hall. hiſt. n. 2221.
Creſcit in truncis arborum, lignis putridis, radicibus muſcoſis arborum.

Dieſer gallerigte Schwamm iſt von verſchiedener Figur, bald mit einem halbrunden, bald mit einem trichterförmigen, bald blumenförmigen, bald geſpalten, gefalteten, krauſen Hute, meiſtentheils purpurfärbig, zuweilen etwas hochroth. Der Stiel iſt ebenfalls veränderlich, öfters ungeſtalt, kurz, voll, von ähnlicher Farbe, oder mangelt ganz und gar.

Wächſt auf alten Baumſtöcken, faulem Holze und an den mooſigen Wurzeln der Bäume.

CCXLVI.

CCXLVI.

ELVELA CARYOPHYLLAEA. Der nelkenförmige Faltenſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXXV.

Eluela caulescens, ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; pileo infundibuliformi, ſaepe duplicato, radiatim ſtriato, fuſco, circulis concentricis, pallidioribus & obſcurioribus, margine varie inciſo & crenato; petiolo inuerſe conico, ſaepius curuato, pleno, concolore, baſi craſſiuſculo, truncato.

Reperitur in ſyluis aceroſis, inter folia deiecta putreſcentia autumnali tempore.

Der Hut dieſes Schwammes iſt trichterförmig, öfters verdoppelt, von innen heraus ſtralenweiſe geſtrichelt, braun, mit hellern und dunklern Kreiſen, am Rande verſchieden eingeſchnitten und gekerbt; der Stiel umgekehrt kegelförmig, öfters gekrümmet, voll, von ähnlicher Farbe, unten etwas dicker, abgeſtutzt.

Wird in Fichten- und Tannenwäldern, unter dem abgefallenen verfaulenden Laube zur Herbſtzeit angetroffen.

CLAVARIAE.

CCXLVII.

CLAVARIA PISTILLARIS. Der gelbe große Käulſchwamm, die Herkuleskäule.

Tom. II. Tab. CLXIX.

Clauaria ſolitaria, ſimplex, carnoſa, molliuſcula, lutea, erecta, ſuperne incraſſata, longitudinaliter plicata, plena.

Clauaria piſtillaris. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 482. n. 1622.
Clauaria ſimplex. Scop. fl. carniol. I. pag. 59. (a. b. c.)
Clauaria (*piſtillaris*) clauaeformis, ſimpliciſſima. Linn. fl. lapp. 384. fl. ſuec. I. p. 1104. II. n. 1266. ſpec. plant. I. pag. 1182. II. pag. 1651. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 1. Dalib. pariſ. 285.
Clauaria erecta, corpore ſimplici, obtuſo, integro. Gled. fung. pag. 26. n. 1.
Clauaria indiuiſa, flaueſcens, plicata. Hall. hiſt. n. 2204.
Clauaria maior, lutea. Mich. nou. gen. plant. pag. 208. tab. 87. fig. 1. Rupp. hall. p. 356.
Agaricus clauatus, flaueſcens. Rupp. fl. jen. pag. 306.
Fungoides clauatum maius. Dill. cat. gieſſ. n. 189.
Varietas in haec tabula expreſſae ſunt.
α) Clauaria *piſtillaris*, vertice truncato & varie excauato. fig. I. & IX.
Clauaria erecta craſſiſſima, luteo-fuſca, corpore ſimpliciſſimo, integro, vertice depreſſo. Gled. fung. pag. 28 n. 1. var. d.

 Clauaria

Clauaria maior, ex rufo ſordide aurea, vertice plano & nonnihil cauo. Mich. nou. gen. plant. pag. 208. tab. 87. fig. 3?

β) Clauaria *piſtillaris*, vertice truncato & rugoſo, fig. III.

γ) Clauaria *piſtillaris*, vertice truncato & rugoſo, corpore breuiori, compreſſo. fig. IIX.

δ) Clauaria *piſtillaris*, vertice obtuſo rotundato, corpore breuiori, rotundo. fig. X.

Clauaria erecta, parua, luteo-fuſca, corpore ſimpliciſſimo, integro, vertice obtuſo, tumido & rugoſo. Gled. fung. pag. 27. n. I. var. c.

Fungus clauatus, ficum referens. Buxb. enum. pl. hall. p. 132. c. fig.

ε) Clauaria *piſtillaris*, vertice obtuſo rotundato, corpore longiori, fig. IV. V. VI. VII.

Huic plurima ſynonyma ſuperius recenſita propria ſunt.

ζ) Clauaria *piſtillaris*, vertice bifido. Fig. II. Varietas monſtroſa.

Autumnali tempore in ſyluis vmbroſis ad radices arborum gignitur.

Dieſer Schwamm iſt im eigentlichſten Verſtande käulenförmig, einzeln, fleiſchig, weich, voll, abgeſchoſſen goldgelb, der Länge nach gefalten, oben entweder rundlich und ſtumpf, oder abgeſtutzt.

Man findet ihn zur Herbſtzeit in dicken Wäldern an den Wurzeln der Bäume.

CCXLVIII.

CLAVARIA ALBIDA. Der weißliche Corallenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXX.

Clauaria ramoſa, carnoſa, albida; corpore paruo, multifido, inaequali: ramis anguloſis, apice breuiter & acute dentatis.

Clauaria candida, corpore multifido, inaequali & ramoſiſſimo. Gled. fung. pag. 31. n. III. var. a.

Coralloides albidum. Tourn. Inſt. pag. 562. Mich. nou. gen. pl. pag. 209. Batarr. fung. arim. p. 22. tab. II. A. B.

Fungus ramoſus, albidus. C. Bauh. pin. pag. 371. I. Bauh. hiſt. III. pag. 837.

Fungorum eſculentorum genus XIX. ſpec. 3. Cluſ. hiſt. pag. CCLXXV.

Auguſto & Septembri in ſyluis reperitur.

Die Farbe dieſes Corallenſchwamms iſt weißlich. Seine Aeſte ſind eckig, an den Enden mit kurzen, dünnen, ſcharfen Spitzen verſehen. Der Körper iſt geringe.

Man findet ihn in den Wäldern im Auguſt und September.

CCXLIX.

CLAVARIA LIGVLA. Der dünne gelbe Käulſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXI.

Clauaria ſimplex, plerumque ſolitaria, carnoſa, mollinſcula, lutea, erecta, ſuperne incraſſata, inferne gracilis, elongata, intus plena.

α) Clauaria minor, lutea, corpore ſimpliciſſimo, gracili, integro & obtuſo. Gled. fung. pag. 28. n. I. var. f.

Clauaria lutea, minima. Mich. nou. gen. plant. pag. 203. tab. 87. fig. 5. Rupp. hall. p. 357.
Fungoides clauatum, minus. Dill. cat. gieſſ. pag. 189.
Fungi parui, lutei, ad ophiogloſſoides nigrum accedentes. Rai. ſynopſ. edit. II.
β) Clauaria luteo-rufa, corpore integro, ſimpliciſſimo, tenuiſſimo & longiſſimo. Gled. fung. 29. n. I. var. h.
Clauaria rufeſcens, triuncialis, tenuiſſima. Mich. nou. gen. plant. pag. 208. tab. 87. fig. 7.
Autumno inter folia deiecta, putreſcentia, inter muſcos & in lignis putridis gignitur.

Dieſer Schwamm iſt käulenförmig, meiſtens einzeln, fleiſchig, weich, voll, abgeſchoſſen goldgelb, lang, dünn, oben rundlich, oder abgeſtutzt.

Wächſt im Herbſte unter dem abgefallenen faulenden Laube, unter dem Mooſe und auf faulem Holze.

CCL.

CLAVARIA PVRPVREA. Der purpurfärbige Corallenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXII.

Clauaria ramoſa, carnoſa, purpuraſcens; corpore paruo, multifido, inaequali: ramis planiuſculis, ſulcatis, apice compreſſis, breuiter & obtuſe dentatis.

Clauaria palmata. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 483. n. 1624.
Clauaria ramoſa, ramis compreſſis. Scop. fl. carniol. I. p. 60.
Clauaria caule plano, ſulcato; ramis ſerratis. Hall. hiſt. n. 2200.
Clauaria purpurea, corpore multifido, inaequali & ramoſiſſimo, in apices graciles terminato. Gled. fung. pag. 32. n. III. var. c.
Coralloides amethyſtina. Batarr. fung. arim. p. 22. tab. I. C.
Coralloides ramoſum ex rufo carneum platyceron ſeu latis cornubus, apicibus breuioribus. Mich. nou. gen. plant. pag. 209. tab. 88. fig. 3.
Coralloides violaceum, ramis planis palmatis. Hall. enum. helu. p. 16. Rupp. hall. p. 357. Berg. viadr. pag. 371.
Coralloides minor criſtata. Buxb. cent. IV. pag. 39. tab. 66. fig. 1.
In ſyluis arenoſis decliuibus, ad radices arborum ſero autumno prouenit.

Die Farbe dieſes Corallenſchwammes iſt blaß purpurfärbig oder violet. Seine Aeſte ſind platt, gerieft, an den Enden zuſammen gedrückt, mit kurzen, ſtumpfen Spitzen verſehen. Der Körper iſt geringe.

Wächſt in abhängigen, ſandigen Wäldern an den Wurzeln der Bäume zur Herbſtzeit.

CCLI.

CLAVARIA CORNICVLATA. Der gehörnte gelbe Corallenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXIII.

Clauaria ramoſa, carnoſa, duriuſcula, aurea; corpore paruo, multifido, inaequali: ramis teretibus, flexuoſis, gracilibus, apice acute dentatis, incuruis.

Clauaria caule ramoſo, ramis incuruis acutis. Hall. hiſt. n. 2199.
Clauaria (*muſcoides*) ramis ramoſis acuminatis inaequalibus luteis. Linn. fl. ſuec. I. n. 1108. II. n. 1270. ſpec. plant. I. pag. 1183. II. pag. 1652. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 8.

Clauaria ramis paucioribus, laxioribus, longioribus. Reyger. fl. gedan, pag. 180.
Fungus paruus ramoſus luteus. Rai. ſyn. III. p. 16. tab. 24. fig. 7.
Creſcit in ſyluis inter muſcos ad arborum radices autumnali tempore.

Dieſer Corallenſchwamm iſt goldgelb. Seine Aeſte ſind rundlich, dünn, gebogen, an den Enden mit gekrümmeten, ſcharfen Spitzen verſehen. Der Körper iſt geringe.
Wächſt im Herbſte in den Wäldern unter dem Mooſe an den Wurzeln der Bäume.

CCLII.

CLAVARIA FLAMMEA. Der feuerfärbige Corallenſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXIV.

Clauaria ramoſa, carnoſa, mollis, viſcida, aurea; corpore paruo, tenuiori, multifido, inaequali: ramis craſſiuſculis, teretibus, erectiuſculis, apice breuiter & acute dentatis.

Creſcit inter folia deiecta & in lignis putridis autumnali tempore.

Dieſer Schwamm iſt feuerfarb, weich, fleiſchig, ſchleimig. Deſſen Aeſte ſind dick, rundlich, faſt gerad, mit kurzen Spitzen an den Enden. Hat faſt gar keinen Körper.
Wächſt unter dem abgefallenem Laube und auf faulem Holze zur Herbſtzeit.

CCLIII.

CLAVARIA FLAVA. Der gelbe Corallenſchwamm, *vulgo* gelber Geißbart, Händelſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXV.

Clauaria ceſpitoſa, ramoſa, carnoſa, mollis, flaua; corpore craſſo, multifido, inaequali: ramis teretibus, erectiuſculis, ramoſis, confertis, apice breuiſſime & acute dentatis.

Clauaria Coralloides. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 483. n. 1625.
Clauaria caule craſſiſſimo, ramis innumerabilibus, ceſpitoſis, breuiter dentatis. Hall. hiſt. n. 2201. var. α.
Clauaria ramoſa; ramis teretibus erectis. Scop. fl. carniol. I. pag. 60. n. 4. (a).
Clauaria corpore multifido, inaequali & ramoſiſſimo, in apices graciles terminato. Gled. fung. pag. 31. n. III.
Clauaria (*Coralloides*) ramis confertis, ramoſiſſimis, inaequalibus. Linn. fl. lapp. 385. fl. ſuec. I. n. 1106. II. n. 1268. ſpec. pl. I. p. 1182. II. p. 1652. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 6. Dalib. pariſ. 386.
Coralloides flauum. Tourn. inſt. p. 562. t. 332. β. Mich. nou. gen. plant. pag. 209. n. 1. Rupp. fl. jen. p. 306. Berg. viadr. p. 370. Batarr. fung. arim. p. 22.
Corallo-fungus flauus. Vaill. pariſ. p. 41. tab. 8. fig. 4.
Fungoides coralliforme. Dill. cat. gieſſ. p. 190.
Fungus ramoſus veſcus XIX. Loeſ. pruſſ. p. 88.

Fungus ramoſus flauus. I. Bauh. hiſt. III. p. 837.
Fungus ramoſus & Imperati. C. Bauh. pin. p. 371. var. 1.
Fungi digitelli. Schwenkf. cat. ſtirp. ſil. p. 79.
Fungorum eſculentorum genus XIX. ſpec. I. Cluſ. hiſt. p. CCLXXIV.
Barba caprina. Sterb. theatr. fung. p. 97. tab. XI. C. D.
Manina. Adanſon. fam. pl. pag. 5.
In ſyluis & ericetis aeſtate & autumno frequens occurrit, & ad forum a vetulis ruſticis portatur.

Nota: Synonyma pleraque hactenus recenſita pluribus noſtrorum communia ſunt.

Dieſer Schwamm iſt abgeſchoſſen zitronengelb, weich, fleiſchig. Seine Aeſte ſind rundlich, faſt gerade, wieder in Aeſte zertheilt, an den Enden mit kurzen, ſcharfen Spitzen. Hat unten einen dicken Körper und wächſt buſchig beyſammen.

Man findet ihn häufig im Sommer und Herbſte in den Wäldern und auf Heyden, und bringen ihn die Bauerweiber zu Markte.

CCLIV.

CLAVARIA ACROPORPHYREA. Der weißliche Corallenſchwamm mit purpurfärbigen Spitzen.

Tom. II. Tab. CLXXVI.

Clauaria ſolitaria, ramoſiſſima, carnoſa, mollis, albida; corpore craſſo, tuberoſo, multifido, inaequali: ramis teretibus, craſſis, erectiuſculis, ramoſis, confertis, apice breuiſſime & obtuſe dentatis, purpuraſcentibus.

Clauaria caule craſſiſſimo, ramis innumerabilibus, ceſpitoſis, breuiter dentatis. Hall. hiſt. n. 2201. var. β.
Clauaria candida, corpore multifido, inaequali & ramoſiſſimo, in apices graciles, dilute purpureos terminato. Gled. fung. pag. 32. n. III. var. c.
Coralloides album, corniculis dilute purpureis. Mich. nou. gen. plant. pag. 209. n. 9.
In collibus herbidis & vmbroſis ſyluarum ad radices arborum autumno creſcit.

Dieſer Schwamm iſt weißlich, oder ganz blaßgelb, auch etwas fleiſchfärbig, weich, fleiſchig. Seine Aeſte ſind rundlich, dick, faſt gerade, wieder in Aeſte zertheilt, an den Enden mit ſehr kurzen, ſtumpfen, blaßpurpurfärbigen Spitzen. De Körper iſt dick, knollig.

Wächſt auf graſigten und ſchattigten Hügeln an den Wurzeln der Bäume zur Herbſtzeit.

CCLV.

CLAVARIA RVBELLA. Der röthliche Corallenſchwamm, *vulgo* der rothe Geißbart, Händelſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXVII.

Clauaria ſolitaria, ramoſiſſima, carnoſa, mollis, rubella; corpore craſſo, multifido, inaequali; ramis teretiuſculis, erectiuſculis, ramoſis, confertis, apice breuiter dentatis.

Clauaria

Clauaria caule craſſiſſimo, ramis innumerabilibus, ceſpitoſis, breuiter dentatis. Hall. hiſt. 2201. var. γ.

Clauaria purpurea, corpore multifido, inaequali & ramoſiſſimo, in apices graciles terminato. Gled. fung. pag. 32. n. III. var. d.

Clauaria corpore dilute rufeſcente, multifido & ramoſo, in apices graciles terminato. Ibid. var. e.

Coralloides dilute purpuraſcens. Tourn. inſt. pag. 562. Mich. nou. gen. plant. pag. 209. n. 3.

Coralloides dilute rufeſcens. Ibid. n. 4.

Fungorum eſculentorum genus XIX. ſpec. 2. Cluſ. hiſt. p. CCLXXV.

In ſyluis arenoſis, aceroſis, decliuibus, ad arborum radices obuius eſt ſero autumno.

Dieſer Schwamm iſt röthlich oder blaß purpurfarb, weich, fleiſchig. Seine Aeſte ſind rundlich, faſt gerade, in Aeſtgen zertheilt, an den Enden mit kurzen Spitzen verſehen. Hat unten einen dicken Körper und iſt ſehr buſchig.

Man findet ihn im ſpäten Herbſte in ſandigen, abhängigen Nadelwäldern an den Wurzeln der Bäume.

CCLVI.

CLAVARIA FLAVESCENS. **Der gelbliche Corallenſchwamm mit dickem faſt knolligem Körper.**

Tom. III. Tab. CCLXXXV.

Clauaria ſolitaria, ramoſiſſima, carnoſa, mollis; corpore craſſo, tuberoſo, multifido, inaequali, albido: ramis teretiuſculis, erectiuſculis, ramoſis, confertis, flaueſcentibus, apice breuiſſime & acute dentatis.

Clauaria arbuſcula. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 484. n. 1626.

Clauaria caule craſſiſſimo, ramis innumerabilibus, ceſpitoſis, breuiter dentatis. Hall. hiſt. n. 2201. var. α.

Clauaria ramoſa; ramis teretibus erectis. Scop. fl. carniol. I. pag. 60. n. 4. (b. c.)

Et pleraque Synonyma Clauariae flauae n. CCLIII. huic communia ſunt.

Cum Clauaria flaua & reliquis coralloidibus occurrit.

Dieſer Schwamm unterſcheidet ſich von dem gelben Corallenſchwamm auf der 175ſten Kupfertafel durch die blaſſere Farbe und den dickern knolligen Körper.

Wird mit dem gelben und übrigen Corallenſchwämmen angetroffen.

CCLVII.

CLAVARIA PALLIDA. **Der bleiche Corallenſchwamm.**

Tom. III. Tab. CCLXXXVI.

Clauaria ſolitaria, ramoſiſſima, carnoſa, mollis, pallida; corpore craſſo, tuberoſo, multifido, inaequali: ramis teretiuſculis, erectiuſculis, ramoſis, confertis, apice breuiſſime & obtuſe dentatis.

Differt

Differt a praecedenti colore pallidiore, dentibus ramulorum extimorum obtuſis. Cum praecedente reperitur.

Vom vorhergehenden unterſcheidet ſich dieſer Schwamm durch die ganz bleiche Farbe und die ſtumpfen Spitzen der äuſſerſten Aeſtgen.

CCLVIII.

CLAVARIA AVREA. Der goldgelbe Corallenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXXVII.

Clauaria ſolitaria, ramoſiſſima, carnoſa, mollis; corpore craſſo, tuberoſo, multifido, inaequali, albido; ramis teretiuſculis, erectiuſculis, ramoſis, confertis, aureis, apice breuiſſime & acute dentatis.

A flaueſcente n. CCLVI. vix niſi colore ſaturatiore differt.

Iſt von dem gelblichen Corallenſchwamme n. CCLVI. faſt durch nichts, als die dunklere Farbe unterſchieden.

CCLIX.

CLAVARIA RVFESCENS. Der rothbräunliche Corallenſchwamm, mit röthlichen Spitzen.

Tom. III. Tab. CCLXXXVIII.

Clauaria ſolitaria, ramoſiſſim, carnoſa, mollis, rufeſcens; corpore craſſo, tuberoſo, multifido, inaequali; ramis teretibus, erectiuſculis, ramoſis, confertis; apice breuiſſime & obtuſe dentatis.

A Clauaria acroporphyrea n. CCLIV. tab. CLXXVI. vix differt, niſi colore.

Iſt von dem weißlichen Corallenſchwamme, mit purpurfärbigen Spitzen n. CCLIV. auf der 176ſten Kupfertafel faſt durch nichts als die Farbe verſchieden.

CCLX.

CLAVARIA CORNVTA. Der gehörnte goldgelbe Corallenſchwamm.

Tom. III. Tab. CCLXXXIX.

Clauaria ſolitaria, ramoſa, carnoſa, duriuſcula, aurea; corpore craſſo, tuberoſo, ſquamoſo, multifido, inaequali: ramis teretibus, erectiuſculis, elongatis, rugoſis, tuberculoſis, rarioribus, apice ſubbifidis obtuſiuſculis.

Clauaria rugoſa & tuberculoſa, ramis obtuſis. Hall. hiſt. n. 2202. var. β.
In ſyluis autumno ad truncos arborum reperitur.

Dieſer Schwamm iſt goldgelb, fleiſchig, etwas hart. Die einzelnen Aeſte deſſelben ſind rundlich, länglich, faſt gerade, runzelich, mit kleinen Knötgen beſetzt, an den Enden meiſtens

meiſtens zweyſpaltig, mit etwas ſtumpfen Spitzen, ſo daß ſie faſt die Figur eines Hirſchgeweyhes haben.

Wird im Herbſte in den Wäldern an den alten Baumſtöcken gefunden.

CCLXI.

CLAVARIA GEMMATA. Der knotigte weißgelbe Käulſchwamm, oder Herkuleskäule.

Tom. III. Tab. CCXC.

Clauaria ſimplex, ſolitaria, carnoſa, duriuſcula, flauo-albida, erecta, ſuperne incraſſata, tuberculoſa, quaſi gemmata, longitudinaliter ſubplicata, plena.

Clauaria (*militaris*) clauata integerrima, capite ſquamoſo. Guettard. ſtamp. 1. pag. 8. Dalib. par. 385. Linn. ſpec. plant. I. pag. 1182. II. pag. 1652. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 2?
Clauaria militaris crocea. Vaill. pariſ. p. 39. tab. 7. fig. 4?
In ſyluis ad radices arborum rarius reperitur.

Dieſer Schwamm iſt eigentlich käulenförmig, einzeln, fleiſchig, etwas hart, voll, gelblich weiß, oben rundlich, gleichſam wie mit Edelgeſteinen beſetzt, an der Seite etwas weniges gefalten.

Man findet ihn im Herbſte, aber etwas ſelten, in den Wäldern an den Wurzeln der Bäume.

CCLXII.

CLAVARIA LACINIATA. Der geſpaltene Käulſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXCI.

Clauaria ſimplex, ſolitaria, parum carnoſa, mollis, e fuſco-albida, erectiuſcula, ſuperne incraſſata, laciniata, ſaepius criſpa, plena.

In ſyluis autumno cum ceteris rarius reperitur.

Dieſer Schwamm iſt bräunlich weiß, einzeln, wenig fleiſchig, weich, oben dicker, geſpalten, öfters krauß, voll.

Wird im Herbſte, aber etwas ſeltener, mit den übrigen in den Wäldern angetroffen.

CCLXIII.

CLAVARIA DIGITELLVS. Der gelbliche Käulſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCXCII.

Clauaria ceſpitoſa, ſimplex & ramoſa, carnoſa, duriuſcula; corpore vniuerſali craſſo, ſubgloboſo, multifido, inaequali, fuſco; corporibus partialibus, ſeu ramis ſingulis teretiuſculis, integris, curuulis, obſolete aureis, ſeu fuluis, apice obtuſis.

Clauaria

Clauaria lutea & humilis, ex vna baſi multiplex, corpore obtuſo & breui. Gled. fung. p. 30. n. III. var. I.
Clauaria ceſpitoſa, media lutea. Mich. nou. gen. plant. pag. 208. tab. 87. fig. 11?
In ſyluis aceroſis ſiccioribus ad truncos arborum annoſarum viget Septembri & Octobri.

Dieſer Schwamm wächſt buſchig, einfach und äſtig, iſt fleiſchig, etwas hart, voll. Der untere Körper iſt dick, braun, die einzelnen Körper oder Aeſte ſind rundlich, länglich, etwas gekrümmt, abgeſchoſſen goldgelb, oben ſtumpf.

Wächſt im September und October in trockenen Nadelwäldern an den Stämmen alter Bäume.

CCLXIV.

CLAVARIA OPHIOGLOSSOIDES. Der ſchwarze Käulſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXXVII.

Clauaria ſubſolitaria, ſimplex, carnoſa, duriuſcula, nigra, ſuperne incraſſata, inferne teres, gracilis, intus plena.

Clauaria indiuiſa, nigra, compreſſa. Hall. hiſt. n. 2206.
Clauaria nigra, corpore ſimpliciſſimo, breui, nonnihil rugoſo, in baſin tenuiſſimam longiſſime producto. Gled. fung. pag. 29.
Clauaria (*ophioglosſoides*) clauata, integerrima, compreſſa, obtuſa. Guett. ſtamp. 1. pag. 8. Dalib. pariſ. 386. Linn. ſpec. plant. I. pag. 1182. II. pag. 1652. ſyſt. nat. XX. pag. 725. n. 3.
Clauaria ophiogloſſoides, nigra. Vaill. pariſſ. pag. 30. tab. 9. fig. 3. Mich. nou. gen. plant. pag. 208. tab. 87. fig. 4.
Fungus ophiogloſſoides. Rai. ſynd. III. p. 14. n. 5.
Muſcus clauatus ceranoides, nigredine ſplendens. Plux. phyt. tab. 47. fig. 3.
In montibus ceſpitoſis & ſyluoſis autumni initio pullulat.

Der ganze Schwamm iſt glänzend ſchwarz, oben käulenförmig, unten dünne, fleiſchig, etwas hart, voll, etwa einen bis zwey Zoll lang.

Iſt zu Anfang des Herbſtes auf waldigen Bergen anzutreffen.

CCLXV.

CLAVARIA HYPOXYLON. Der ſchwärzliche Holzkäulſchwamm, mit weißlichen Spitzen.

Clauaria ceſpitoſa, ſimplex & ramoſa, carnoſa, duriuſcula, nigra, ſuperne acuminata, quandoque bifida, inferne teretiuſcula, compreſſa, erectiuſcula, apicibus albidis.

Clauaria (*Hypoxylon*) ramoſo-cornuta, compreſſa. Linn. fl. ſuec. I. n. I. n. 1105. II. n. 1267. ſpec. plant. I. pag. 1182. II. pag. 1652. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 5.
Valſa digitata. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 398. n. 1413.

Q 2 Sphaeria

Sphaeria nigerrima, aſpera, palmata; cornubus carnoſis, puluerulentis. Hall. hiſt. n. 2194. var. β.

Lichenagaricus digitatus, niger; apicibus albo-rufis, ſeminibus griſeis vndique conſperſus. Mich. nou. gen. plant. pag. 104. n. 4. tab. 54. fig. 5. in capite tabulae.

Coralloides digitatum, nigrum; apicibus albidis. Tourn. inſt. pag. 565. Petiu. gazou. tab. 62. fig. 12.

Fungus ramoſus niger, compreſſus, paruus; apicibus albidis. Rai. ſyn. III. pag. 15. n. 8.

In deiectis & putridis arborum truncis; carioſisque aſſeribus & inter folia decidua quandoque creſcit.

Dieſer Schwamm iſt rußig ſchwarz, oben zugeſpitzt, weißlich, fleiſchig, etwas hart. Seine Wurzeln laufen tief zwiſchen der Rinde und dem Holze herum, auch wohl ſelbſt in das Holz hinein.

Wächſt auf niedergeworfenen faulen Baumſtöcken, wurmſtichigen Brettern und unter dem abgefallenem Laube.

PEZIZAE.

CCLXVI.

PEZIZA HIRSVTA. Der rauhe braune Becherſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXVIII.

Peziza ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; cyatho inuerſe conico, extus fuſco, hirſuto: intus plumbeo, ſtriato, glabro, ſplendente.

Peziza cyathiformis. Scop. fl. carn. II. P. II. pag. 486. n. 1629. qui hanc & ſequentem ſericeam coniungit.

Peziza ſeſſilis, campanulata. Scop. fl. carn. I. pag. 57. n. 1.

Peziza ſeſſilis, companulata, extus piloſa & fuſca, intus ſtriata. plumbea, glabra. Gled. fung. pag. 138. n. I. var. a.

Peziza *(lentifera)* campanulata lentifera. Linn. ſpec. plant. I. pag. 1180. II. pag. 1649. fl. ſuec. II. n. 1271. ſyſt. nat. XII. pag. 725. n. 1.

Peziza calyce campanulato. Linn. hort diff. n. 479. Rog. lugdb. 518. plures comprehendit.

Peziza calyciformis, lentifera, hirſuta. Dill. cat. gieſſ. 196. Berg. viadr. pag. 371.

Cyathus hirſutus, intus ſtriatus. Hall. hiſt. n. 2214.

Cyathoides cyathiforme, obſcurum, externe hirſutum, interne plumbeum, glabrum & ſtriatum. Mich. nou. gen. plant. pag. 222. tab. 102. fig. 2.

Fungoides ſyluaticum hirſutum & fuſcum. Rupp. fl. jen. pag. 303.

Fungoides infundibuliforma, ſemine foetum, interne ſtriatum, externe hirſutum. Vaill. pariſ. p. 57. tab. II. fig. 4. 5.

Fungus ſeminifer, externe hirſutus, interne ſtriatus. Rai. hiſt. III. p. 21.

Fungus

Fungus ſpermaticus calyculatus. Bocc. muſ. p. 301. fig. 1.
Fungus non veſcus XLI. Loeſ. pruſſ. pag. 90. tab. 16. n. 16. fig. inf.
Icon. Oed. fl. Dan. tab. CV.
In ſyluis inter muſcos, in arboribus moribundis & in hortis ac pomariis ad varias arbores & plantas autumno occurrit.

Der Becher dieſes Schwammes iſt umgekehrt kegelartig, auſſen haarig, braun, innen geſtreift, glatt, glänzend, bleyfarb, mit weißlichen Linſen.

Wächſt in Wäldern unter dem Mooſe, an alten Bäumen, auch in Gärten an verſchiedenen Bäumen und Pflanzen zur Herbſtzeit.

CCLXVII.

PEZIZA CRUCIBULIFORMIS. Der gelbe ſchmelztiegelförmige Becherſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXIX.

Peziza ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; cyatho inuerſe conico, glabro, luteo, ſuperne marginato.

Peziza crucibuliformis. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 486. n. 1630.
Peziza ſeſſilis, campanulata, exigua, aurea & glabra. Gled. fung. pag. 138. n. I. var. b.
Cyathoides luteum, crucibuliforme. Mich. nou. gen. plant. pag. 222. tab. 102. fig. 3.
In lignis putridis & humectatis vere & autumno occurrit.

Der Becher dieſes Schwammes iſt umgekehrt kegelartig, glatt, gelb, oben mit einem Rande verſehen, innen mit gelblichen Linſen.

Man trift ihn im Frühjahre und Herbſte auf faulem, feuchtem Holze an.

CCLXVIII.

PEZIZA SERICEA. Der graue ſeidenartige Becherſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXX.

Peziza ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; cyatho inuerſe conico, ſubtomentoſo, griſeo, ſuperne marginato.

Peziza cyathiformis. Scop. loc. cit.
Peziza ſeſſilis, corpore campanulato, integerrimo. Gled. fung. pag. 137. n. I.
Peziza (*lentifera*). Linn. l. cit.
Peziza calyciformis, lentifera, laeuis. Dill. cat. gieſſ. 195. Berg. viadr. pag. 371.
Cyathus ſericeus, intus laeuis. Hall. hiſt. n. 2215.
Cyathoides cyathiforme, cinereum & veluti ſericeum. Mich. nou. gen. plant. pag. 222. tab. 102. fig. 1.
Fungoides vulgatiſſimum. Rupp. flor. jen. pag. 303.
Fungoides infundibuli forma, ſemine foetum. Tourn. inſt. pag. 560. Vaill. pariſ. pag. 56. tab. 11. fig. 6. 7.

Fungus pyxioides, ſeminifer. Loeſ. pruſſ. pag. 90. tab. 16. fig. ſup.
Fungus minimus, ſine petiolo, perniciofus. I. Bauh. hiſt. III. pag. 847.
Fungus minimus, ligneis tabulis areolarum hortorum adnaſcens. C. Bauh. pin. pag. 514.
Fungus minimus anonymos. Cluſ. hiſt. pag. CCLXXXVII.
In ſyluis, hortis, pomariis, vinetis, lignisque putridis vere & autumno pullulat.

Der Becher dieſes Schwammes iſt umgekehrt kegelartig, ſeidenartig, rauh, grau, oben mit einem Rande verſehen, innen mit weißlichen Linſen.

Wächſt im Frühjahre und Herbſte in Gärten, Wäldern, Weinbergen auf faulem Holze.

CCLXIX.

PEZIZA OLLARIS. Der topfförmige Becherſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXXI.

Peziza ſolitaria & ceſpitoſa, coriacea; cyatho turbinato, glabro, medio ventricoſo, ſuperne marginato, extus griſeo, intus flauido.

In lignis putridis cum praecedentibus occurrit.

Dieſes Schwammes Becher iſt kräuſelförmig, glatt, in der Mitte bauchig, oben mit einem Rande verſehen, auſſen grau, innen gelblich, mit gelblichen Linſen.

Man trift ihn mit den vorhergehenden auf faulem Holze an.

LYCOPERDA.

CCLXX.

LYCOPERDON STELLATVM. Der geſtirnte Staubſchwamm, Sternboviſt.

Tom. II. Tab. CLXXXII.

Lycoperdon volua craſſa, coriacea, multifida, patente, rufo-carnea; capitulo globoſo, ſeſſili, glabro, fuſco-caeruleſcente: ore acuminato, dentato.

Lycoperdon ſtellatum. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 489. n. 1633.
Lycoperdon volua multifida, patente, coriacea, inflexa; capitulo glabro, globoſo, ſeſſili; ore acuminato dentato. Scop. fl. carniol. I. p. 63. n. 2. (a).
Lycoperdon cortice exteriori reuoluto, ſtellato. Hall. hiſt. n. 2174.
Lycoperdon globoſum & ſeſſile; volua radiata, patente; ore acuminato, dentato. Gled. fung. pag. 151. n. V.
Lycoperdon (*ſtellatum*) volua multifida, patente, capitulo glabro: ore acuminato dentato. Linn. hort. diff. pag. 479. fl. ſuec. I. n. 1113. II. n. 1277. ſpec. plant. I. p. 1184. II. p. 1653. ſyſt. nat. XII. p. 726. n. 5. Dalib. pariſ. 390. Ray. lugdb. 519.
Lycoperdon ſtellatum, calyce inuerſo. Buxb. cent. II. p. 45. tab. 49. fig. 3.
Geaſter maior & medius, vmbilico fimbriato. Mich. non. gen. plant. p. 220. tab. 100. fig. 1. 3.

Fungus

Fungus puluerulentus, crepitus lupi dictus, coronatus & inferne ſtellatus. Rai. ſyn. II. p. 16. n. 19. III. pag. 27. f. 1. 2. 3.
Fungus ſtellatus. Bocc. muſ. I. tab. 305. fig. 4.
Icon Oed. fl. dan. tab. CCCLX.
In ſyluis montoſis, herbidis & muſcoſis ad arborum radices autumno & vere occurrit.

Dieſer Schwamm iſt rund, glatt, bräunlich blaulich, mit ſpitzigen Zähnen um die Mündung, ſitzet ohne Stiel auf einem vielſpaltigen, ausgebreiteten, lederhaften, bräunlich fleiſchfärbigen Afterepe.

Man findet ihn in bergigen, kräuterreichen, mooſigen Wäldern an den Wurzeln der Bäume im Frühjahre und Herbſte.

CCLXXI.

LYCOPERDON CORONATVM. Der kronförmige Sternboviſt.

Tom. II. Tab. CLXXXIII.

Lycoperdon volua coriacea, ſubquadrifida, duplici, albida: exteriori ſeſſili, patente: interiori ſeparata, eleuata, reflexa, apicibus cum exteriori cohaerente; capitulo globoſo, breuiter petiolato, punctato, griſeo - caeruleſcente: ore acuminato, dentato.

Lycoperdon coronatum. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 490. n. 1634.
Lycoperdon volua multifida, cartilaginea, patente, reflexa; capitulo glabro, ſtipitato, oblongo: ore coronato, acuminato, dentato. Scop. fl. carniol. I. pag. 64. (b). accedit.
Lycoperdon petiolatum, globoſum, aſperum & paruum, volua radiata: patente, ore denticulis coronato. Gled. fung. pag. 152. n. V. var. a.
Geaſter aſper, paruus; vmbilico coronato; pediculo perbreui donatus. Mich. nou. gen. plant. pag. 223. n. 3. tab. 100. fig. 2.
Geaſteroides phragmites, fuſcum, e volua erumpens, quatuor radiis eleuatum, curioſum, Abb. Marattae. Batarr. fung. arim. pag. 74. tab. XXXIX. fig. 1. 2. 3. 4. 5.
Autumno in ſyluis muſcoſis quandoque occurrit.

Dieſer Schwamm iſt klein, rundlich, gedippelt, blaulich grau, mit ſpitzigen Zähnen um die Mündung, ſitzet auf einem ſehr kurzen Stiele auf einem meiſt vierſpaltigen, lederhaften, weißlichen doppelten Afterepe, deſſen äuſſerſter Theil unten ſitzen bleibt, der innere aber an den Enden des äuſſern hängen bleibet, ſich ſammt der darauf ſitzenden Kugel aufwärts biegt und alſo gleichſam eine Krone vorſtellet.

Wird zuweilen im Herbſte in mooſigen Wäldern angetroffen.

CCLXXII.

LYCOPERDON PAPILLATVM. Der warzigte weißliche Staubſchwamm, ſonder Stiel.

Tom. II. Tab. CCLXXXIV.

Lycoperdon acaule, depreſſo-globoſum, albidum, papillatum; papillis ſubconicis, obtuſis, pallide ochraceis.

Lyco-

Lycoperdon polymorphum. Scop. fl. carn. II. P. II. pag. 487. n. 1631.
Lycoperdon ſaccatum, cinereum, polline obſcure viridi, *verrucoſum*, *verrucis non mucronatis*, *ſeſſile*, *capite in transuerſum lato*. Hall. hiſt. n. 2172. var. A. β. III.
Lycoperdon *(Bouiſta)* ſubrotundum, lacerato-dehiſcens. Linn. fl. lapp. 525. fl. ſuec. I. n. 1115. II. n. 1280. ſpec. plant. I. pag. 1183. II. pag. 1653. ſyſt. nat. XII. pag. 726. n. 3. Dalib. pariſ. 388. Rai. lugdb. 518. Scop. fl. carn. I. pag. 62. n. 1. quo nomine plures noſtrorum comprehenduntur.
Lycoperdon ſeſſile. capite in transuerſum lato. Vaill. pariſ. tab. 16. fig. 5. 6.
In paſcuis elatioribus ſyluaticis & ericetis viget Auguſto & Septembri.

Dieſer Schwamm iſt gedrückt kugelig, weißlich, ohne Stiel, mit blaßbräunlichen, ſtumpfen Warzen beſetzt, innen mit einem grünlich gelben Marke.

Wächſt im Auguſt und September auf bergigen, waldigen Viehtrieften und Heiden.

CCLXXIII.

LYCOPERDON PYRIFORME. Der birnförmige Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CCLXXXV. & Tom. III. Tab. CCXCIII.

Lycoperdon cauleſcens, turbinatum, ſordide album; corpore depreſſo-globoſo, ſubhirſuto, faſtigiato; petiolo inuerſe conico, breui, pleno.

Lycoperdon ſaccatum, cinereum, polline obſcure viridi, *leue*, *collo breui*, *minimum transverſim latum*. Hall. hiſt. n. 2172. var. B. V.
Lycoperdon minimum, transuerſim latum, laeue. Vaill. pariſ. tab. 16. fig. 9.
Cum praecedente reperitur.

Dieſer Schwamm iſt birnförmig, ſchmutzig weiß, etwas haarig, oben flach kugelig, in der Mitte zugeſpitzt, mit einem umgekehrt kegelartigen, kurzen, vollen Stiele.

Wird mit dem vorhergehenden angetroffen.

CCLXXIV.

LYCOPERDON ECHINATVM. Der ſtachlichte weiſſe Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXXVI.

Lycoperdon acaule, depreſſo-globoſum, album, echinatum; cuſpidibus quadrangularibus, quadrifidis; baſi breuiſſima.

Lycoperdon ſaccatum, cinereum, polline obſcure viridi, *pyramidalibus verrucis exaſperatum*, *collo aliquo*. Hall. hiſt. n. 2172. var. A. II.
Lycoperdon globoſum, ſeſſile & candidum, cortice exteriore in cuſpides ſubulato-dentatas rigidiuſculas & quadripartitas ſoluto. Gled. l. cit. var. h.
Lycoperdon eſculentum album, paruum, cortice primario in adamantinas cuſpides, veluti pentagonas, & quadripartitas ſecto. Mich. nou. gen. plant. p. 218. n. 12. item
Lycoperdon eſculentum, hemiſphaericum, album, cortice primario in adamantinas cuſpides fere pentagonas ſoluto. Ibid. pag. 219. n. 15.

Lycopere

Lycoperdon eſculentum, album, globoſum, aculeis craſſioribus, quadrilateris, & quadripartitis muntium. Ibid. n. 16.

Lycoperdon, Sparganii fructus facie. Iohren. bot. francoſ. p. 183.

Reperitur vere & autumno in paſcuis ſiccis, elatioribus, ſyluaticis & ericetis.

Dieſer Schwamm iſt gedrückt kugelig, weiß, ohne wahren Stiel, aber mit einem kurzen Unterſatze, mit eckigen Spitzen über und über beſetzt.

Wird im Frühjahre und Herbſte auf trockenen, bergigen, waldigen Viehtriften und Heiden gefunden.

CCLXXV.

LYCOPERDON EXCIPVLIFORME. Der diſtillirkolbenförmige Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXXVII. & Tom. III. Tab. CCXCII. & CCXCV.

Lycoperdon cauleſcens, turbinatum, albidum, ſubhirſutum; corpore ſubgloboſo; petiolo tereti, corpori continuo, craſſo, pleno baſi quandoque.

Lycoperdon excipuliforme. Scop. fl. carn. II. P. II. pag. 488. n. 1631. var. 4.

Lycoperdon ſaccatum, cinereum, polline obſcure viridi, *verrucoſum*, *verrucis non mucronatis*, *leue*, *collo longo*. Hall. hiſt. n. 2172. var. A. β. 1. & B. 1.

Lycoperdon pyriforme, cinereum. Batarr. fung. arim. pag. 65. tab. 31. fig. E.

Lycoperdon turbinatum, candidum, aſperum; baſi oblonga, craſſiſſima, criſpa. Gled. fung. p. 147. var. I. Scop. fl. carn. I. p. 62. (d).

Lycoperdon album, aſperum, leuiter faſtigiatum, baſi altiore & criſpa donatum. Mich. nou. gen. plant. p. 217. n. 6.

Lycoperdon excipuli chymici forma. Vaill. pariſ. p. 123. tab. 22. fig. 15.

Lycoperdon verrucoſum ſphaericum, pedunculo donatum, e flauo ruſeſcens, punctulis fuſcis notatum. Vaill. l. c. tab. 16. fig. 7.

Fungus lupinus, cucurbitinus, ceruice longa, ſcabra, griſea. Bocc. muſ. I. pag. 306.

In ſyluis ad radices arborum gignitur autumnali tempore.

Dieſer Schwamm iſt birnförmig, weißlich, rauh, mit einem kugeligen Körper und einem dicken, walzenförmigen, voll, mit dem Körper in einem fortgehenden Stiele.

Wächſt in den Wäldern an den Wurzeln der Bäume zur Herbſtzeit.

CCLXXVI.

LYCOPERDON SPADICEVM. Der braune Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXXVIII.

Lycoperdon acaule & cauleſcens, ſpadiceum; corpore depreſſo-globoſo, punctato, centro ſaepe faſtigiato; petiolo tereti, pleno, ochroleuco, baſi tuberoſo, radicato, vel nullo.

Lycoperdon ſaccatum &c. *laeue*, *minimum*, *ſpadiceum*. Hall. hiſt. n. 2172. var. B. V.

Cum reliquis autumno reperiundum.

Der Körper dieſes Schwammes iſt gedrückt kugelig, öfters in der Mitte oben zugeſpitzt, braun, gedippelt, auf einem blaßbräunlichen, walzenförmigen, vollen, unten knolligen und bewurzelten Stiele, oder ohne Stiel bloß unten bewurzelt.

Wird im Herbſte mit den übrigen angetroffen.

CCLXXVII.

LYCOPERDON GEMMATVM. Der geſteinlete Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CLXXXIX.

Lycoperdon ſubacaule, turbinatum, albidum; corpore depreſſo-globoſo, tuberculis acuminatis, variae figurae, veluti gemmis conſito; baſi breui inuerſe conica.

Lycoperdon ſaccatum, cinereum, polline obſcure viridi, *reticulatum*, *reticulis elegantibus*, *ſtellatis*, *exaſperatis*. Hall. hiſt. n. 2172. var. A, γ.

Lycoperdon globoſum, ſeſſile & candidum, cortice exteriore in areolas cryſtallorum aggregatorum aemulas ſoluto. Gled. fung. pag. 145. n. I. var. g.

Lycoperdon niueum, ſphaericum, ſuperficie in areolas adamantis inſtar diſſecta, ac diſtributa. Tourn. inſt. pag. 564. Mich. nou. gen. plant. p. 218. n. 2.

Fungus carnoſus, niueus, globoſus, adamantinus, in montibus Feltrinis. Bocc. muſ. I. tab. 306.

Reperitur vere & autumno in paſcuis ſyluaticis ac ericetis montanis.

Der Körper iſt gedrückt kugelig, mit zugeſpitzten Warzen, von verſchiedener Figur, gleichſam als mit Edelgeſteinen beſetzt, unten mit einem kurzen umgekehrt kegeligen Unterſatze.

Wird im Frühjahre und Herbſte auf bergigen, waldigen Viehtrieften und Heiden gefunden.

CCLXXVIII.

LYCOPERDON AREOLATVM. Der gefleckte weißliche Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CXC.

Lycoperdon ſubacaule, turbinatum, albidum; corpore depreſſo-globoſo, tuberculis planiuſculis variae figurae conſito; baſi breui, inuerſe conica.

Cum reliquis occurrit.

Unterſcheidet ſich vom vorhergehenden bloß dadurch, daß er nur mit platten Flecken beſetzt iſt.

Wird mit dem vorhergehenden angetroffen.

CCLXXIX.

LYCOPERDON MAXIMVM. Der gröſte gemeinſte Staubſchwamm, Boviſt, Wolfsfurz, *vulgo* Stoiber *Bauaris & Auſtriacis.*

Tom. II. Tab. CXCI.

Lycoperdon acaule, depreſſo-globoſum, albidum, fere glabrum, punctis ſtellatis conſitum; baſi breuiſſima.

Lycoperdon polymorphum glabrum. Scop. carn. II. P. II. pag. 487. n. 1631. var. 1.

Lycoperdon ſaccatum, cinereum, polline obſcure viridi, *leue*, *collo breui*, *maximum*, *ad capitis infantilis magnitudinem*, &c. Hall. hiſt. n. 2172. var. B. III.

Lycoperdon globoſum, ſeſſile, glabrum, album. Scop. fl. carn. I. pag. 62. n. 1. (a).

Lycoperdon globoſum, ſeſſile, maximum & glabrum. Gled. fung. pag. 143. n. 1. var. a.

Lycoperdon (*Boviſta*) ſubrotundum, lacerato-dehiſcens. Linn. fl. lapp. 525. fl. ſuec. I. n. 1115. II. n. 1280. ſpec. plant. I. pag. 1183. II. pag. 1653. ſyſt. nat. XII. p. 726. n. 3.

Lycoper-

Lycoperdon alpinum maximum, cortice lacero. Tourn. inſt. pag. 563.
Bouiſta alba, maxima. Dill. cat. gieſſ. pag. 196.
Fungus non veſcus XII. Loeſ. pruſſ. pag. 190.
Fungus maximus, puluerulentus, Germanis *Bouiſt*. I. Bauh. hiſt. 111. pag. 848.
Fungi rotundi orbicularis ſpecies II. C. Bauh. pin. pag. 375. n. 48.
Fungorum pernicioſorum genus XXV., ſpec. III. Cluſ. hiſt. p. CCLXXXVIII.
In dumetis, paſcuis & hortis ruſticis inter Liguſtra, Syringas & Corylos &c. Septembri inuenitur.

Dieſer Schwamm iſt gedruckt kugelig, jedoch nicht gar viel, weißlich, faſt glatt, nur mit kleinen Sterngen gedippelt, mit einem ganz kurzen Unterſatze. Erreicht oft im Durchſchnitt zwey Fuß, am Gewicht einen Viertel Zentner. Hanow. Seltenh. der Natur II. p. 368.

Wird im Herbſte in Gebüſchen, Viehtriften und Bauergärten unter den Rheinweiden, Span. Hollunder und Haſelſtauden ꝛc. angetroffen.

CCLXXX.

LYCOPERDON FVRFVRACEVM. Der fleckigte Staubſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXCIV.

Lycoperdon ſubacaule, breuiter turbinatum, albidum, furfuraceo-punctatum; corpore depreſſo globoſo; baſi breuiſſima, inuerſe conica.

Lycoperdon candido-fuluum, villis ſubulatis, rigidiuſculis aſperum. Gled. fung. p. 148. n. I. var. p.
Lycoperdon turbinatum, leucophaeum, aculeis ſimplicibus rigidiuſculis exaſperatum. Mich. nou. gen. plant. pag. 218. n. 5.
Cum prioribus autumno creſcit.

Dieſer Schwamm iſt kurz birnförmig, weißlich, mit rauhen Dippeln beſetzt; der Körper iſt gedruckt kugelig; der Unterſatz ganz kurz, umgekehrt kegelig.

Wächſt unter den übrigen im Herbſte.

CCLXXXI.

LYCOPERDON ATRVM. Der kohlſchwarze Staubſchwamm.

Tom. IV. Tab. CCCXIX.

Lycoperdon ſubacaule, varium, lignoſum, punctatum, atrum, ſplendidum; corpore ſubgloboſo, deformi, intus nigricante, celluloſo, centro cauo; petiolo deformi, breuiſſimo, concolore, pleno, aut nullo.

Valſa tuberoſa. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 399. n. 1415.
Sphaeria maxima, conuexa, nigerrima. Hall. hiſt. n. 2192.
Lichen-Agaricus tuberoſus, niger, Agarici officinalis facie, cortice nitido & fere ſplendente. Mich. nou. gen. plant. pag. 104. n. 1.
Lichen-Agaricus cruſtaceus, craſſus, bouinum renem veluti repraeſentans, niger, & quaſi deuſtus. Ibid. n. 3. tab 54. Ordo II. fig. 1.
In deiectarum arborum caudicibus verno tempore oritur.

Dieſer ganze Schwamm iſt glänzend ſchwarz, hart, holzig, verſchiedener Figur, gedippelt, mit einem ganz kurzen oder gar keinem Stiele verſehen, innwendig ſchwärzlich, zellig, in der Mitten hohl.

Wird im Frühjahre auf umgeworfenen Baumſtöcken angetroffen.

MVCORES.

CCLXXXII.

MVCOR OVATVS. Der eyförmige unächte Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CXCII.

Mucor ſeſſilis, ouatus, mucilaginoſus, piloſus, flauidus; lamellis celluloſis, fugacibus, demum fatiſcentibus, nigricantibus; polline nigro, filamentis coniuncto.

Mucor luteus, globoſus, in baſi tomentoſa ſeſſilis. Gled. fung. pag. 162. n. IV. var. e.
Fuligo ouata, laminoſa, albida. Hall. hiſt. n. 2134.
In ramis aridis, lignis foliiſque putridis naſcitur.

Dieſer Schimmelſchwamm iſt meiſtens eyrund, gelb, ohne Stiel, ſchleimig, haarig, beſtehet aus zelligem Gewebe, ſo bald vergehet, und ſchwärzlich wird, und aus ſchwarzen Staubkörnern, die an zarten Fäden an einander hängen.
Wächſt auf dürren Aeſtlein, faulem Holze und Blättern.

CCLXXXIII.

MVCOR FRAGIFORMIS. Der hellrothe unächte Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CXCIII.

Mucor ſeſſilis, globoſus, punctatus, intus mucilaginoſus, rubellus, demum fuſceſcens; cortice tenui, demum varie dehiſcente, ſucco ſanguineo ſcatente; polline rubro, filamentis coniuncto.

Valſa fragiformis. Scop. fl. carn. II. P. II. p. 399. n. 1417?
Sphaeria rubra fragi ſimilis. Hall. hiſt. n. 2190. tab. 47. fig. 10? Videtur.
Creſcit in virgultis aridis, ligniſque putridis aliis.

Dieſer Schwamm iſt ohne Stiel, rundlich, gedippelt, anfangs röthlich, zuletzt bräunlich, mit einer dünnen, verſchiedentlich aufplatzenden Rinde, innen voll rothen Saftes, mit rothen Saamenkörnern, die an Fäden zuſammen hängen.
Wächſt auf dürren Aeſtgen und faulem Holze.

CCLXXXIV.

MVCOR BVTYRACEVS. Der butterartige unächte Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CXCIV.

Mucor ſeſſilis, variae figurae, intus mucilaginoſus, flauo-albidus, viſcidus; cortice tenuiſſimo, demum varie dehiſcente, fuſco; polline fuſco, filamento coniuncto.

Fuligo flaua, butyracea, capitata. Hall. hiſt. n. 2135?
Creſcit in lignis putridis.

Dieſer Schwamm iſt ſtielloß, klebrich, gelblich weiß, verſchiedener Figur, auſſen mit einer ſehr zarten verſchiedentlich zerplatzenden Rinde, die zuletzt braun wird, innen mit ſchleimigem Safte und braunen, an Fäden aneinanderhängenden Saamenkörnern.
Wächſt auf faulem Holze.

CCLXXXV.

MVCOR CARNEVS. Der fleiſchfärbige unächte Staubſchwamm.

Tom. II. Tab. CXCV.

Mucor ſeſſilis, ſubouatus, varius, mucilaginoſus, carneus, viſcidus; cortice tenuiſſimo, demum varie dehiſcente, fuſco; polline fuſco, filamentis coniuncto.

Valſa miniata. Scop. fl. carniol. II. P. II. p. 399 n. 1418?
Sphaeria conuexa, miniata, hirſuta. Hall. hiſt. n. 2189.

Dieſer Schwamm iſt ohne Stiel, klebrig, fleiſchfärbig, meiſtens eyförmig, auſſen mit einer ſehr zarten Rinde, ſo zuletzt braun wird und verſchiedentlich zerplatzt, innen mit ſchleimigen Saft und braunen Saamenkörnern, ſo an Fäden aneinander hängen. Wird auf faulem Holze gefunden.

CCLXXXVI.

MVCOR GRANVLATVS. Der körnigte unächte Staubſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXCVI.

Mucor ſeſſilis, globoſus, minimus, gregarius, primum argenteus, dein flauidus, demum nigricans; cortice tenuiſſimo, demum fatiſcente; polline griſeo, filamentis coniuncto.

Mucor ſeſſilis, ſubgloboſus & aggregatus, exiguus, niueus, cortice in puluerem fatiſcente. Gled. fung. pag. 159. n. IV. var. b.
Mucilago minima, non cruſtacea, alba, grani panici magnitudine & forma. Mich. nou. gen. pag. 216. tab. 96. fig. 5. 6. 8. 9.
In lignis foliisque deiectis putridis autumno oritur.

Dieſer Schwamm iſt ſtielloß, ſehr klein, rundlich, anfangs ſilberfärbig, hernach gelblich, zuletzt ſchwärzlich, mit einer ſehr zarten Rinde und grauen an Fäden hängenden Saamenkörnern.
Wächſt im Herbſte auf faulem Holze und abgefallenem Laube.

CCLXXXVII.

MVCOR STEMONITIS. Der beſtielte unächte Staubſchwamm.

Tom. III. Tab. CCXCVII.

Mucor cauleſcens, minimus, gregarius; capitulo cylindraceo, carneo; demum nigro, elaſtice dehiſcente; polline griſeo, filamentis coniuncto; petiolo tereti, gracili.

Mucor Stemonitis. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 493. n. 1641. ſed color differt.
Mucor capitulo fuſco, fugaci, elliptico; ſtipite nudo, ſetaceo, breui. Scop. fl. carniol. I. pag. 66. (b).
Trichia petiolata, capitulo cylindrico, axi perforato. Hall. hiſt. n. 2165.
Stemonitis petiolata, gregaria, volua fugaci excepta; corpore elongato. Gled. fung. p. 141.
Clathroidaſtrum obſcurum maius & minus. Mich. nou. gen. plant. pag. 215. tab. 94 fig. 1. & 2.
Creſcit in lignis putridis.

Dieſer unächte Staubſchwamm beſtehet aus einem ſehr kleinen länglichen, fleiſchfärbigen Köpfgen, ſo hernach ſchwarz wird, aufſpringt und einen grauen Saamenſtaub auswirft, der mit ganz zarten Fäden zuſammenhängt, das Köpfgen ſtehet auf einem zarten, haarförmigen Stiele.

Wird haufenweiſe beyſammen auf faulem Holze angetroffen.

PHALLI.

CCLXXXVIII.

PHALLVS IMPVDICVS. Der Stinkſchwamm, Hirſchbrunſt über der Erde, Gichtmorchel.

Tom. II. Tab. CXCVI. CXCVII. & CXCVIII.

Phallus caulefcens, ſolitarius, voluatus; pileo ouato, ſubconico, viſcido, vireſcente, ſuperne calloſe reticulato, apice vmbilicato, perforato, ſubtus patulo; petiolo tereti, ventricoſo, ſubcartilagineo, fragili, lacunato, hyalino, fiſtuloſo, calici membranaceo inſidente, baſi voluato; volua duplici, membranacea, ouata, perſiſtente, albida; ſucco viſcido, foetido, fuluo, inter vtramque voluae membranam contento.

Phallus impudicus. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 474. n. 1605. Oed. fl. dan. tab. 175.
Phallus voluatus; pileo celluloſo, vtrimque peruio. Scop. fl. carniol. I. p. 48. n. 1.
Phallus volua exceptus; capituli apice patulo. Gled. fung. pag. 55. n. II. Hall. hiſt. n. 2248.
Phallus (*impudicus*) voluatus, ſtipitatus; pileo celluloſo. Linn. ſpec. plant. I. p. 1179. II. p. 1648. fl. ſuec. II. n. 1281. ſyſt. nat. XII. p. 724. n. 2.
Phallus volua exceptus, pilei apice peruio. Linn. hort. diff. p. 478. Roy. lugdb. 517. Guett. ſtamp. I. pag. 17.
Phallus vulgaris, totus albus; volua rotunda; pileolo cellulato, ac ſumma parte vmbilico peruio ornato. Mich. nou. gen. plant. pag. 201. tab. 83.
Phallus hollandicus ſeu batauicus. Dalech. hiſt. 1398.
Boletus phalloides. Tourn. inſt. p. 562. Batarr. fung. arim. p. 23. tab. II. A.
Boletus phallum referens. Rupp. fl. ien. pag. 203.
Fungus phalloides, batauicus, pileo laciniato, & veluti criſpo. Rai. hiſt. Tom. III. pag. 25. Sterb. theatr. fung. pag. 277. n. 140. tab. 30. A. B. C. D.
Fungus phalloides. I. Bauh. hiſt. III. pag. 843. Rai. ſyn. III. 12.
Fungus foetidus, penis imaginem referens. C. Bauh. pin. pag. 374.
Fungus virilis penis arrecti facie. Lob. icon. tab. 309.
Fungorum noxiorum generis XXIII. ſpec. 5. Cluſt. hiſt. pag. CCLXXXVI.
In ſyluis montoſis a Iulio menſe vsque in autumnum ad truncos arborum putridos & carioſos prouenit.

Der Hut dieſes Schwammes iſt eyrund, faſt kegelartig, ſchleimig, gräulich, oben gegittert, an der Spitze nabelig, durchbohret, unten offen und etwas abſtehend; der Stiel iſt walzenförmig, unter der Mitte bauchig, knorpelig, gebrechlich, grubig oder maſerig, glaßfarb, innen hohl, unten in einem häutigen Kelche ſitzend. Das Ey, worinnen der ganze Schwamm vor ſeiner Entwickelung verborgen iſt, beſtehet aus einer doppelten, weißli-

weißlichen Haut, zwiſchen welcher ein ſtinkender, ſchleimiger, dunkelgelber Saft eingeſchloſſen, und die unten am Stiele bleibet und ſelben umgiebt.

Wächſt in bergigen Wäldern an faulen, wurmſtichigen Holzſtämmen vom Julius an bis in den Herbſt.

CCLXXXIX.

PHALLVS ESCVLENTVS. Die gemeine ſpizige Maurache.

Tom. II. Tab. CXCIX. Tom. III. Tab. CCXCVIII. CCXCIX. & CCC.

Phallus cauleſcens, ſolitarius, nudus; pileo ouato-oblongo, ſubconico, membranaceo, ſubcartilagineo, fragili, ſuperne calloſe reticulato, luteo-fuſco, intus cauo, ſubtus clauſo; petiolo tereti, fragili, fiſtuloſo, albido, baſi tuberoſo, nudo.

Phallus eſculentus. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 473. n. 1604. Oed. fl. dan. tab. LIII.
Phallus auoluatus; pileo plicato &c. Scop. fl. carniol. I. pag. 49. n. 2. 3.
Phallus capitulo faſtigiato, ſubtus operculato, petiolo nudo. Gled. fung. pag. 59. n. IV.
Phallus (*eſculentus*) pileo ouato celluloſo, ſtipite nudo rugoſo. Linn. fl. ſuec. I. n. 1102. II. n. 1262. ſpec. plant. I. pag. 1178. II. pag. 1648. ſyſt. nat. XII. pag. 724. n. 1.
Phallus petiolo nudo, pileo ſubtus vndique annexo. Linn. hort. diff. 479. Roy. lugdb. 517.
Boletus capite tereti, reticulato. Hall. hiſt. n. 2247.
Boletus petiolo rugoſo, pileo celluloſo ouali & conico. Hall. enum. helu. pag. 24.
Boletus eſculentus rugoſus. Mich. nou. gen. plant. pag. 203. tab. 85. f. 1. 2.
Boletus eſculentus rugoſus albicans, quaſi fuligine infectus. Tourn. inſt. pag. 561. tab. 329. fig. A. Batarr. fung. arim. p. 24. tab. II. fig. F.
Boletus eſculentus, in metam faſtigiatus. Tourn. inſt. pag. 562. uti quoque
Boletus eſculentus, rugoſus fuluus. Eiusd. p. 561. &
Boletus eſculentus, rugoſus amplior, & orbicularis. pag. 562.
Morchella minor, oblonga, fuligine quaſi infecta. Dill. cat. gieſſ. p. 188.
Fungus rugoſus, vel cauernoſus, ſiue Merulius. I. Bauh. hiſt. III. p. 836.
Fungus poroſus, in longitudinem metae inſtar excreſcens. C. Bauh. pin. pag. 370. &
Fungus, poroſus, rugoſus, albicans, quaſi fuligine infectus. Eiusd. loc. cit. &
Fungus poroſus, coloris ex fuluo fuſci. Eiusd ibid.
Fungorum eſculentorum genus I. Cluſ. hiſt. p. CCLXIII.
In ſyluis & paſcuis montoſis ſiccioribus verno tempore occurrit & interdum autumno redit.

Der Hut dieſes eßbaren Schwammes iſt meiſtens länglich eyförmig, mehr oder minder zugeſpitzt, häutig, faſt knorpelig, zerbrechlich, oben gegittert, gelbbraun, innen hohl, unten geſchloſſen; der Stiel iſt walzenförmig, zerbrechlich, hohl, weißlich, unten knollig, ohne Ey.

Wird in bergigen, trockenen Wäldern und auf dergleichen Viehtriften im Frühjahre angetroffen und kömmt zuweilen im Herbſte wieder.

CCXC.

PHALLVS CANINVS. Die kleine Gichtmorchel.

Tom. II. Tab. CCCXXX.

Phallus cauleſcens, ſolitarius, voluatus; pileo ouato, ſubconico, viſcido, primum rubro, dein vireſcente, tandem ſuperne calloſe reticulato, apice vmbilicato, clauſo,

clauſo, ſubtus conniuente; petiolo tereti, ſubcartilagineo, fragili, ſuperne rubello, inferne ſordide albo, maculis rufo-fuſcis adſperſo, fiſtuloſo, calici membranaceo inſidente, baſi voluato; volua duplici, membranacea, ſubouata, perſiſtente, ſordide alba; ſucco viſcido, foetido, fuluo, inter vtramque voluae membranam contento.

Phallus exilis Marattae. Batarr. fung. arim. pag. 76. tab. XL. F. quoad deſcriptionem. Icon rudior eſſe videtur.

Autumno in ſyluis creſcere perhibetur.

Dieſer Schwamm iſt kleiner, als die gemeine Gichtmorchel auf der 196. 197. und 198ſten Kupfertafel. Der Hut iſt anfangs roth, wird hernach erſt grünlich, iſt oben zu, unten auch faſt anſchlieſſend. Der Stiel iſt ſchlank, oben röthlich, unten ſchmutzig weiß, roth-bräunlich gefleckt. Der übrige Bau gleicht der gemeinen Gichtmorchel.

Er ſoll im Herbſte in den Wäldern zu finden ſeyn.

CCXCI.

CLATHRVS CANCELLATVS. Der Gitterſchwamm.

Tom. IV. Tab. in Titulo expreſſa.

Clathrus acaulis, ſubrotundus, voluatus; pileo ſubrotundo, feneſtrato, cauo, viuide rubro, punctato, interne globulis mucilaginoſis, vireſcentibus perfuſo; volua coriacea, albida, perſiſtente, teſſellata.

Clathrus cancellatus. Scop. fl. carniol. II. P. II. pag. 485. n. 1628.
Clathrus ſeſſilis, ouato-turbinatus. Gled. fung. pag. 140.
Clathrus acaulis, ſubrotundus. Linn. hort. diff. 479. ſpec. plant. pag. 1179. II. pag. 1648. ſyſt. nat. XII. pag. 724. n. 1. Roy. lugdb. 518.
Clathrus ruber. Mich. nou. gen. plant. pag. 215. tab. 93.
Boletus ramoſus coralloides foetidus. Act. pariſ. 1713. pag. 92.
Boletus cancellatus, purpureus. Tourn. inſt. pag. 561. tab. 329. fig. 6. Batarr. fung. arim. pag. 23. tab. II. fig. E.
Fungus pannis laceris ſimilis, igneus. C. Bauh. pin. pag. 372. &
Fungus rotundus, cancellatus. Ibid. pag. 375.
Fungus coralloides, cancellatus. Cluſ. hiſt. app. alt. I. Bauh. hiſt. III. p. 838.
Fungus, lupi crepitus vulgi, efflorescens. Col. cephr. I. p. 337. tab. 336.
Fungus, quem ignem ſylueſtrem vocant. Caeſalp. hiſt. 619.

Vere & autumno reperitur, in ſyluis humidis, arundinetis & ad ſepes vepresque vmbroſas quaerendus, hactenus in vicinia nondum repertus.

Dieſer Schwamm wächſt im Frühjahre und Herbſte. Man muß ihn in feuchten Wäldern, unter dem Röhrig und an ſchattigten Hecken und Büſchen ſuchen. Hier in der Nachbarſchaft iſt er bishero noch nicht gefunden worden.

INDEX

INDEX SECVNDVS.

TENTAMEN SYSTEMATIS.

Zweytes Regiſter.

Verſuch einer ordentlichen Eintheilung.

AGARICI.

Fungi fructiferi in ſuperficie infera lamelloſa pilei horizontalis.

		No.	Tab.
I. *Petiolo baſi craſſiore, lamellisque plerumque non diffluentibus.*			
A) *E volua erumpentes, cuius reliquiæ ad baſin petioli perſiſtunt, velo annuloque perſiſtente membranaceis, petiolo pleno.*			
A. maculatus.	Muſcarii, *Fliegenſchvvämme.*	79	90
puſtulatus.		80	91
myodes.		149	261
muſcarius.		24	27 28
citrinus.		18	20
caeſareus. Velua Plinii, *Kayſerling.*		146 135	258 247
B) *E volua perſiſtente erumpentes, velo annuloque deſtituti.*			
α) *Petiolo pleno.*			
A. bombycinus.		87	98
fuluus.		84	95
β) *Petiolo fiſtuloſo.*			
A. badius.		133	245
hyalinus.		132	244
plumbeus.		76	85 86
C) *E volua fugaci erumpentes, velo nullo, annulo membranaceo, petiolo fiſtuloſo.*			
A. excoriatus.		17	18 19
procerus.		20	22 23
D) *Volua fugaci, aut nulla, velo annuloque membranaceis (lamellis ſaepe diffluentibus.)*			
α) *Petiolo fiſtuloſo.*			
A. pratenſis.	Prateoli, Campeſtres, *Champignons. Ebgärtel, Kuckemucken.*	85	96
obſcurus.		65	74
ſyluaticus.		130	242
β) *Petiolo pleno.*			
A. campeſtris.		28	33
aruenſis.		158	310 311
bulboſus.		129	241
E) *Volua fugaci, velo annuloque nullis, petiolo pleno.*			
A. guttatus.		128	240
F) *Volua nulla.*			
α) *Velo membranaceo, annulo nullo, petiolo ſubfiſtuloſo.*			
A. incertus?		55	62
β) *Velo filamentoſo.*			
1) *Annulo membranaceo tenero & fugaci, petiolo pleno.*			
A. cereolus.		44	51
candicans.		105	217
2) *Annulo nullo, petiolo pleno*			
A. amethyſtinus.		49	56
caeruleſcens.		29	34
violaceus.		3	3
glaucopus.		46	53
varius.		37	42
armeniacus.		72	81
ochroleucus.		47	54
giluus?		109	221
flavidus?		30	35
ſericeus.		21	24
γ) *Velo annuloque nullis.*			
1) *Petiolo pleno.*			

		No.	*Tab.*
A. granulatus.		19	21
aureus.		36	41
praſinus.		106	218
vaccinus ?		22	25
terreus ?		57	64
lateralis.		63	71
			72
luridus.		61	69
rutilans ?		107	219
truncatus.		139	251
albellus.	*Moucerons.*	69	78
pallidus.		43	50
tigrinus.		78	89
2) *Petiolo fiſtuloſo.*			
A. punctatus ?		35	40
II. *Petiolo tereti, craſſiuſculo, (vsque ad craſſitiem pennæ anſerinæ) lamellis non diffluentibus.*			
A) *Lacteſcentes.*			
α) *Lacte dulci albido, pileo conuexo planiuſculo, velo annuloque nullis, petiolo pleno.*			
A. *lactifluus.* Crudeolus. *Brödling.*		5	5
β) *Lacte acri, pileo vmbilicato.*			
1) *Velo annuloque nullis.*			
a) *Petiolo pleno.*			
A. fuſcus.	Omphalomycetes acres Batarrae, *Reitzker, Herbſtlinge, Hirſchblinge.*	123	235
rubeſcens.		64	73
b) *Pet. fiſtuloſo,*			
A. delicioſus.		11	11
2) *Velo ſpurio piloſo, annulo nullo.*			
a) *Pet. fiſtuloſo.*			
A. ſcrobiculatus.		115	227
torminoſus.		12	12
b) *Petiolo pleno.*			
A. crinitus.		116	228
γ) *Lacte acri amaricante, pileo vmbilicato, velo annuloque nullis, petiolo pleno.*			
A. amarus. Piperitis, *Pfefferſchwamm, Händiger Täubling.*		74	83
B) *Non lacteſcentes.*			

		No.	*Tab.*
α) *Pileo vmbilicato.*			
1) *Velo annuloque nullis, petiolo pleno.*			
A. candidus.	Omphalomycetes craſſi Batarrae, Ruſſulae Scopoli, *Täublinge.*	113	225
nitens.		126	238
lacteus.		34	39
albus.		144	256
roſeus.		66	75
Ruſſula.		51	58
purpureus.		142	254
emeticus.		15	16
			15
ruber.		81	92
cyanoxanthus.		82	93
vireſcens.		83	94
oliuaceus.		93	204
xerampelinus.		103	214
			215
rutilans ?		107	219
vmbilicatus.		96	207
tubæformis.		136	248
		137	249
incuruus.		58	65
cyathiformis.		140	252
alectorolophoides.		95	206
infundibuliformis.		101	212
degener.		131	243
chantarellus. Merulius & Capreolinus autorum, *Rebling, Rebgeiſs, Pfifferling.*		73	82
clauaeformis.		155	307
2) *Velo filamentoſo, annulo nullo, petiolo pleno.*			
A. nitidus.		86	97
glutinoſus.		31	36
rutilus.		48	55
giluus?		109	221
β) *Pileo conuexo.*			
1) *Velo filamentoſo.*			
a) *Annulo nullo.*			
a) *Petiolo pleno.*			
A. flavidus?		30	35
b) *Petiolo fiſtuloſo.*			
A. lateritius?		42	49
b) *Annulo imperfecto, petiolo vario.*			

A. mu-

	No.	Tab.
A. mutabilis? *Stockſchwämmgen.*	9	9
c) *Annulo membranaceo, petiolo fiſtuloſo.*		
A. viridulus?	1	1
2) *Velo nullo.*		
a) *Annulo membranaceo, imperfecto, petiolo fiſtuloſo.*		
A. laccatus.	13	13
b) *Annulo ſpurio, petiolo pleno.*		
A. tuberculoſus.	70	79
aurantius.	32	37
ſtriatus.	33	38
c) *Annulo nullo.*		
α) *Petiolo pleno.*		
A. ſquamoſus.	25	29
		30
craſſipes.	77	87
		88
faſciatus.	111	223
vaccinus?	22	25
miniatus?	160	313
β) *Petiolo fiſtuloſo.*		
A. punctatus?	35	40
ſpadiceus.	53	60
ochraceus.	143	255
melleus.	39	45
pſittacinus?	150	301
coccineus?	151	302
carneus.	153	304
niueus.	120	232
γ) *Pileo ſubconico, aut ſaltem in medio faſtigiato, mammoſo.*		
1) *Velo nullo.*		
a) *Annulo nullo.*		
α) *Petiolo fiſtuloſo.*		
A. pſittacinus?	150	301
coccineus?	151	302
conicus.	2	2
collinus.	108	220
rubellus.	152	303
galericulatus?	45	52
β) *Petiolo pleno.*		
A. lacer.	145	257
leoninus.	41	48

	No.	Tab.
caryophyllæus. *Nägelein-ſchwämmgen.*	68	77
chryſophæus.	141	253
pullus.	138	250
ceruinus.	10	10
multiformis?	14	14
granulatus?	19	21
miniatus?	160	313
faſtigiatus.	23	26
oedematopus.	147	259
b) *Annulo ſpurio, petiolo pleno.*		
A. floccoſus.	54	61
piloſus.	71	80
2) *Velo filamentoſo.*		
a) *Annulo nullo.*		
α) *Petiolo pleno.*		
A. limacinus.	159	312
flauidus?	30	35
β) *Petiolo fiſtuloſo.*		
A. croceus.	4	4
lateritius?	42	49
giganteus.	75	84
b) *Annulo imperfecto, petiolo vario.*		
A. mutabilis?	9	9
c) *Annulo membranaceo, petiolo fiſtuloſo.*		
A. viridulus?	1	1
3) *Velo membranaceo.*		
a) *Annulo membranaceo, petiolo pleno.*		
A. filamentoſus.	98	209
b) *Annulo nullo, petiolo ſubfiſtuloſo.*		
A. incertus?	55	62
III. *Petiolo tereti, tenero, (infra craſſitiem pennae anſerinae) lamellis non diffluentibus, toto ceteroquin fungo tenero & fugaci. (Bullae Batarrae.)*		
A. *Pileolo planiuſculo.*		
α) *Petiolo pleno.*		
A. clauus.	52	59
alliatus. *Knoblauchſchwamm.*	88	99
fragilis.	118	230

	No.	Tab.
β) Petiolo fiſtuloſo.		
A. puluerulentus.	114	226
puſillus.	92	203
B) Pileolo mammoſo plicato, petiolo fiſtuloſo.		
A. vmbelliferus.	157	309
brunneus.	26	31
plicatus.	27	32
campanulatus.	56	63
palleſcens.	100	221
galericulatus?	45	52
C) Pileolo ſubconico, non plicato.		
α) Petiolo fiſtuloſo.		
A. pyramidatus.	117	229
acuminatus?	91	202
tener.	62	70
griſeus.	124	236
acicula.	110	222
β) Petiolo pleno.		
A. atrorufus.	122	234
D) Pileolo conuexo, petiolo pleno.		
A. minutulus.	156	308
IV. *Petiolo tereti, fiſtuloſo, lamellis per ſenium atris, in liquamen diffluentibus. (Atramentarii Scop.)*		
A) Annulo nullo.		
A. acuminatus?	91	202
heluolus.	99	210
truncorum.	6	6
lignorum.	59	66
ſpadiceogriſeus.	125	237
farinulentus.	94	205
cinereus.	89	100
margaritaceus.	104	216
rufocandidus.	90	201
B) Annulo ſpurio fugaci.		
A. fuſceſcens.	17	17
fugax.	60	67 68
porcellaneus.	40	46 47
cylindricus.	8	8
ouatus.	7	7
V. *Paraſitici, petiolo deformi, abbreuiato, vel nullo, pileo deformi, vel dimidiato.*		
A. ſquamoſus?	25	29 30
aggregatus.	154	305 306
flabelliformis.	33	43 44
dimidiatus.	121	233
ſemipetiolatus.	97	208
tremulus.	112	224
mollis.	102	213
alneus.	134	246
hirſutus.	67	76
quercinus.	50	57
dubius.	119	231

BOLETI.

Fungi fructiferi in ſuperficie infera poroſa pilei horizontalis.

	No.	Tab.
I. *Paraſitici, petiolo deformi, abbreviato, vel nullo, pileo deformi, vel dimidiato.*		
B. albus.	177	124
albidus.	195	314
vngulatus. } Igniarii, *Pferdebufbilz.*	186	137 138
fuluus. } Igniarii, *Pferdebufbilz.*	187	262
ſemiouatus.	194	270
multicolor.	193	269
verſicolor.	185	136
variegatus.	188	263
annulatus.	165	106
meſentericus.	191	267
atrofuſcus.	192	268
* * *		
deformis.	189	264
* * *		
iuglandis. *Nuſsbaumbilz.*	161	101 102
hepaticus. *Rothe Hirſchzunge. Blutſchwamm.*	174	116 uſque 120

auran-

		No.	Tab.
aurantius. *Gelbe Hirſchzunge.*		168	109, 110
caudicinus.		182	131, 132
criſtatus.		197	316, 317
flabelliformis.		171	113
ramoſiſſimus, *criſtatus. Eichhaaſe.*		180	127, 128, 129
— : *pileatus.*		169	111
		190	265, 266
II. *Terreſtres, pileis & petiolis perfectis.*			
B. luteus. *Doppeltes Schaafeiterl.*		172	114
aureus.	Bouini, *Kuhbilze.*	173	115
flauorufus.		176	123
rufus.		162	103
bouinus.		163	104
ferrugineus.		179	126
luridus.		166	107
terreus.		196	315
oliuaceus.		164	105
cupreus.		183	133
appendiculatus.		181	130
craſſipes.		170	112
bulboſus.		184	134, 135
reticulatus.		167	108
ouinus. *Weiſses Schaafeiterl.*		175	121, 122
coriaceus.		178	125

HYDNA.

Fungi fructiferi in ſuperficie infera echinata pilei horizontalis.

	No.	Tab.
H. cyathiforme.	198	139
pullum.	207	272
auriſcalpium.	202	143
ſtriatum.	206	271
rufeſcens.	200	141
flavidum.	209	318
imbricatum.	199	140
ſquamoſum.	208	273
floriforme.	204	146, 147
gelatinoſum.	203	144, 148
criſpum.	205	145
coralloides.	201	142

ELVELAE.

Fungi fructiferi in ſuperficie ſupera laminae excauatae aut plicatae.

I. *Petiolatae.*

		No.	Tab.
E. ramoſa.		224	163
villoſa.	Mitrae, phalliformes. *Pfaffenhüte, Stockmorcheln.*	243	321
clauata.		211	149
pallida.		239	282
nigricans.		216	154
monacella.		223	162
palleſcens.		244	322
fuliginoſa.		242	320
infula.		221	159
mitra.		222	160, 161
ſpadicea.		249	283
inflata.		225	153
pileus.		237	281
clauus.	Floriformes *Blumen-Schwämme.*	235	279
floriformis.		234	278
caryophyllaea.		246	325
purpurea.		245	323, 324
hiſpida.	Hypocrateres, *Praeſentirteller Schwamm.*	228	167
hypocrateriformis.		214	152
tubaeformis.	Buccina Scop. *Trompeten-Schwämme.*	219	157
carnea.		225	164
purpuraſcens.		232	276
tubuloſa.		231	275
cornucopioides.		226	165
punctata.		227	166
infundibuliformis.		233	277

		No.	Tab.
II. *Subacaules.*			
E. auricula.		218	156
III. *Acaules, ſeſſiles*, (Pezizae quorundam.)			
E. pulla.	Scyphi, Patellæ, *Becher-Schüſſel-Schwämme.*	220	158
ochracea.		217	155
ochroleuca.		230	274
ſcutellata.		212	150
pyxidata.		236	280
coccinea.		210	148
ciliata.		240	284
albida.		213	151
foliacea.		241	319
purpurea.		229	168
meſenterica.		245	323 324

CLAVARIAE.

Fungi fructifere in ſuperficie corporis ſimplicis vel ramoſi.

		No.	Tab.
I. *Simplices, non ramoſae.*			
C. gemmata.	*Käulen-Schwämme.*	261	290
piſtillaris.		247	269
ligula.		249	271
laciniata.		262	291
ophiogloſſoides.		264	327
II. *Aggregatae, ramoſae.*			
C. hypoxylon.		265	328
digitellus.	Coralloides, *Geisbärte, Händel-ſchwämme. Corallen-ſchwämme.*	263	326
cornuta.		260	289
flammea.		252	174
aurea.		258	287
flaua.		253	175
flaueſcens.		256	285
pallida.		257	286
rufeſcens.		259	288
aeroporphyrea.		254	176
rubella.		255	177
purpurea.		250	172
albida.		248	170
corniculata.		251	173

PEZIZAE.

Fungi fructiferi in receptaculis lentiformibus glutinoſis, in cauo campanulato nidulantibus.

	No.	Tab.
P. hirſuta.	166	178
ſericea.	168	180
crucibuliformis.	167	179
ollaris.	169	181

LYCOPERDA.

Fungi fructiferi in cauo ſubrotundo, apice ſaepius dehiſcente.

	No.	Tab.
L. ſtellatum.	270	182
coronatum.	271	183
furfuraceum.	280	294
maximum.	279	191
areolatum.	278	190
gemmatum.	277	189
echinatum.	274	186
papillatum.	272	184
pyriforme.	273	185 293
excipuliforme.	275	187 292 295
ſpadiceum.	276	188
atrum.	281	329

MUCORES.

Fungi fructiferi in cauo ouato aut ſubrotundo varie dehiſcente.

	No.	Tab.
M. butyraceus.	284	194
ouatus.	282	192
carneus.	285	195
fragiformis.	283	193
granulatus.	286	296
ſtemonitis.	287	297

PHAL-

	No.	Tab.
PHALLI. Fungi fructiferi in ſuperficie ſupera calloſo-reticulata capituli caui.		
Ph. eſculentus.	289	199, 298, 299, 300
Ph. impudicus.	288	196, 197, 198
caninus.	290	330
CLATHRI. Fungi fructiferi in liquamine defluente capituli caui, feneſtrati.		
C. cancellatus.	291	Tit.

INDEX TERTIVS.
NOMINVM GENERICORVM ET GERMANICORVM.

Drittes Regiſter.
Geſchlechts- und deutſche Namen.

Agarici. No. 1 - 160. Tab. 1 - 100. 200- 261. 301 - 313.
Alectorolophoides. No. 73. 95.
Amanitae vid. Agarici.
Auricula leporis. No. 73.
Baumbilz. No. 165. 177. 182. 188. 193. 195.
Becherſchwaemme vid. Pezizae.
Bilze vid. Boleti.
Birkenreizker. No. 12. Tab. 12.
Biſchofshut. No. 221. 223. 242. 244.
Blaetterſchwaemme vid. Agarici.
Blutſchwamm vid. *Leberbilz.*
Boleti. No. 161 - 197. Tab. 101 - 138. 262- 270. 314 - 317.
Boletus. No. 135.
Bouiſta vid. Lycoperda.
Bouiſta igniaria. No. 186.
Brödling. No. 5. Tab. 5.
- - *grüner.* No. 83.
Bulla. No. 114.
Capreolinus. No. 73.
Champignon vid. *Ebegaertel.*
Chantarellus No. 73.
Clathrus No. 291. Tab. in Titulo Tomi IV.
Clauariae No. 247 - 265. Tab. 169 - 177. 285 - 291. 326 - 328.
Columbettes No. 112.
Corallenſchwaemme No. 248. 250 - 260.
Coralloides No. 248. 250. 253 - 255.
Crudeolus vid. *Brödling.*
Cyathoides vid. Pezizae.
Cyathus vid. Pezizae.
Echinus. vid. Hydna.
Ebegäriel No. 28. 85. 130. 158. Tab. 33. 96. 242. 310. 311.
Eichenſchwamm No. 50.
Eichhaaſe No. 169. 180. 190.
Eluelae No. 210 - 245. Tab. 148 - 168. 274. 284. 319 - 328.
Erinaceus vid. Hydna.

Erlen-

Erlenſchwamm No. 134.
Eyſchwamm No. 21. 76. 84. 87. 128. 129. 132. 133.
Faltenſchwaemme vid. Eluelae.
Fliegenſchvvamm No. 18. 24. 79. 80. 149. Tab. 20. 27. 28. 90. 91. 261.
Fühlhorn No. 226. 227.
Fungoides vid. Eluelae, Clauariae, Pezizae.
Gallinacei No. 95.
Geisbart No. 253. 255. Tab. 175. 177.
Gichtmorchel No. 288. 290. Tab. 196-198. 330.
Gitterſchvvamm No. 291. Tab. in Tit. Tom. IV.
Gräuling, *Grünling* No. 83. Tab. 94.
Håndelſchvvamm No. 253. 255. Tab. 175. 177.
Håndiger Taeubling No. 74. Tab. 83.
Herbſtling, *Hirſchling* No. 11. 12. 64. 115. 116. 123.
Herrenbilz No. 135. 140.
Hirſchzunge No. 168. 174. 199. Tab. 109. 110. 116-120. 140.
Holzbilz No. 185. 189. 191. 197.
Holzſchvvamm No. 25. 38. 56. 67. 70. 97. 98. 102. 111. 118. 119. 121. 127. 136. 137. 140. 141.
Holzvvaſſerſchvvamm No. 59. 67. 125.
Hydnum No. 198-209. Tab. 139-147. 271-273. 318.
Hydrophorus No. 7. 89.
Hypoxylon No. 265.
Kappenſchvvamm No. 6. 100.
Käulſchvvaemme vid. Clauariae.
Käyſerling No. 135. 146.
Knoblauchſchvvamm No. 88. Tab. 99.
Kremling No. 83.
Kuckemucken vid. *Ebegaertel.*
Kuhbilz No. 162-164. 166. 167. 170. 173. 176. 179. 181. 183. 196.
Leberbilz No. 174.
Loecherſchvvaeme vid. Boleti.
Lycoperda No. 270-281. Tab. 182-191. 292-295. 329.
Mel muſcarum No. 24.
Merulus No. 73. 131.
Miſtſchvvamm No. 7. 8, 40. 60. 89. 90. 99. 104.
Morchella vid. Phalli & Eluelae.
Morchelſchvvaemme vid. Phalli.
Mooſchvvamm No. 62. 91. 110. 113. 117. 122. 124. 156. 157.
Mucores No. 282-287. Tab. 192-195. 296. 297.
Muſſeron No. 43. 69. 78. Tab. 50. 78. 89.
Naegeleinſchvvamm No. 68. Tab. 77.
Nuſsbaumbilz No. 161. Tab. 101. 102.
Omphalomyces No. 11. 69. 86.
Ophiogloſſoides No. 264.
Peziza vid. Eluelae.
Pezizae No. 266-269. Tab. 178-181.
Pfaffenhut No. 216. 221. 222. 238. 239.
Pfefferſchvvamm No. 74. Tab. 83.
Pfifferling vid. *Rehgeiſs.*
Phalli No. 288-290. Tab. 196-199. 298-300. 330.
Piperitis No. 74.
Polymyces No. 39.
Polyporus vid. Boleti.
Pradelli No. 28.
Rehgeiſs, *Rehling*, No. 73. 95.
Reizker N. 11. 12.
Ruſſula No. 15. 51. 66. 74. 81-83. 103. 142.
Schaafeiterl No. 172. 175. Tab. 114. 121. 122.
Speytaeubling, *Speyteufel*, No. 15. Tab. 15. 16.
Stachelſchvvaemme vid. Hydna.
Staubſchvvämme vid. Lycoperda.
- - - unaechte vid. Mucores.
Steinbilz No. 184.
Sternbouiſt No. 270. 271.
Stockmaurache No. 221. 222.
Stockſchvvamm No. 9. 147. Tab. 9.
Stultorum cuculli No. 77.
Suillus vid. Boleti.
Tannenpfifferling No. 140.
Taeublinge No. 15. 51. 66. 74. 81-83. 93. 103. 107. 109. 112. 126. 142. Tab. 83. 92-94.
Trichterſchvvamm No. 48. 101.
Valſa No. 265. 283. 285.
Volua No. 135.
Vonkhout No. 50.
Waſſerſchvvamm No. 16. 94.
Wieſenreitzker No. 64. 123.
Wieſenſchvvamm No. 105. 108.
Zunderſchvvamm No. 186. 187. 194.

KREISBIBLIOTHEK
REGENSBURG